

## **B Formuláre terénneho šetrenia**

## Úsek č. 1

**Názov toku:** Malý Dunaj

**Bioregión:** Bratislavský

**Biotop:** Dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy

**K. Ú.:** Bratislava II – Vrakuňa

**Lesnícka typológia:** *Ulmeto-Fraxinetum populeum*

**Nadmorská výška:** 128,5 m n. m.

**Breh:** pravý

**Typ koryta:** regulované

**Charakter prúdenia:** nízinný

### Veková skladba

- 1 mladý porast po výsadbe
- 2 porast stabilizovaný niekoľko rokov po výsadbe s optimálnymi vlastnosťami odpovedajúcimi pestovateľskému cieľu
- 3 dospelý, prípadne odrastený porast v podmienkach stanovišťa plniaci všetky jeho funkcie

### Etážovitosť

- 1 prevažujúci bylinný porast, nad 30 %
- 2 prevažujúci kerový porast, nad 30 %
- 3 prevažujúci stromový porast, nad 30 %
- k kombinovaný porast s rovnomerným zastúpením jednotlivých typov vegetácie

### Medzernatosť

- 1 súvislý porast bez väčších medzier a výpadkov vegetácie
- 2 skupinový porast vytvárajúci zhluky vegetácie bez plynulého zapojenia
- 3 chýbajúci porast na miestach vyžadujúcich si vegetačný sprievod alebo odstránený brehový porast

### Zoradenie

- 1 jednostranný brehový porast
- 2 obojsstranný brehový porast
- 3 brehový porast vo viacerých radoch
- p plošný brehový porast

**Druhov skladba****bylinn poschodie:** chrastnica trst'ovkovit (*Phalaris arundinacea*)modrica irokolist (*Muscari botryoides*)sneienka jarn (*Galanthus nivalis*)krivec lt (*Gagea lutea*)hluchavka kvrnit (*Lamium maculatum*)mlienik chvojkov (*Euphorbia cyparissias*)ntrnik hus (*Potentilla anserina*)pakost smrad'v (*Geranium robertianum*)lastovinik v (*Chelidonium majus*)balota ierna (*Ballota nigra*)**kerov poschodie:** svb krvav (*Swida sanguinea*)baza ierna (*Sambucus nigra*)rua ipov (*Rosa canina*)dr obyajny (*Berberis vulgaris*)brlen eurpsky (*Euonymus europaeus*)hloh jednosmenn (*Crataegus monogyna*)plamienok plotny (*Clematis vitalba*)**stromov poschodie:** jase uzkolist (*Fraxinus angustifolia*)jase thly (*Fraxinus excelsior*)topo' ierny (*Populus nigra*)topo' biely (*Populus alba*)topo' ed (*Populus × canescens*)agt biely (*Robinia pseudoacaccia*)orech ierny (*Juglans nigra*)**Invzne druhy:** agt biely (*Robinia pseudoacaccia*)**Stav porastov**1 brehov porast neposkoden, prpadne poskoden do malej miery (do 10 %)

2 brehov porast strednho rozsahu poskodena (do 50%)

3 brehov porast vrazne poskoden (nad 60%)

**Poznmky:****Dtum:** 21. 3. 2015**Vypracovala:** Barbora Habalov

## Úsek č. 1

<b>Názov toku:</b> Malý Dunaj	
<b>Bioregión:</b> Bratislavský	<b>Biotop:</b> Dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy
<b>K. Ú.:</b> Bratislava II – Vrakuňa	<b>Lesnícka typológia:</b> <i>Ulmeto-Fraxinetum populeum</i>
<b>Nadmorská výška:</b> 128,5 m n. m.	<b>Breh:</b> ľavý
<b>Typ koryta:</b> regulované	<b>Charakter prúdenia:</b> nížinný
<b>Veková skladba</b>	
1	mladý porast po výsadbe
2	porast stabilizovaný niekoľko rokov po výsadbe s optimálnymi vlastnosťami odpovedajúcimi pestovateľskému cieľu
3	<u>dospelý, prípadne odrastený porast v podmienkach stanovišťa plniaci všetky jeho funkcie</u>
<b>Etážovitosť</b>	
1	<u>prevažujúci bylinný porast, nad 30 %</u>
2	prevažujúci kerový porast, nad 30 %
3	prevažujúci stromový porast, nad 30 %
k	kombinovaný porast s rovnomerným zastúpením jednotlivých typov vegetácie
<b>Medzernatosť</b>	
1	súvislý porast bez väčších medzier a výpadkov vegetácie
2	skupinový porast vytvárajúci zhluky vegetácie bez plynulého zapojenia
3	<u>chýbajúci porast na miestach vyžadujúcich si vegetačný sprievod alebo odstránený brehový porast</u>
<b>Zoradenie</b>	
1	jednostranný brehový porast
2	<u>obojsstranný brehový porast</u>
3	brehový porast vo viacerých radoch
p	plošný brehový porast

**Druhov skladba**

**bylinne poschodie:** chrastnica trs'ovnikovit (*Phragmites australis*)

tiavec tupolisty (*Rumex obtusifolius*)

plka irokolista (*Typha latifolia*)

vika vtacia (*Viccia cracca*)

phl'ava dvojdoma (*Urtica dioica*)

hluchavka skvrnita (*Lamium maculatum*)

cesnaka lekarska (*Alliaria petiolata*)

**kerove poschodie:** ostruina ozinova (*Rubus caesius*)

hloh jednosmenny (*Crataegus monogyna*)

**stromove poschodie:** topoľ edy (*Populus × canescens*)

topoľ kanadsky (*Populus × canadensis*)

topoľ biely (*Populus alba*)

javor jaseolisty (*Acer negundo*)

**Invazne druhy:** topoľ kanadsky (*Populus × canadensis*)

javor jaseolisty (*Acer negundo*)

**stav porastov**

1 brehovy porast neposkodeny, pripadne poskodeny do malej miery (do 10 %)

2 brehovy porast stredneho rozsahu poskodenia (do 50%)

3 brehovy porast vyrazne poskodeny (nad 60%)

**Poznamky:** erozia

**Datum:** 21. 3. 2015

**Vypracovala:** Barbora Habalova

## Úsek č. 2

<b>Názov toku:</b> Malý Dunaj	
<b>Bioregión:</b> Bratislavský	<b>Biotop:</b> Biotop: Vřbovo-topoľové nížinné lužné lesy
<b>K. Ú.:</b> Bratislava II – Vrakuňa	<b>Lesnícka typológia:</b> <i>Salicion albae</i>
<b>Nadmorská výška:</b> 134,25 m n. m.	<b>Breh:</b> pravý
<b>Typ koryta:</b> regulované	<b>Charakter prúdenia:</b> nížinný
<b>Veková skladba</b>	
1	mladý porast po výsadbe
2	porast stabilizovaný niekoľko rokov po výsadbe s optimálnymi vlastnosťami odpovedajúcimi pestovateľskému cieľu
3	<u>dospelý, prípadne odrastený porast v podmienkach stanovišťa plniaci všetky jeho funkcie</u>
<b>Etážovitosť</b>	
1	prevažujúci bylinný porast, nad 30 %
2	prevažujúci kerový porast, nad 30 %
3	<u>prevažujúci stromový porast, nad 30 %</u>
k	kombinovaný porast s rovnomerným zastúpením jednotlivých typov vegetácie
<b>Medzernatosť</b>	
1	<u>súvislý porast bez väčších medzier a výpadkov vegetácie</u>
2	skupinový porast vytvárajúci zhluky vegetácie bez plynulého zapojenia
3	chýbajúci porast na miestach vyžadujúcich si vegetačný sprievod alebo odstránený brehový porast
<b>Zoradenie</b>	
1	jednostranný brehový porast
2	<u>obojsstranný brehový porast</u>
3	brehový porast vo viacerých radoch
p	plošný brehový porast

**Druhov skladba**

**bylinne poschodie:** psinek poplazovy (*Agrostis stolonifera*)

blyska jarny (*Ficaria verna*)

**kerove poschodie:** -

**stromove poschodie:** topoľ edy (*Populus × canescens*)

topoľ ierny (*Populus nigra*)

vrba biela (*Salix alba*)

**Invazne druhy:** -

**Stav porastov**

1 brehovy porast neposkodeny, pripadne poskodeny do malej miery (do 10 %)

2 brehovy porast stredneho rozsahu poskodenia (do 50%)

3 brehovy porast vyrazne poskodeny (nad 60%)

**Poznamky:**

**Datum:** 21. 3. 2015

**Vypracovala:** Barbora Habalova

<b>Úsek č. 2</b>	
<b>Názov toku:</b> Malý Dunaj	
<b>Bioregión:</b> Bratislavský	<b>Biotop:</b> Biotop: Vrbovo-topoľové nízinné lužné lesy
<b>K. Ú.:</b> Bratislava II – Vrakuňa	<b>Lesnícka typológia:</b> <i>Salicion albae</i>
<b>Nadmorská výška:</b> 132,25 m n. m.	<b>Breh:</b> ľavý
<b>Typ koryta:</b> regulované	<b>Charakter prúdenia:</b> nízinný
<b>Veková skladba</b>	
1	mladý porast po výsadbe
2	porast stabilizovaný niekoľko rokov po výsadbe s optimálnymi vlastnosťami odpovedajúcimi pestovateľskému cieľu
<u>3</u>	<u>dospelý, prípadne odrastený porast v podmienkach stanovišťa plniaci všetky jeho funkcie</u>
<b>Etážovitosť</b>	
1	prevažujúci bylinný porast, nad 30 %
2	<u>prevažujúci kerový porast, nad 30 %</u>
3	prevažujúci stromový porast, nad 30 %
k	kombinovaný porast s rovnomerným zastúpením jednotlivých typov vegetácie
<b>Medzernatosť</b>	
1	súvislý porast bez väčších medzier a výpadkov vegetácie
<u>2</u>	<u>skupinový porast vytvárajúci zhluky vegetácie bez plynulého zapojenia</u>
3	chýbajúci porast na miestach vyžadujúcich si vegetačný sprievod alebo odstránený brehový porast
<b>Zoradenie</b>	
1	jednostranný brehový porast
<u>2</u>	<u>obojsstranný brehový porast</u>
3	brehový porast vo viacerých radoch
p	plošný brehový porast



<b>Druhov skladba</b> <b>bylinne poschodie:</b> psinek poplazovy ( <i>Agrostis stolonifera</i> ) <b>kerove poschodie:</b> bazaeierna ( <i>Sambucus nigra</i> ) <b>stromove poschodie:</b> topoleierny ( <i>Populus nigra</i> ) <b>Invazne druhy:</b>
<b>Stav porastov</b> 1 <u>brehovy porast neposkodeny, pripadne poskodeny do malej miery (do 10 %)</u> 2      brehovy porast stredneho rozsahu poskodenia (do 50%) 3      brehovy porast vyrazne poskodeny (nad 60%)
<b>Poznamky:</b>

**Datum:** 21. 3. 2015

**Vypracovala:** Barbora Habalova

### Úsek č. 3

<b>Názov toku:</b> Malý Dunaj	
<b>Bioregión:</b> Bratislavský	<b>Biotop:</b> Biotop: Vrbovo-topoľové nízinné lužné lesy
<b>K. Ú.:</b> Bratislava II – Vrakuňa	<b>Lesnícka typológia:</b> <i>Salicion albae</i>
<b>Nadmorská výška:</b> 133,25 m n. m.	<b>Breh:</b> pravý, ľavý
<b>Typ koryta:</b> regulované	<b>Charakter prúdenia:</b> nízinný
<b>Veková skladba</b>	
1	mladý porast po výsadbe
2	porast stabilizovaný niekoľko rokov po výsadbe s optimálnymi vlastnosťami odpovedajúcimi pestovateľskému cieľu
3	<u>dospelý, prípadne odrastený porast v podmienkach stanovišťa plniaci všetky jeho funkcie</u>
<b>Etážovitosť</b>	
1	prevažujúci bylinný porast, nad 30 %
2	prevažujúci kerový porast, nad 30 %
3	prevažujúci stromový porast, nad 30 %
<u>k</u>	<u>kombinovaný porast s rovnomerným zastúpením jednotlivých typov vegetácie</u>
<b>Medzernatosť</b>	
<u>1</u>	<u>súvislý porast bez väčších medzier a výpadkov vegetácie</u>
2	skupinový porast vytvárajúci zhluky vegetácie bez plynulého zapojenia
3	chýbajúci porast na miestach vyžadujúcich si vegetačný sprievod alebo odstránený brehový porast
<b>Zoradenie</b>	
1	jednostranný brehový porast
<u>2</u>	<u>obojsstranný brehový porast</u>
3	brehový porast vo viacerých radoch
p	plošný brehový porast

<b>Druhov skladba</b>	
<b>bylinn poschodie:</b>	chrastnica trs'ovkovit ( <i>Phalaroides arundinacea</i> ) phava dvojdom ( <i>Urtica dioica</i> ) chmeľ obyajn ( <i>Humulus lupulus</i> ) zlatobyľ kanadsk ( <i>Solidago canadensis</i> ) divozel veľkokvet ( <i>Verbascum densiflorum</i> )
<b>kerov poschodie:</b>	plamienok plotn ( <i>Clematis vitalba</i> ) ostruina oinov ( <i>Rubus caesius</i> ) svb krvav ( <i>Swida sanguinea</i> )
<b>stromov poschodie:</b>	vba biela ( <i>Salix alba</i> ) vba popolav ( <i>Salix cinerea</i> ) vba krehk ( <i>Salix fragilis</i> ) topoľ ierny ( <i>Populus nigra</i> )
<b>Invzne druhy:</b>	zlatobyľ kanadsk ( <i>Solidago canadensis</i> ) divozel veľkokvet ( <i>Verbascum densiflorum</i> )
<b>Stav porastov</b>	
1	brehov porast nepokoden, prpadne pokoden do malej miery (do 10 %)
2	brehov porast strednho rozsahu pokodena (do 50%)
3	<u>brehov porast vrazne pokoden (nad 60%)</u>
<b>Poznmky:</b> ntre, vetrolamy	

**Dtum:** 21. 3. 2015

**Vypracovala:** Barbora Habalov

## Úsek č. 4

<b>Názov toku:</b> Malý Dunaj	
<b>Bioregión:</b> Bratislavský	<b>Biotop:</b> Biotop: Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek
<b>K. Ú.:</b> Bratislava II – Vrakuňa	<b>Lesnícka typológia:</b> <i>Senecionion fluviatilis</i>
<b>Nadmorská výška:</b> 136,25 m n. m.	<b>Breh:</b> pravý, ľavý
<b>Typ koryta:</b> regulované	<b>Charakter prúdenia:</b> nížinný
<b>Veková skladba</b>	
1	mladý porast po výsadbe
<u>2</u>	<u>porast stabilizovaný niekoľko rokov po výsadbe s optimálnymi vlastnosťami</u> odpovedajúcimi pestovateľskému cieľu
3	dospelý, prípadne odrastený porast v podmienkach stanovišťa plniaci všetky jeho funkcie
<b>Etážovitosť</b>	
<u>1</u>	<u>prevažujúci bylinný porast, nad 30 %</u>
2	prevažujúci kerový porast, nad 30 %
3	prevažujúci stromový porast, nad 30 %
k	kombinovaný porast s rovnomerným zastúpením jednotlivých typov vegetácie
<b>Medzernatosť</b>	
<u>1</u>	<u>súvislý porast bez väčších medzier a výpadkov vegetácie</u>
2	skupinový porast vytvárajúci zhluky vegetácie bez plynulého zapojenia
3	chýbajúci porast na miestach vyžadujúcich si vegetačný sprievod alebo odstránený brehový porast
<b>Zoradenie</b>	
1	jednostranný brehový porast
<u>2</u>	<u>obojsstranný brehový porast</u>
3	brehový porast vo viacerých radoch
p	plošný brehový porast

<p><b>Druhová skladba</b></p> <p><b>bylinné poschodie:</b> vřbovka chlpatá (<i>Epilobium hirsutum</i>)  nadtica bobuľnatá (<i>Cucubalus baccifer</i>)  lipnica močiarna (<i>Poa palustris</i>)  vlkovec obyčajný (<i>Aristolochia clematitis</i>)  povoja plotná (<i>Calistegia sepium</i>)  chmeľ obyčajný (<i>Humulus lupulus</i>)</p> <p><b>kerové poschodie:</b> ostružiník ožinový (<i>Rubus caesius</i>)  svíb krvavý (<i>Swida sanguinea</i>)</p> <p><b>stromové poschodie:</b> -</p> <p><b>Invázne druhy:</b> -</p>
<p><b>Štav porastov</b></p> <p>1     <u>brehový porast nepoškodený, prípadne poškodený do malej miery (do 10 %)</u></p> <p>2     brehový porast stredného rozsahu poškodenia (do 50%)</p> <p>3     brehový porast výrazne poškodený (nad 60%)</p>
<p><b>Poznámky:</b></p>

**Dátum:** 21. 3. 2015

**Vypracovala:** Barbora Habalová