

Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta
Katedra pomocných věd historických a archivnictví

**Příčiny úmrtí v Nové Pace ve světle matričních záznamů
z let 1879–1889**

Bakalářská práce

Autor: Kristýna Vodičková
Studijní program: B7105 / Historické vědy Bc.
Studijní obor: Archivnictví - historie
Forma studia: kombinovaná
Vedoucí práce: PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Hradec Králové 2017



Zadání bakalářské práce

Autor:	Kristýna Vodičková
Studium:	F16BK0046
Studijní program:	B7105 Historické vědy
Studijní obor:	Archivnictví - historie
Název bakalářské práce:	Příčiny úmrtí v Nové Pace ve světle matričních záznamů z let 1879-1889
Název bakalářské práce AJ:	Causes of Death in Nová Paka in the Light of Parish Registers from 1879 to 1889

Cíl, metody, literatura, předpoklady:

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je provedení statistické analýzy příčin úmrtí v Nové Pace v letech 1879-1889. Výsledky budou prozkoumány a propojeny se situací a vývojem města v daném období. Metody zpracování: Statistické zpracování údajů, komparace, analýza, syntéza, transkripce.

SOA Zámorsk, fond Sběrka matrik Východočeského kraje 1587 - 1949, Farní úřad Nová Paka, Matrika zemřelých 1878-1905, inv. č. 6553, kniha č. 6553. Petr Svobodný -Ludmila Hlaváčková, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004. Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti (Bertillon, revise 1929), Praha 1934. Novopacko: Vlastivědná monografie okresu, I.III., Nová Paka 1927.

Garantující pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta

Vedoucí práce: PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Oponent: Mgr. Martina Bolom Kotari, Ph.D.

Datum zadání závěrečné práce: 15.11.2016

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala pod vedením vedoucí bakalářské práce samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny a literaturu.

Ve Staré Pace dne 25. 4. 2017

.....

podpis

Poděkování

Ráda bych na tomto místě poděkovala paní PhDr. Janě Vojtíškové, PhD. za odborné vedení, rady a vstřícnost při tvorbě této práce.

Anotace

Kristýna VODIČKOVÁ, *Příčiny úmrtí v Nové Pace ve světle matričních záznamů z let 1879–1889*, Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové 2017. Bakalářská práce.

Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem provedení analýzy příčin úmrtí v Nové Pace v letech 1879–1889. Tyto výsledky jsou v jednotlivých podkapitolách roztrženy dle věkových skupin a pohlaví zemřelých. Cílem bylo zjistit matrikářem nejčastěji evidované příčiny smrti, rovněž také stanovit příčiny úmrtí pomocí Bertillonovy klasifikace nemocí a příčin smrti, revise 1929. V první kapitole je zachycena podoba Nové Paky v oblastech průmyslu, zdravotnictví, dopravy a školství, významné události z průběhu 19. století a stručný nástin historie města. Dále je zde zmíněna historie Bertillonovy klasifikace, historie klasifikací příčin smrti v českých zemích a také stav zdravotní péče v 2. polovině 19. století na našem území. Druhá část práce zahrnuje statistické zpracování výsledků výzkumu, které bylo vytvořeno na základě Bertillonovy klasifikace, revise 1929. Stejná pozornost zde byla věnována statistice vytvořené na základě zapsaných informací, které ne vždy obsahovaly skutečnou příčinu úmrtí. Výsledky byly prezentovány pomocí tabulek a grafů. Hlavním cílem práce bylo zjištění nejčastěji uváděných příčin smrti u obyvatel města a také spojitosti jednotlivých příčin s pohlavím jedinců.

Klíčová slova: příčiny úmrtí, Nová Paka, statistika, matriky zemřelých

Annotation

Kristýna VODIČKOVÁ, *Causes of Death in the Light of Parish Registers from 1879 to 1889*, Department of Auxiliary Historical and Archival Sciences, Philosophical Faculty, University of Hradec Králové, Hradec Králové 2017. Bachelor thesis.

This thesis was written to analyse the causes of death in Nová Paka between the years 1879–1889. The results are categorized in the subsections by age and sex of the deceased. The aim was to discover the most frequently recorded causes of death and to determine the causes of death through revised Bertillon Classification of Diseases and Causes of Death from 1929th. The first section of this work captures the appearance of Nová Paka in the fields of industry, health care, transportation and education. In this section I also refer to the important events of the 19th century and history of the city. There is also mentioned the history of Bertillon Classification, history of classifications of causes of death in the Czech Republic and the state of health care in the second half of the 19th century in this country. The second section includes statistical analysis of the results of the research which was created based on revised Bertillon Classification from 1929th. Equal attention is devoted to statistics that was produced based on written information in the parish registers which do not always contain the real cause of death. The results are presented in tables and graphs. The primary aim of this thesis was to discover the most frequently recorded causes of death among residents of Nová Paka and connection of the particular causes of death with sex of the individuals.

Key words: causes of death, Nová Paka, statistics, parish registers

OBSAH

ÚVOD.....	9
1 Charakteristika použitých pramenů a zkoumané lokality	11
1.1 Kritika použitých pramenů a literatury	11
1.2 Dějiny Nové Paky.....	13
1.2.1 Události a změny v Nové Pace v 19. století	13
1.2.2 Řemesla a průmysl	15
1.2.3 Zdravotnictví a nemoci.....	16
1.2.4 Doprava	17
1.2.5 Školství.....	18
1.1 Historie Bertillonovy klasifikace.....	19
1.2 Historie klasifikací příčin smrti v českých zemích	19
1.3 Stav lékařství v českých zemích ve 2. polovině 19. století.....	21
2 Prezentace výsledků provedeného výzkumu.....	23
2.1 Metodika zpracování matričních záznamů.....	23
2.2 Rok 1879.....	26
2.2.1 Výsledky pro rok 1879 dle matričních zápisů	26
2.2.2 Výsledky pro rok 1879 dle Bertillonovy klasifikace.....	28
2.3 Rok 1880.....	29
2.3.1 Výsledky pro rok 1880 dle matričních zápisů	29
2.3.2 Výsledky pro rok 1880 dle Bertillonovy klasifikace.....	31
2.4 Rok 1881.....	32
2.4.1 Výsledky pro rok 1881 dle matričních zápisů	32
2.4.2 Výsledky pro rok 1881 dle Bertillonovy klasifikace.....	34
2.5 Rok 1882.....	35
2.5.1 Výsledky pro rok 1882 dle matričních zápisů	35
2.5.2 Výsledky pro rok 1882 dle Bertillonovy klasifikace.....	37
2.6 Rok 1883.....	38
2.6.1 Výsledky pro rok 1883 dle matričních zápisů	38
2.6.2 Výsledky pro rok 1883 dle Bertillonovy klasifikace.....	40

2.7	Rok 1884.....	41
2.7.1	Výsledky pro rok 1884 dle matričních zápisů.....	41
2.7.2	Výsledky pro rok 1884 dle Bertillonovy klasifikace.....	43
2.8	Rok 1885.....	44
2.8.1	Výsledky pro rok 1885 dle matričních zápisů.....	44
2.8.2	Výsledky pro rok 1885 dle Bertillonovy klasifikace.....	46
2.9	Rok 1886.....	47
2.9.1	Výsledky pro rok 1886 dle matričních zápisů.....	47
2.9.2	Výsledky pro rok 1886 dle Bertillonovy klasifikace.....	49
2.10	Rok 1887.....	50
2.10.1	Výsledky pro rok 1887 dle matričních zápisů.....	50
2.10.2	Výsledky pro rok 1887 dle Bertillonovy klasifikace.....	52
2.11	Rok 1888.....	53
2.11.1	Výsledky pro rok 1888 dle matričních zápisů.....	53
2.11.2	Výsledky pro rok 1888 dle Bertillonovy klasifikace.....	55
2.12	Rok 1889.....	56
2.12.1	Výsledky pro rok 1889 dle matričních zápisů.....	56
2.12.2	Výsledky pro rok 1889 dle Bertillonovy klasifikace.....	58
2.13	Shrnutí počtu zemřelých, pohlaví, věkových skupin a úmrtí v jednotlivých měsících roku.....	59
2.14	Shrnutí nejčastějších příčin úmrtí dle skupin Bertillonovy klasifikace.....	60
2.15	Shrnutí nejčastějších nemocí uvedených jako příčina smrti.....	61
2.16	Nejčastější skupiny příčiny úmrtí s ohledem na pohlaví zemřelých.....	62
2.17	Srovnání úmrtnosti v daném období v různých městech Čech.....	63
	ZÁVĚR.....	65
	SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY.....	67
	SEZNAM TABULEK A GRAFŮ.....	69
3	SEZNAM PŘÍLOH.....	78
3.1	Obrazové přílohy.....	78
3.2	Textové přílohy.....	78

ÚVOD

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl statisticky zpracovat příčiny úmrtí v Nové Pace v letech 1879–1889. Autorka zvolila toto zaměření kvůli svým zájmům a názoru, že tato oblast není veřejnosti příliš blízká, dostupná a není jí věnována dostatečná pozornost. Pro zajištění podkladů nutných ke statistickému zpracování je užitá matrika zemřelých pro léta 1878–1905 farního úřadu v Nové Pace, nacházející se v Státním oblastním archivu Zámorsk ve sbírce matrik Východočeského kraje.¹

Město Nová Paka bylo vybráno záměrně, jelikož autorka bydlí v blízkosti a danou lokalitu velmi dobře zná. Časové rozmezí let 1879–1889 zvolila z toho důvodu, že se jedná o období celoplošného rozvoje průmyslu ale právě také lékařství, které se na konci 19. století výrazně promítalo do úmrtnosti obyvatelstva. Důležitým faktorem je také existence několika bakalářských prací týkajících se příčin úmrtí na konci 19. století a s tím spojené možnosti porovnání mortality obyvatelstva v jednotlivých částech Čech.

Cílem této bakalářské práce bude zjištění:

1. nejčastěji uváděných příčin úmrtí novopackého obyvatelstva v letech 1879–1889 obecním lékařem;
2. nejčastějších příčin úmrtí stanovených Bertillonovou klasifikací;
3. poměru zemřelých dle věkových kategorií a pohlaví;
4. spojitosti příčin úmrtí s pohlavím zemřelých;
5. podobnosti či odlišnosti výsledků výzkumu s jinými městy na českém území.

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. První z nich je zaměřena na charakteristiku pramenů použitých pro zpracování této práce. Dále se zabývá popsáním historie města Nové Paky, jejím vývojem v oblastech průmyslu, školství, lékařství a dopravy. Stejně jako vývoj města jsou zde také popsány pokroky v lékařství českých zemí v 2. polovině 19. století, historie Bertillonovy klasifikace, která je užitá jako zásadní pramen pro zpracování statistických údajů a v neposlední řadě také historii klasifikace příčin úmrtí na území českých zemí.

¹ SOA Zámorsk, fond Sbírk matrik Východočeského kraje 1587–1949, Farní úřad Nová Paka, Matrika zemřelých 1878–1905, inv. č. 6553, kniha č. 6553.

V druhé části je popsána metodika zpracování matričních záznamů a poté následují výsledky výzkumu práce. Pro každý zkoumaný rok jsou vytvořeny dvě kapitoly, přičemž první z nich obsahuje nejčastější příčiny smrti, které uvedl lékař při ohledání zemřelého. V druhé z nich jsou potom tyto příčiny úmrtí začleněny do skupin a jednotlivých nemocí stanovených Bertillonovou klasifikací. Každá tato kapitola obsahuje nejčastěji evidované příčiny smrti v daném roce obecně a dále potom v jednotlivých věkových kategoriích. Výsledky jsou podpořeny vytvořenými tabulkami a grafy, které vznikly na základě zápisů uvedených v matrice zemřelých.

Práce taktéž obsahuje přílohovou část, která je složena z ukázek jednotlivých klasifikací příčin smrti užívaných na našem území a také první verze Bertillonovy klasifikace nemocí a příčin smrti. Stejně tak jsou zde uvedeny skupiny příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace², revise z roku 1929, na jejímž obsahu je z velké části postavena bakalářská práce. V této části je k nalezení ukázka z matriky zemřelých, která je užitá pro výzkum a následné statistické zpracování, dobové fotografie města a dále několik dokumentů týkajících se úmrtí osob, lékařské péče a epidemie v Nové Pace. V přílohách je k nalezení také přepis matričních záznamů využitých pro zpracování statistických údajů.

² *Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti*, Bertillon, revise 1929, Praha 1934.

1 Charakteristika použitých pramenů a zkoumané lokality

1.1 Kritika použitých pramenů a literatury

Stěžejním zdrojem informací pro vypracování této bakalářské práce byla matrika úmrtí pro farní úřad římskokatolické církve v Nové Pace (Příloha 1).³ Zápisy uvedené v knize pocházejí z let 1878–1904. Záznamy byly vedeny dobře čitelnou humanistickou kurzívou. Užívaným jazykem byla čeština, v případě některých nemocí byly použity latinské názvy. Za dobu zkoumání byly záznamy zapisovány 2 osobami. Prvním písařem byl farář Jan Vošoust, který byl roku 1884 vystřídán farářem Janem Fidlerem.

Záznamy byly vedeny do předtištěného českého formuláře, který byl složen z 8 rubrik, a to: den úmrtí, místo úmrtí, číslo domu⁴, jméno, stav a rodiště zemřelého, náboženství, pohlaví, stáří a nemoc a způsob úmrtí.

U zemřelých jedinců bylo ve většině případů uvedeno, kdo je pohřbil. Mezi lety 1879–1889 pohřbívali v Nové Pace kaplani August Žďárský a Václav Křídlo, faráři Jan Vošoust a Josef Fidler, kooperátoři⁵ František Dohnálek a Václav Kysela, kněz na odpočinku Vojtěch Stifter a městský hrobník. Taktéž se často uvádělo, kdo zemřelým osobám udělil svátost. Tato informace se však nevyskytovala u tolika případů, jelikož některé osoby zaopatřené nebyly vůbec a jiné byly zaopatřeny v jiném městě. V matrice byli jako zaopatřovatelé vedeni kaplani August Žďárský a Václav Křídlo, katecheta Antonín Svoboda, faráři Jan Vošoust a Josef Fidler, kooperátor František Dohnálek a kněz na odpočinku Vojtěch Stifter.

Dalším užitým pramenem se staly ohledací lístky⁶, které byly v době zkoumání vedeny ve více podobách. V některých případech se jednalo o předtištěné formuláře (Příloha 2), jindy byl celý lístek napsán ručně (Příloha 3). Předtištěný lístek obsahoval informace o jménu a příjmení, stavu, místu narození, náboženství, stáří, místu bydliště, poslední nemoci, dni a hodině úmrtí a dni a hodině pohřbu zemřelého. Dále zde bylo možné uvést informaci o hojivším lékaři či ranhojiči. Každý úmrtní lístek obsahoval

³ SOA Zámorsk, fond Sběrka matrik Východočeského kraje 1587–1949, Farní úřad Nová Paka, Matrika zemřelých 1878–1905, inv. č. 6553, kniha č. 6553.

⁴ Jednalo se o místo úmrtí osoby, nikoli trvale bydliště, jelikož zde v mnoha případech bylo uvedeno číslo nemocnice.

⁵ Jiný výraz pro kaplana.

⁶ SOkA Jičín, fond Farní úřad Nová Paka, Ohledací lístky, kart. č. 35–37.

informaci o datu a místě vystavení, podpis osoby ohlízející zemřelého a pořadové číslo lístku. Po přezkoumání matričních záznamů a úmrtních lístků jsem zjistila, že ne všechny osoby, pro které byl lístek vystaven, byly uvedeny i v matrice zemřelých.

Podstatná byla literatura, která se zabývala podobou města ve zkoumané době. Velmi užitečné byly 2 díly z vlastivědné monografie Novopackého okresu, a to díl II.⁷ a III.⁸ Obě publikace obsahovaly veškeré informace týkající se historie Nové Paky, geografie a dalších oblastí. Dále obsahovaly fotografické přílohy podoby města. Doplňující informace poskytly knihy Zdeňka Beneše⁹, Josefa Berana¹⁰ či Františka Jirůtky.¹¹ Ohledně školství v Nové Pace byla užitečným zdrojem kniha Petra Vostatka.¹²

Taktéž jsem do bakalářské práce zahrнула kapitulu týkající se lékařství v českých zemích, která byla postavena na poznatcích z knihy Petra Svobodného a Ludmily Hlaváčkové¹³ a také Jana K. Strítěského.¹⁴

Pro tvorbu statistických údajů a pro studium historie klasifikací příčin úmrtí pro mne byla hlavním zdrojem informací kniha Vladimíra Srba a Václava Haase.¹⁵ K porovnání výsledků zkoumání s jinými městy Čech jsem čerpala z bakalářských prací Martina Vašaty¹⁶, Petry Novotné¹⁷ a Pavla Veselého.¹⁸

Pro samotné určování příčin smrti a zpracování statistických údajů jsem využila Bertillonovu klasifikaci, revisi z roku 1929 (Příloha 4).¹⁹

⁷ Novopacko: *Vlastivědná monografie okresu, díl II.*, Nová Paka 1927.

⁸ Novopacko: *Vlastivědná monografie okresu, díl III.*, Nová Paka 1929.

⁹ Zdeňk BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I. (do roku 1939)*, Praha 2012.

¹⁰ Josef BERAN, *Paměti města Nové Paky*, Praha, 1871.

¹¹ František JIRŮTKA, *Okres novopacký v dějinách národních*, Jičín 1898.

¹² Petr VOSTATEK, *Stav obecného školství na Hořicku a Novopacku roku 1869*, Hořice 1929.

¹³ Petr SVOBODNÝ – Ludmila HLAVÁČKOVÁ, *Dějiny lékařství v českých zemích*, Praha 2004.

¹⁴ Jan K., STRÍTESKÝ, *Zdravotní a populační vývoj československého obyvatelstva*, Praha 1971.

¹⁵ Vladimír SRB – Václav HAAS, *Statistika příčin smrti a statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti v Československu*, Praha, 1956.

¹⁶ Martin VAŠATA, *Příčiny úmrtí královéhradeckého obyvatelstva ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909*, bakalářská práce, na KPVHA UHK, Hradec Králové 2014.

¹⁷ Petra NOVOTNÁ, *Příčiny úmrtí v Novém Bydžově v letech 1885–1895 ve světle matričních zápisů*, bakalářská práce, na KPVHA UHK, Hradec Králové 2016.

¹⁸ Pavel VESELÝ, *Statistické zpracování příčin úmrtí v Kladně a Kroměříži podle matrik zemřelých z let 1883–1889*, bakalářská práce, na KPVHA UHK, Hradec Králové 2012.

¹⁹ *Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti*, Bertillon, revise 1929, Praha 1934.

1.2 Dějiny Nové Paky

Nová Paka je město ležící v Královéhradeckém kraji, v blízkosti Krkonoš a chráněné krajinné oblasti Český ráj. Při sčítání obyvatel v roce 2011 zde žilo 9222 jedinců.²⁰ Nová Paka byla založena pravděpodobně na konci 13. nebo na počátku 14. století, kdy platila za jediné středisko řemeslné i obchodní živnosti na Kumburském panství.²¹ První písemná informace o městě pochází z 11. října 1357, kdy je v konfirmační knize pražského arcibiskupství uvedeno, že byl ke kostelu v Mladé Pace přidělen kněz Pavel.²² Z téhož dokumentu se dozvídáme, že se jednalo o poddanské město, jehož prvním doloženým pánem byl Beneš z Vartenberka.²³ Tento rod držel Kumburské panství ve svém vlastnictví až do roku 1406, kdy jej převzal Hynek z Lichtenburka z rodu Ronovců, od kterého okolo roku 1524 odkoupil panství rod Trčků z Lípy.²⁴ Roku 1607 bylo panství prodáno rodu Smiřických ze Smiřic.²⁵ Dalším majitelem se stal Albrecht z Valdštejna, který zastupoval posledního z rodu Smiřických, Jindřicha Jana, čímž se v roce 1621 stalo Kumburské panství součástí Frýdlantského vévodství.²⁶ Po Valdštejnově vraždě (1634) byl jeho majetek zkonfiskován a roku 1636 se darovací listinou Ferdinanda II. dostala Nová Paka do majetku hraběte Rudolfa z Tiefenbachu. Posledním rodem, který toto panství vlastnil, byli Trauttmansdorfové, kteří ho koupili roku 1709 a drželi jej až do roku 1848, kdy panství zanikla.²⁷

V druhé polovině 19. století prošlo město mnohými změnami ve všech oblastech, ostatně tak se dělo po celém českém území. V následujících kapitolách se budu podrobněji věnovat vývoji města a jeho okolí v dané oblasti.

1.2.1 Události a změny v Nové Pace v 19. století

Roku 1814 byl v Nové Pace zřízen nový vodovod, který vedl z jedné ze 2 studní, které městu náležely. Bohužel ani jedna z nich nesplňovala hygienické

²⁰ Geografické údaje – Nová Paka, oficiální web města. Dostupné z: <http://www.munovapaka.cz/geograficke-udaje/ds-8560/p1=13357> [cit. 28. 11. 2016].

²¹ *Novopacko: díl III.*, s. 224.

²² Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 13.

²³ Tamtéž, s. 34.

²⁴ Tamtéž, s. 38–47.

²⁵ J. BERAN, *Paměti města Nové Paky*, s. 28.

²⁶ Tamtéž, s. 30.

²⁷ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 54–56.

podmínky, a tak byly v pozdějších letech obě studny zasypány. Původní vodovod zde fungoval již v době středověku, avšak datace není známá. Jednalo se o dřevěné otevřené potrubí, které svádělo vodu ze skal do kašny na náměstí.²⁸ V roce 1827 město zachvátil požár.²⁹ Od roku 1836 zde fungovala celní stráž a v roce 1842 byly vytvořeny katastrální mapy a výměry pozemků města.³⁰ Od 17. března 1849, kdy byl vydán prozatímní obecní zákon, připadala Nová Paka k Jičínskému kraji, Hořickému podkraji a stala se centrem okresu, ve kterém se nacházel okresní soud (fungoval od jara 1850) a berní úřad (fungoval od 1. listopadu 1849). Na základě této změny se zlepšilo postavení města a začali přicházet noví obyvatelé.³¹ Roku 1850 byla ve městě zřízena četnická stanice.³² Kromě těchto změn se v roce 1855 přesunula do Nové Paky i politická správa.³³ Roku 1858 vyhořel bývalý klášter.³⁴ Další novinkou bylo zavedení telegrafu, který byl uveden do provozu v roce 1864.³⁵ V období prusko-rakouské války se Novopacko setkalo s mnoha průchody vojsk. Naštěstí se zde neodehrála žádná bitva, ale i tak město přišlo k úhoně, jako bylo zabrání potravin a další. Celkové škody byly po válce v Nové Pace vyčísleny na 1500 zlatých. Velmi výhodné pro novopacké občany po skončení války však bylo, že díky otevření hranic mohli cestovat do Pruska, kde nakupovali potraviny (cukr, káva, sůl, koření, tabák) za mnohem nižší ceny, než ve své domovině.³⁶ Od roku 1870 započala svou činnost Okresní vzájemná pojišťovna požární v Nové Pace.³⁷ V roce 1883 byla zavedena živnostenská společnost, která vedla k postupnému vymizení cechů, které ještě dožívaly.³⁸ Bylo taktéž nutné, aby byl ve městě zřízen sirotčinec, což se stalo v roce 1892.³⁹

Počet obyvatel Nové Paky byl zachycen v několika sčítáních obyvatel. K roku 1869 stálo ve městě 392 domů a žilo zde 3501 jedinců. V roce 1880 stoupl počet domů na 404 a počet obyvatel na 3679. Roku 1890 v Nové Pace stálo 408 domů a žilo zde

²⁸ *Novopacko: díl III.*, s. 637–638.

²⁹ J. BERAN, *Paměti města Nové Paky*, s. 59–68.

³⁰ F. JIRŮTKA, *Okres novopacký v dějinách národních*, s. 39.

³¹ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 167–169.

³² *Novopacko: díl III.*, s. 357.

³³ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 168.

³⁴ J. BERAN, *Paměti města Nové Paky*, s. 90.

³⁵ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 217.

³⁶ Tamtéž, s. 183–197.

³⁷ *Novopacko: díl III.*, s. 306.

³⁸ Tamtéž, s. 247.

³⁹ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 234.

3965 jedinců. Od 80. let se však nárůst počtu obyvatel zpomaloval, jelikož mnoho lidí odcházelo do větších měst.⁴⁰

Ve 2. polovině 19. století vznikalo ve městě mnoho spolků, jako například Tělocvičná jednota Sokol (1862), Občanská beseda (1879), Řemeslnicko-živnostenská beseda (1879) a mnoho dalších, kde se sdružovalo místní obyvatelstvo.

1.2.2 Řemesla a průmysl

Od poloviny 19. století začaly být na Novopacku užívány první stroje na zpracování vlny (stávky, pletací stroje) a postupně se ze lnářů, vlnářů a bavlnářů stala rozhodující složka místního průmyslu.⁴¹ Dne 30. března 1857 vznikl ve městě rukodílný závod Jana, Hynka a Františka Klazarových z Roztok, který zaměstnával více než sto lidí z okolí Nové Paky.⁴² V roce 1862 byla Karlem Záhorským zřízena mechanická tkalcovna se 156 kovovými stavy. Mezi lety 1875–1884 zde existovala přádelna na len, zřízená Ezechielem Fischlem a od roku 1884 ve městě začala fungovat textilka Bohuslava Schnabela. Posledně jmenovaný muž začal postupně spojovat podniky v Nové Pace, a vybudoval tak největší místní firmu, která v době svého největšího uplatnění zaměstnávala více než sto zaměstnanců, které tvořily převážně ženy⁴³. Další pracovní podniky, které se na území Nové Paky nacházely, byly továrna H. Kertschmera a firma Hoffmann a spol.⁴⁴ Taktéž místní klášter sloužil jako pracovní dílna. Část objektu byla koupena Františkem Votočkem a až do požáru kláštera (13. dubna 1858) byli v tamějších refektářích zaměstnáváni tkalci. Dále se v prostorách kláštera do roku 1870 provozovalo barvířství a tiskařství.⁴⁵ Posledním podnikem, který zde zmíníme, je Novopacký pivovar, který byl v roce 1870 založen jako akciová společnost, a roku 1872 byl uveden do provozu.⁴⁶

⁴⁰ *Novopacko: díl III.*, s. 227–229.

⁴¹ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 136–138.

⁴² *Novopacko: díl II.*, s. 707.

⁴³ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 214.

⁴⁴ Tamtéž, s. 215.

⁴⁵ *Novopacko: díl II.*, s. 710–719.

⁴⁶ Miloslav BAŘINA, *Z historie podnikání na Novopacku*, Achát 10, 2010, s. 25.

1.2.3 Zdravotnictví a nemoci

V každém městě bylo nutné zajistit zdravotní péči pro obyvatelstvo. První světský lékař v Nové Pace se jmenoval Jan Fuchs a působil zde od roku 1732. V Nové Pace fungovala již od roku 1757 lékárna, jež byla pravděpodobně zřízena pavlány, kteří byli nejspíše taktéž prvními doktory v Nové Pace a kteří sídlili v místním klášteře. Jejich lékárna zahrnovala i zahradu, ve které byly pěstovány léčivé byliny. Byla však v roce 1790 odkoupena.⁴⁷ Od roku 1792 poté fungovala v ulici pod klášterem a byla majetkem Josefa Geislera.⁴⁸ V roce 1779 byly zřízeny první lázně. Roku 1872 okresní zastupitelstvo koupilo část kláštera, kterou upravilo pro nemocniční potřeby, a v roce 1873 vznikla okresní nemocnice, jež se v roce 1875 stala nemocnicí okresní veřejnou čítající 22 lůžek. Do roku 1882 byl počet lůžek navýšen na 66 lůžek do roku 1898 na 77.⁴⁹ V roce 1889 byl rozšířen hřbitov u kapličky, obehnan zdi, opatřen pitevnou a bytem hrobníka.⁵⁰

První doložená epidemie moru v Nové Pace proběhla roku 1586.⁵¹ Následkem toho zemřela polovina novopackého obyvatelstva.⁵² Další mor propukl v roce 1625 a zabil 390 osob.⁵³ Vzhledem k tomuto počtu zemřelých byl ve městě vybudován nový hřbitov.⁵⁴ Následující epidemie se objevila v roce 1697 a vyžádala si 820 mrtvých. Tyfus a mor přišly také v letech 1728, 1733 a 1747 poté, co Novou Paku zasáhly povodně. Pravděpodobně tyfus zasahuje město v roce 1758 a roku 1762 propuká další epidemie, tentokrát nespecifikované choroby. V roce 1772 na černý mor umírá 252 obyvatel.⁵⁵ V létě 1832 se v Nové Pace objevila cholera. Roku 1847 začal ve městě upadat průmysl, zdražovat potraviny a rozšířila se bída a s ní i epidemie břišního tyfu.⁵⁶ Po průchodu pruských vojsk okolím Nové Paky propuká v roce 1866 epidemie cholery.⁵⁷

⁴⁷ *Novopacko: díl II.*, s. 407–416.

⁴⁸ Miloslav BAŘINA, *Z historie podnikání na Novopacku*, Achát 11, 2010, s. 27.

⁴⁹ *Novopacko: díl II.*, s. 407–416.

⁵⁰ Tamtéž, s. 471.

⁵¹ Tamtéž, s. 661.

⁵² F. JIRŮTKA, *Okres novopacký v dějinách národních*, s. 18.

⁵³ *Novopacko: díl III.*, s. 661.

⁵⁴ F. JIRŮTKA, *Okres novopacký v dějinách národních*, s. 20.

⁵⁵ *Novopacko: díl III.*, s. 661–662.

⁵⁶ J. BERAN, *Paměti města Nové Paky*, s. 72–81.

⁵⁷ F. JIRŮTKA, *Okres novopacký v dějinách národních*, s. 43.

Nejhorší epidemie v 2. pol. 19. století v novopackém okrese vypukla v roce 1850, jednalo se o cholery, která zabila 423 osob. Dále proběhly epidemie spály (1878, 1880, 1883, 1885, 1890, 1898), záškrtu (1888, 1889, 1890–1895, 1898–1899), neštovic, na které v roce 1873 zemřelo 16 osob, cholery a úplavice.⁵⁸ Neštovice se objevily také v roce 1889, kdy je doložena zpráva městského lékaře, který požaduje uzavření škol, pro zabránění šíření další nákazy (Příloha 5).

Ve mnou zkoumaném období se v Nové Pace vystřídali dva lékaři. V letech 1861–1878 zde působil Jan Kejzlar, chirurg, který v místní nemocnici vykonával i operace. Od roku 1886 byl městským lékařem a primářem nemocnice MUDr. Václav Matys (Příloha 6).⁵⁹

1.2.4 Doprava

Velká část silnic v okolí města byla budována především v 1. polovině 19. století a po roce 1865 se z nich staly silnice okresní.⁶⁰ Silnice do Jičina byla budována od roku 1812.⁶¹ Následně, v roce 1845, vznikla silnice mezi Novou a Starou Pakou.⁶² Na konci 50. let začaly být v blízkosti Nové Paky taktéž budovány železniční tratě, díky nimž ve městě došlo k postupnému úpadku formanského řemesla a významu poštovního úřadu. Železniční spojnice mezi Libercem a Pardubicemi byla budována od roku 1857 a byla dostavěna 1859.⁶³ V letech 1869–1870 proběhlo zbudování železniční trati chlumecko-poříčské, která vedla přímo přes město a veřejnosti byla otevřena roku 1871.⁶⁴ Pro tehdejší dobu bylo velmi důležité, aby v okolí dopravních komunikací byly zájezdní hostince, které by poskytly cestujícím osobám přístřeší a další služby. V okolí města fungovalo takovýchto zařízení celkem pět: v Nové Pace Nová Hospoda, na

⁵⁸ *Novopacko: díl III.*, s. 663–667.

⁵⁹ *Tamtéž*, s. 653–654.

⁶⁰ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 142–143.

⁶¹ J. BERAN, *Paměti města Nové Paky*, s. 62.

⁶² F. JIRŮTKA, *Okres novopacký v dějinách národních*, s. 39.

⁶³ J. BERAN, *Paměti města Nové Paky*, s. 147–149.

⁶⁴ *Novopacko: díl III.*, s. 316.

Vrchovině Kamarytova hospoda a na Kumburském Újezdě hostinec Na Špici, hostinec na severním konci Újezda a hostinec u školy, který však v roce 1878 vyhořel.⁶⁵

1.2.5 Školství

V 19. století patřily novopacké školy k těm nejlepším v regionu nejen v oblasti výuky, ale taktéž budov. V dané době byla budova Národní školy jedna ze dvou dvoupatrových škol v regionu.⁶⁶ Od roku 1863 byla stavěna nová školní budova, ve které byla od roku 1865 hlavní škola, která však 1870 zanikla.⁶⁷ Roku 1869 fungovala ve městě čtyřtřídní škola, na které působili 4 učitelé a samostatný katecheta.⁶⁸ Vzhledem k tomuto personálnímu obsazení se jednalo o jeden z nejkvalifikovanějších učitelských sborů v novopackém okrese. K roku 1869 bylo v Nové Pace evidováno 504 dětí povinných školní docházkou.⁶⁹ O 3 roky později, přesněji 15. května 1872, odsouhlasila rada zřízení chlapecké měšťanské školy. Samostatná dívčí škola potom byla zřízena v roce 1884. Poslední proměnou v oblasti školství do konce 19. století bylo v roce 1885 zřízení Živnostenské školy pokračovací.⁷⁰

⁶⁵ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 142–146.

⁶⁶ Tamtéž, s. 201–205.

⁶⁷ *Novopacko: díl III.*, s. 381–403.

⁶⁸ Z. BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I.*, s. 201–205.

⁶⁹ P. VOSTATEK, *Stav obecného školství na Hořicku a Novopacku roku 1869*, s. 41.

1.1 Historie Bertillonovy klasifikace

Pro vedení statistik příčin úmrtí bylo nutné evidovat veškeré zemřelé na základě jednotné klasifikace. Jednotlivé státy však měly převážně vlastní klasifikaci příčin úmrtí, přičemž se od ostatních zemí lišily. Bylo tedy nutné vytvořit klasifikaci, která by měla mezinárodní charakter. Základy Bertillonovy mezinárodní klasifikace byly položeny roku 1891 ve Vídni, kde Mezinárodní statistický úřad zadal úkol vytvořit několik variant nové klasifikace příčin smrti, které by měly rozdílný rozsah. Vedoucí osobou celé tvorby byl Dr. Jacques Bertillon. Vypracované podklady byly předloženy roku 1893 v Chicagu. Při tvorbě této nové klasifikace byly použity základy z městské klasifikace Paříže a z mnoha klasifikací příčin smrti německým, anglickým, italským a švýcarským. Byly předloženy 3 návrhy a jeden z nich přijat. Bertillonova klasifikace počíná tedy rokem 1893, kdy se skládala ze 14 skupin příčin úmrtí (Příloha 6). Postupně byla přijata velkým počtem států ale bylo i mnoho těch, které užívaly původních klasifikací.

Roku 1899 bylo na schůzi Mezinárodního statistického ústavu v Oslu stanoveno, že každých 10 let bude klasifikace revidována a doplňována o nové poznatky. Stejně tak vyzývala státy, aby tuto klasifikaci začaly užívat. První revise proběhla roku 1900, další revise potom v letech 1909, 1920, 1929, 1938.

Roku 1948 proběhla 6. revise Bertillonovy klasifikace, kdy Světová zdravotní organizace vytvořila „Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti“⁷¹, která od té doby vyšla již v 10. revizi.⁷²

1.2 Historie klasifikací příčin smrti v českých zemích

Klasifikace příčin smrti a jejich statistické zpracování bylo v českých zemích vedené od doby, kdy začala být tvořena statistika pohybu obyvatelstva, tedy od roku 1785.

⁷¹ V. SRB – V. HAAS, *Statistika příčin smrti a statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti v Československu*, s. 14–18.

⁷² *Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Desátá revise obsahová aktualizace k 1. 4. 2014, technické opravy k 1. 3. 2017*, Praha 2013, s. 20–21.

První klasifikace příčin úmrtí byla zavedena roku 1784, když byl vydán josefínský patent, který uváděl do provozu tři typy knih, jež odděleně evidovaly narození, úmrtí a sňatky.⁷³ U zemřelých jedinců byla uváděna příčina smrti. V této době existovaly 2 kategorie příčiny úmrtí a to nemoc a násilná smrt. Mezi nemocemi se rozlišovaly nemoci obvyčejné, místní a epidemické a u násilných smrtí byly podkategoriemi úraz, sebevražda a vražda.

K úpravě klasifikace došlo vydáním dvorského dekretu v roce 1828, kdy bylo zavedeno povinné vedení ročních výkazů pro matrikáře. Skupina nemocí zůstala neměnná, ovšem u násilných smrtí přibýly skupiny pokousání a poprava.

Roku 1851 vydalo ministerstvo vnitra výnos, kterým byly zavedeny podrobnější formuláře, než ty, užívané od roku 1828. Ve skupině nemocí přibýly cholera, neštovice a následky těžkých porodů, přičemž poslední kategorie zahrnovala jak rodičky, tak novorozence. U smrtí násilných byla zrušena skupina úrazů a naopak přibýly neštěstí a zabití. V této etapě se již ve statistikách odráželo také pohlaví zemřelých.

Do dalšího vývoje se promítlo schválení říšského zdravotního zákona v roce 1870. Na jeho základě měli lékaři povinnost vést roční a později čtvrtletní výkazy o počtu zemřelých a příčinách smrti. K tomuto účelu vznikla nová klasifikace příčin úmrtí, a to výnosem ministerstva vnitra v roce 1871. V této formě již existovalo 17 podskupin v kategorii nemoci a 4 podkategorie smrtí násilných (Příloha 7). S postupem let byly kategorie doplňovány o nemoci či násilné smrti, které se vyskytovaly ve větším množství. V únoru 1895 vydalo ministerstvo vnitra výnos, kterým rušilo dvojkolejnost tvorby výkazů a zavedlo a zkvalitňovalo vedení statistik matrikáři. Ti již neměli vést souhrnné formuláře, ale každý případ měl být zaznamenán samostatně. Výnos z roku 1895 také obsahoval nové schéma určování příčin úmrtí, které zahrnovalo celkem 25 kategorií (Příloha 8).⁷⁴ Tato poslední šablona pro určování příčin smrti byla platná až do roku 1918, kdy byla přijata Bertillonova klasifikace.

⁷³ Jaroslav ČERNÝ, *Vývoj matričního záznamu z hlediska uvádění úmrtní diagnózy*, Genealogické a heraldické listy 2, 1993, s. 19–20.

⁷⁴ V. SRB – V. HAAS, *Statistika příčin smrti a statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti v Československu*, Praha 1956, s. 28–31.

1.3 Stav lékařství v českých zemích ve 2. polovině 19. století

V porovnání s předchozími časy lze v této době již hovořit o poměrně vysoké úrovni hygieny obyvatel. Velmi dobře už fungovaly kanalizace, byla řešena čistota vody, v případě propuknutí nakažlivé nemoci následovala karanténa, přičemž toto je jen několik ukázek pokroku dané doby. Kromě toho byly zakládány ve velkém počtu nemocnice, v mnoha případech i soukromé. Mimo nárůstu počtu nemocnic se rozvíjela i specializovanost jednotlivých pracovišť nemocnic a velkému úspěchu se těšilo budování psychiatrických ústavů (Kosmonosy, Dobřany). Pro porovnání v Čechách k roku 1848 fungovalo 36 nemocnic a v roce 1870 jich existovalo již 107. V posledním čtvrtletí 19. století se začaly rozmáhat velkoobchodní lékárenské společnosti, které z trhu postupně vytlačily soukromníky. Tento čas se také vyznačuje častějším konáním lékařských kongresů. S pokrokem medicíny dále vzrůstaly kladné ohlasy laiků na lékaře, kteří byli dlouhou dobu vnímání velmi negativně. Postupně začaly vznikat ordinace doktorů, a to především ve městech, zatímco na vesnicích pravděpodobně stále docházeli k nemocným do domů. V těchto 50 letech se také velmi rozmohla vakcinace proti různým chorobám, která se stala předmětem mnoha debat a ve výsledku pomohla k odstranění několika, do této doby, smrtelných chorob.

Velkou změnou v oboru bylo roku 1851 zavedení povinného hlášení o příčině smrti. V roce 1865 započal výzkum týkající se názoru na reformu veřejného zdravotnictví.⁷⁵ Vzhledem k výsledkům byl 30. dubna 1870 přijat celoříšský zákon č. 68 o veřejné zdravotní službě, který stanovoval posloupnost lékařů, přičemž nejnižším článkem byl okresní lékař. Kvůli národnostním problémům a téměř nulové aktivitě českých lékařů, co se vzniku zákona týče, nebyl na našem území nijak výrazně brán v potaz. Avšak tento zákon se stal v pozdějších letech základem pro vydání zemských zdravotních zákonů pro Moravu (1884) a Čechy (1888). Moravský zákon upravoval především síť zdravotních orgánů, zdravotní obvody a také okresní a obvodní lékaře.⁷⁶ Zemský zákon pro Čechy upravoval fungování lékařské péče v obcích, přičemž obce s počtem obyvatel vyšším než 6000 měly povinnost mít obecního lékaře, zatímco obce s nižším počtem obyvatel vytvořily sdružení a platily

⁷⁵ P. SVOBODNÝ – L. HLAVÁČKOVÁ, *Dějiny lékařství v českých zemích*, Praha 2004, s. 120–145.

⁷⁶ J. STRÍTESKÝ, *Zdravotní a populační vývoj československého obyvatelstva*, Praha 1971, s. 60–62.

lékaře obvodního. V prosinci roku 1887 byl přijat zákon o povinném úrazovém pojištění všech dělníků a výkonných úředníků v továrnách, hutích dolech apod. a o 3 měsíce později také zákon o nemocenském pojištění. Ten ukládal povinnost pojištění osob, které spadaly pod živnostenský řád (1859). Tyto dva zákony výrazně ovlivnily stav zdravotní péče na našem území, jelikož poskytovaly podporu nejohroženější skupině osob – dělníkům.

V letech 1855–1866 proběhla epidemie cholery na celém českém území. Mezi lety 1872–1873 propukla epidemie neštovic, která postihla nejen osoby neočkované, ale také ty, které byly vakcinovány před dlouhou dobou.⁷⁷ Vzhledem k této epidemii se rozhořela debata, kdy se lékaři rozcházeli v názorech o účinnosti či neúčinnosti očkování proti neštovicím. Bylo založeno mnoho spolků vystupujících proti vakcinaci.⁷⁸ Další odezvou bylo zavedení povinného očkování dětí školního věku, čímž se podařilo do konce století neštovice vymýtit.⁷⁹ Stalo se tak díky novému typu vakcíny, který byl oproti původnímu živočišného původu.⁸⁰ V 70. letech taktéž propukla epidemie záškrtu, přičemž jeho výskyt od té doby podléhal povinnému hlášení. Roku 1882 objevil Robert Koch původce tuberkulózy, která však nebyla lékaři ani laiky považována za nakažlivou a tak se počet zemřelých do konce 19. století nesnižoval. Původce záškrtu byl odhalen v roce 1883, ve stejném roce byla vyvinuta vakcína a úmrtnost začala rapidně klesat. V posledních 25 letech 19. století začal také klesat výskyt břišního tyfu, a to díky lepšímu diagnostikování choroby a následným izolačním opatřením.⁸¹ Od roku 1885 začal narůstat výskyt rakoviny, avšak jednalo se pouze o ty typy, které byly tehdejší medicíně při ohledání či pitvě přístupné.

⁷⁷ P. SVOBODNÝ – L. HLAVÁČKOVÁ, *Dějiny lékařství v českých zemích*, Praha 2004, s. 119–128.

⁷⁸ Jiří BRDLÍK, *Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval*, Praha 1957, s. 54–57.

⁷⁹ P. SVOBODNÝ – L. HLAVÁČKOVÁ, *Dějiny lékařství v českých zemích*, Praha 2004, s. 121.

⁸⁰ V. SRB – V. HAAS, *Statistika příčin smrti a statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti v Československu*, Praha 1956, s. 69–70.

⁸¹ J. STRÁTESKÝ, *Zdravotní a populační vývoj československého obyvatelstva*, Praha 1971, s. 66–68.

2 Prezentace výsledků provedeného výzkumu

2.1 Metodika zpracování matričních záznamů

Tato bakalářská práce mapuje příčiny úmrtí osob, které zemřely v Nové Pace a jejichž smrt byla evidována v matrice zemřelých 1879–1905. Před interpretací výsledků výzkumu je nutné popsat způsob zpracování matričních záznamů.

Veškeré matriční zápisy byly přepsány do programu Microsoft Office Excel, přičemž byly z každého záznamu zapsány tyto informace:

- rok, měsíc a den úmrtí
- jméno a příjmení
- pohlaví
- stáří
- příčina smrti

Pro statistiku příčin úmrtí nebylo podstatné uvádění dalších dat, která se v matrice nacházela, a to:

- datum pohřbu
- číslo domu místa úmrtí
- zaměstnání
- místo narození
- rodinný stav
- jméno zaopatřující osoby
- jméno pohřbívající osoby
- náboženství
- datum ohledání mrtvoly
- číslo úmrtního lístku

Kvůli jednodušší tvorbě statistických údajů jsem matriční záznamy doplnila o:

- věk zemřelého, zaokrouhlený na měsíce, převedený na desetinné číslo
- číslo příčiny úmrtí dle Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin úmrtí, revise z roku 1929

- číslo skupiny příčiny úmrtí dle Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin úmrtí, revise z roku 1929
- dodatečné vytvoření skupiny pro mrtvě narozené děti, jelikož Bertillonova klasifikace tuto skupinu nezahrnuje

V první části práce jsem zpracovala data z matriky v takovém stavu, v jakém byla zapsána a dle toho vytvořila statistiky nejčastěji evidovaných příčin smrti v jednotlivých letech a věkových kategoriích. Zde se jako příčiny smrti často objevovaly pouze doprovodné jevy skutečné choroby. V druhé části jsem veškeré záznamy zpracovala dle Bertillonovy klasifikace a na základě těchto údajů jsem poté vytvořila statistiku nejčastěji evidovaných skupin příčin úmrtí v daných letech a věkových skupinách.

V mnoha případech se v matrice vyskytla situace, kdy byla jedna příčina úmrtí označována různými názvy. Vzhledem k nutnosti vytvoření statistických údajů bylo třeba tato pojmenování sjednotit. K tomuto účelu jsem využila Mezinárodní klasifikaci nemocí a příčin úmrtí, revisi z roku 1929, díky které jsem mohla jednotlivé příčiny úmrtí označit číslem skupiny a dále také číslem nemoci, které zemřelý podlehl. Pro sjednocení názvů mi pomohla literatura vydaná krátce po zkoumaném období⁸² a genealogické stránky.⁸³

V případě, že uvedenou příčinu smrti nebylo možné nahradit názvem nemoci stanoveným Mezinárodní klasifikací nemocí a příčin smrti, byla zařazena do poslední skupiny stanovené Bertillonem, a to Neurčité příčiny úmrtí. Jednalo se především o doprovodné jevy skutečné diagnózy (vodnatelnost, vrhnutí krve, chrlení krve aj.).

V mnoha případech se také stalo, že nebyla uvedena pouze jedna příčina smrti, ale bylo zapsáno více chorob, které mohly vést k úmrtí jedince. V této situaci bylo nutné identifikovat a pro statistické zpracování zaznamenat hlavní příčinu smrti. V této situaci jsem využila pravidlo: *„Vychází se z předností zevních příčin před všemi ostatními, z předností infekčních a parazitárních před většinou ostatních, z předností*

⁸² Karel CHOUDONSKÝ – Josef THOMAYER, *Zdravotní slovník. Poučení o věcech lékařských pro kruhy širší*, Praha 1901.

⁸³ Slovníčky – Nejčastější příčiny úmrtí – Genea, genealogické stránky. Dostupné z: <http://www.genea.cz/informace/slovnicky/nejcastejsi-priciny-umrti/> [cit. 25. 2. 2017].

*puerperálních příčin před jinými, z předností onemocnění cévního systému před většinou ostatních nemocí atd.*⁸⁴

Výše zmíněné informace a postupy jsem využila pro tvorbu tabulek a grafů, užitých v této práci. Ke třídění záznamů jsem využila filtry aplikace Microsoft Office Excel 2010.

Při prezentaci výsledků výzkumu jsem zpracovávala každý rok samostatně. V první podkapitole jsou uvedeny informace o celkovém počtu zemřelých v daném roce, o počtu mrtvých mužů a žen, dále o počtu a pohlaví mrtvě narozených dětí a také o nejstarší zemřelé osobě v daném roce. Následně jsou podrobněji popisovány jednotlivé věkové skupiny zemřelých, tedy poměr mužů a žen a především nejčastější příčiny úmrtí stanovené lékařem v matrice, společně s počtem osob, které dané chorobě podlely. V druhé části jsem stanovila nejčastější příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace. Zde jsem nejprve uvedla nejčastější skupiny příčin úmrtí pro jednotlivé věkové kategorie osob a poté jsem stanovila nejobvyklejší příčiny smrti u novopackého obyvatelstva obecně.

Při zpracování údajů jsem zemřelé osoby rozdělila do věkových skupin, a to: 0–1 rok, 1–14 let, 15–44 let, 45–64 let, 65 let a více.⁸⁵

⁸⁴ V. SRB – V. HAAS, *Statistika příčin smrti a statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti v Československu*, Praha 1956, s. 22.

⁸⁵ Věkové skupiny byly převzaty z instrukční příručky *Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů*, s. 173.

2.2 Rok 1879⁸⁶

2.2.1 Výsledky pro rok 1879 dle matričních zápisů

V roce 1879 zemřelo v Nové Pace 122 osob. Jedná o rok s nejnižší úmrtností v rozsahu zkoumání této práce. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána u mužské populace, a to v podobě 66 jedinců, zatímco žen zemřelo 56 (Tabulka 1). Do celkového počtu 122 zemřelých byly započítány i 4 mrtvě narozené děti. Tři z nich byly mužského pohlaví a jedno pohlaví ženského. Nejstarším zemřelým byl 85letý muž.

Tabulka 1 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1879

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	66	56	122
%	54,1%	45,9%	100%

Procentuálně nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána ve skupině osob od 0 do 1 roku, která činila 29,51% celku. Nejméně osob pak zemřelo ve věkové skupině 1–14 let (12,30%) (Tabulka 2).

Ve věkové skupině dětí do 1 roku zemřelo v tomto roce 36 osob. Z toho 20 chlapců a 16 dívek. Z celkového počtu jich 8 zemřelo na vrozenou slabost. Další časté příčiny úmrtí byly úbytě a božec, které si vyžádaly po 5 mrtvých, dále katar plic, střev či žaludku. V novorozeneckém věku zemřelo 17 dětí, přičemž u dvou z nich nebyla uvedena příčina smrti a jedno zemřelo kvůli předčasnému porodu.

Ve věkové kategorii 1–14 let zemřelo 15 osob, 7 chlapců a 8 dívek. Dvě děti zemřely na zánět plen mozku, 2 na úbytě. Stejný počet osob zemřel na záškrť a cholery. Dále děti umíraly v důsledku otoku mozku, křivice nebo mázdřivky.

Poměrně vysoké procento osob (23,77%) zemřelo ve věkové kategorii 15–44 let. Jednalo se o 29 osob, z nichž bylo 16 mužů a 13 žen. Celkem 9 osob zemřelo na tuberkulózu, 5 osob na tyfus, další pak na úplavici nebo rakovinu pobřišnice. Dva muži zemřeli následkem sebevraždy formou zastřelení.

⁸⁶ SOA Zámorsk, fond Sbírka matrik Východočeského kraje 1587–1949, Farní úřad Nová Paka, Matrika zemřelých 1878–1905, s. 17–35.

Osob ve věku 45–64 let zemřelo celkem 19, 10 mužů a 9 žen. Tuberkulóza zabila 7 lidí, 3 lidé zemřeli v důsledku rakoviny. Dalšími příčinami úmrtí byly mrtvice, tyfus, vsouknutí střev, nabubření plic, vodnatelnost atd.

Osob starších 65 let zemřelo celkem 23, přičemž 13 bylo mužů a 10 žen. Pouze 3 osoby zemřely na sešlost věkem. 5 osob zemřelo následkem onemocnění plic. 4 lidé zemřeli na vodnatelnost. 1 osoba zemřela v důsledku rakoviny žaludku a 1 na cholera. Dále se objevuje ústrojná vada srdce, brightická zvrhlost ledvin, zánět žaludku a střev, močení krve či hnilina kostí.

Tabulka 2 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1879

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	20	16	36	29,51%
1–14	7	8	15	12,30%
15–44	16	13	29	23,77%
45–64	10	9	19	15,57%
65+	13	10	23	18,85%
CELKEM	66	56	122	100%

V tomto roce se stala nejčastější příčinou úmrtí tuberkulóza, která si vyžádala 23 životů. Ostatní plicní choroby postihly 14 zemřelých a onemocnění trávicí soustavy postihla 12 osob. 8 dětí zemřelo vrozenou slabostí. Vodnatelnost byla evidována u 7 jedinců. Tyfus a božec zabily vždy 6 osob, rakovině jich podleho 5.

2.2.2 Výsledky pro rok 1879 dle Bertillonovy klasifikace

U osob ve věku 0-1rok byly nejčastěji diagnostikovány zvláštní nemoci útlého věku, a to u 9 jedinců. Nemoci nakažlivé a cizopasně a nemoci soustavy nervové a čidel postihly po 6 zemřelých. U 5 osob byly evidovány nemoci ústrojí zažívacího.

Jedinci mezi 1 a 14 rokem umírali nejčastěji následkem nemocí nakažlivých a cizopasných, bylo jich celkem 7. Nemoci nervové a čidel evidujeme u 4 jedinců. Po 1 zemřelém si vyžádaly, nemoci reumatické, nemoci výživové, nemoci endokrinních žláz a jiné nemoci celkové, nemoci ústrojí oběhu krevního, nemoci ústrojí dýchacího a nemoci ústrojí zažívacího.

U osob ve věku 15–44 let byla nejvyšší úmrtnost zaznamenána následkem nemocí nakažlivých a cizopasných, kterým podlehl 15 jedinců. Nemoci ústrojí oběhu krevního zabily 3 osoby a po 2 zemřelých bylo evidováno u smrtí násilných a úrazových a neurčitých příčin úmrtí.

Nejvíce osob ve věkovém rozmezí 45–64 let zemřelo na nemoci nakažlivé a cizopasně. Rakoviny a jiné nádory byly zaznamenány u 3 zemřelých. Nemoci soustavy nervové a čidel a nemoci ústrojí dýchacího si vyžádaly po 2 obětech. Stejný počet byl zaznamenán u nemocí těhotenství, porodu a stavu poporodního.

U osob starších 65 let evidujeme 5 obětí u nemocí ústrojí dýchacího, nemocí ústrojí zažívacího a u neurčitých příčin úmrtí. Stařecká sešlost byla diagnostikována u 3 jedinců a nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního u 2.

V tomto roce zemřelo nejvíce osob v důsledku nemocí nakažlivých a cizopasných, jednalo se o 36 osob. S číslem 13 zemřelých se setkáme u nemocí soustavy nervové a čidel, nemocí ústrojí dýchacího a nemocí ústrojí zažívacího. Zvláštní nemoci útlého věku a neurčité příčiny úmrtí zahrnovaly po 9 zemřelých (Graf 1).

2.3 Rok 1880⁸⁷

2.3.1 Výsledky pro rok 1880 dle matričních zápisů

V tomto roce úmrtnost ve městě stoupla na počet 160 osob. Stejně jako v předchozím roce zemřelo více mužů, kterých bylo 92, zatímco žen bylo 68 (Tabulka 3). Do celkového počtu zemřelých jsou započítány 4 mrtvě rozené děti. Jednalo se o 2 chlapce a 2 dívky. Nejstarším zemřelým byl 87letý muž.

Tabulka 3 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1880

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	92	68	160
%	57,5%	42,5%	100%

Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána u osob ve stáří do 1 roku, kterých bylo 26, 25% celku. Nejmenší úmrtnost se projevila ve věkové skupině 1–14 let, jež tvořila 9,38% (Tabulka 4).

Ve věkové skupině do 1 roku zemřelo v tomto roce 42 dětí. Jednalo se o 23 chlapců a 19 dívek. Z celkového počtu zemřelých podleho 8 dětí vrozené slabosti, dalších 5 podleho božci, 4 jedinci zemřeli na úbytě a 3 na cholera. Jako další příčiny úmrtí se objevují katar plic, střev, křivice, krtičnatost či hlava vodnatá. 1 chlapec se narodil mrtvý kvůli nedospělosti následkem potracení a 1 kvůli nedospělosti následkem předčasného porodu.

Osob ve věku 1–14 let zemřelo 15. Jednalo se o 8 dívek a 7 chlapců. 4 děti zemřely na tuberkulózu, 2 na mázdřivku. Další děti zemřely následkem zánětu plen mozku, padouciny, neštovic, vodnatelnosti, krtičnatosti, kataru střev a pobřišnice a zánětu kloubu kyčelního. Jeden chlapec se utopil.

Celkem 34 osob zemřelo ve věku 15–44 let. S počtem 23 zemřelých výrazně převyšovali muži nad ženami, kterých umřelo 12. Tuberkulóza zabila celkem 30 osob. 5 osob zemřelo na vodnatelnost, další 2 na tyfus. Mezi příčiny úmrtí se v této skupině řadí také ochrnutí míchy, ochrnutí mozku, úplavice, ústrojná vada srdce, nabubření plic následkem vodokrevnosti a jiné.

⁸⁷ Tamtéž, s. 35–56.

Osob ve věkové skupině 45–64 let zemřelo 37, přičemž se jednalo o 22 mužů a 15 žen. Počtem jedinců se jedná o druhou nejpočetnější skupinu (23,13%) zemřelých v tomto roce. 6 osob zemřelo na tuberkulózu, 5 osob následkem zánětu plic. Rakovina, mrtvice katar střev a křeče žaludeční zabily po 2 osobách. Dále se objevilo ochrnutí míchy, kýla uskrínutá, vsouknutí střev a další. 1 muž zemřel na ochrnutí plic následkem oběšení ve stavu nepřičetnosti, totiž těžkomyslném.

Jedinců starších 65 let zemřelo 31. Jednalo se o 17 mužů a 14 žen. Stařecká sešlost byla evidována jako příčina úmrtí u 8 osob. 6 jedinců podlehl plicním chorobám (nádma, katar). 4 osoby zemřely následkem ústrojné vady srdce, 2 následkem zvrhlosti ledvin a 2 kvůli vodnatelnosti. Jako další příčiny smrti jsou evidovány mrtvice, rakovina žaludku, úplavice nebo sněť starců.

Tabulka 4 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1880

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	23	19	42	26,25%
1–14	7	8	15	9,38%
15–44	23	12	35	21,88%
45–64	22	15	37	23,13%
65+	17	14	31	19,38%
CELKEM	92	68	160	100%

Nejvyšší úmrtnost byla v roce 1880 evidována kvůli tuberkulóze, které podlehl 35 osob. 19 jedinců zemřelo na následky jiných onemocnění dýchací soustavy a 11 na onemocnění trávicí soustavy. 11 osob zabila také vodnatelnost. 8 lidí zemřelo na sešlost věkem a stejný počet na vrozenou slabost. 6 jich podlehl ústrojné vadě srdce a také krtičnatosti.

2.3.2 Výsledky pro rok 1880 dle Bertillonovy klasifikace

U dětí do 1 roku byla nejvyšší úmrtnost evidována následkem nemocí nakažlivých a cizopasných, které zabily celkem 12 jedinců. Zvláštní nemoci útlého věku si vyžádaly 10 zemřelých. Nemoci soustavy nervové a čidel, nemoci ústrojí dýchacího a nemoci ústrojí zažívacího zabily vždy po 4 osobách.

Osoby ve věkové skupině 1–14 let umíraly nejčastěji na nemoci nakažlivé a cizopasně, celkem se jednalo o 8 jedinců. Nemoci soustavy nervové a čidel zabily 2 osoby. V ostatních případech se jednalo pouze o jednotlivá úmrtí v různých skupinách.

Jedinci staří 15–44 let byli nejčastěji stíženi nemocemi nakažlivými a cizopasnými, které zabily 23 z nich. Nemoci soustavy nervové a čidel si vyžádaly 4 mrtvé a po 3 obětech evidujeme u nemocí ústrojí oběhu krevního a nemocí ústrojí dýchacího.

Nemocem ústrojí zažívacího podlehl 12 jedinců ve věku 45–64 let. Nemoci nakažlivé a cizopasně zabily 7 osob a dalších 5 zemřelo následkem nemocí soustavy nervové a čidel.

U osob starších 65 let se stala nejčastější příčinou stařecká sešlost, již evidujeme u 8 zemřelých. Nemoci ústrojí dýchacího zabily 6 jedinců a dalších 5 zemřelo kvůli nemocem ústrojí oběhu krevního.

Nejvyšší úmrtnost byla v tomto roce způsobena nemocemi nakažlivými a cizopasnými, které byly evidovány u 51 jedinců. Nemocem ústrojí zažívacího podlehl 19 osob. Nemoci ústrojí dýchacího si vyžádaly 17 mrtvých a o jednoho méně potom nemoci soustavy nervové a čidel. Neurčité příčiny úmrtí a nemoci ústrojí oběhu krevního byly diagnostikovány vždy u 11 osob (Graf 2).

2.4 Rok 1881⁸⁸

2.4.1 Výsledky pro rok 1881 dle matričních zápisů

Roku 1881 zemřelo v Nové Pace 154 osob. Poprvé převažují, s číslem 80 zemřelých, ženy nad muži, kterých zemřelo 74 (Tabulka 5). Mrtvě rozené děti se narodily 3 a ve všech případech se jednalo o chlapce. Nejstarší zemřelou byla 98letá žena.

Tabulka 5 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1881

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	74	80	154
%	48,1%	51,9%	100%

Nejvyšší úmrtnost se v tomto roce projevila u věkové skupiny osob starších 65 let, která tvořila 24,68% celku. Nejméně jedinců zemřelo ve skupině dětí od 1 do 14 let, a to 12,99% celku (Tabulka 6).

Skupina dětí do 1 roku v tomto roce zahrnovala 36 zemřelých. Jednalo se o 23 chlapců a 13 dívek. Z celkového počtu zemřelých jich 9 podleho vrozené slabosti, stejný počet zemřel v důsledku onemocnění dýchacího ústrojí, 6 dětí zabily úbytě, 4 podlehy božci, stejný počet zemřel na onemocnění trávicího ústrojí a 2 děti zemřely kvůli spalničkám. 2 mrtvě rození chlapci zemřeli následkem potracení.

Dětí ve věku od 1 do 14 let zemřelo 20. Převyšovala úmrtnost dívek, kterých bylo 14, chlapců bylo 6. Nejvyšší počet mrtvých si vyžádaly úbytě, a to 6 osob. 5 dětí zemřelo na zánět plen mozku, 4 podlehy plicním onemocněním. Dále se objevily jako příčiny smrti mázdřivka, tracení horem dolem, počasný katar střev, vodnatelnost a křivice. Tyto nemoci si vyžádaly vždy po 1 osobě.

28 osob zemřelo ve věkovém rozmezí 15–44 let. Počet žen a mužů byl vyrovnaný, u každého pohlaví 14 jedinců. Nejvyšší úmrtnost zapříčinila tuberkulóza, která zabila 15 osob. 3 lidé zemřeli kvůli ústrojné vadě srdce a 2 po nákaze tyfem. Jeden muž zemřel násilnou smrtí, jako příčina úmrtí je uvedeno ochrnutí mozku a plic

⁸⁸ Tamtéž, s. 56–77.

následkem poranění lebky a hrudníku, smrt násilná. Jedna žena a jeden muž podleli alkoholismu. 1 žena zemřela po zásahu bleskem a 1 muž spáchal sebevraždu zastřelením.

Osob ve věku 45–64 let zemřelo 32. Jednalo se o 19 mužů a 13 žen. 8 osob zemřelo na vodnatelnost. 6 jich podlelo plicním onemocněním. Čtyři lidé zemřeli na tuberkulózu. Po 2 zemřelých si vyžádala rakovina, tyfus a ústrojná vada srdce. Jedna osoba zemřela na těžkomyslnost.

Nejvyšší procento zemřelých v tomto roce tvořily osoby starší 65 let. Jednalo se o 38 jedinců, přičemž výrazně převažovaly ženy, kterých byla 26, zatímco mužů 12. Tato věková skupina tvořila 24,68% celkového počtu zemřelých v tomto roce. Nejvíce osob zabila plicní onemocnění (mimo tuberkulózu), a to 10. Dalších 9 jedinců zemřelo kvůli stařecké sešlosti. 4 lidské životy si vyžádala vodnatelnost a také onemocnění trávicí soustavy. Objevila se také mrtvice, tuberkulóza, močokrevnost a jiné.

Tabulka 6 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1881

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	23	13	36	23,38%
1–14	6	14	20	12,99%
15–44	14	14	28	18,18%
45–64	19	13	32	20,78%
65+	12	26	38	24,68%
CELKEM	74	80	154	100%

V roce 1881 zemřelo nejvíce osob na tuberkulózu, celkem 34. Ostatní onemocnění dýchací soustavy si vyžádala 27 mrtvých. 13 lidí zemřelo v důsledku onemocnění trávicí soustavy, dalších 10 kvůli vodnatelnosti. Vrozená slabost a sešlost věkem si vyžádaly po 9 mrtvých. 6 osob zemřelo kvůli ústrojné vadě srdce a 5 jich zabily zánět plen mozku, mrtvice a rakovina.

2.4.2 Výsledky pro rok 1881 dle Bertillonovy klasifikace

Děti ve stáří do 1 roku nejčastěji umíraly následkem zvláštních nemocí útlého věku. Ty byly zaznamenány u 9 jedinců. Nemoci nakažlivé a cizopasně a nemoci ústrojí dýchacího si vyžádaly po 8 zemřelých. Vždy 4 oběti evidujeme u nemocí ústrojí zažívacího a nemocí soustavy nervové a čidel.

U osob od 1 do 14 let zabíjely nejvíce nemoci nakažlivé a cizopasně, které se vyskytly u 8 jedinců. Nemoci soustavy nervové a čidel postihly 5 osob a u 4 zemřelých byly diagnostikovány nemoci ústrojí dýchacího.

Celkem 17 osob ve věku od 15 do 44 let zemřelo následkem nemocí nakažlivých a cizopasných. U 4 jedinců nebyla diagnostikována pravá příčina smrti, tudíž byli zařazeni k neurčitým příčinám úmrtí. Nemoci ústrojí oběhu krevního postihly 3 zemřelé a nemoci soustavy nervové a čidel 2.

Osoby ve věkovém rozmezí 45–64 umíraly nejčastěji následkem nemocí ústrojí oběhu krevního a nemocí ústrojí dýchacího, které postihly vždy 7 jedinců. Po 5 zemřelých si vyžádaly nemoci nakažlivé a cizopasně a nemoci soustavy nervové a čidel. Nemocem ústrojí zažívacího podlely 4 osoby.

U osob starších 65 let byly celkem u 10 z nich evidovány nemoci ústrojí dýchacího. O jednoho jedince méně zemřelo důsledkem stařecké sešlosti. Neurčité příčiny úmrtí se vyskytly u 6 jedinců.

Roku 1881 zemřelo 41 obyvatel Nové Paky na nemoci nakažlivé a cizopasně. Nemoci ústrojí dýchacího evidujeme u 29 jedinců. Nemocem soustavy nervové a čidel podlelo 18 osob a dalších 14 podlelo nemocem ústrojí zažívacího. U 10 zemřelých byly příčinou smrti nemoci ústrojí oběhu krevního (Graf 3).

2.5 Rok 1882⁸⁹

2.5.1 Výsledky pro rok 1882 dle matričních zápisů

V tomto roce byl počet mrtvých v Nové Pace 150 osob. Stejně jako v loňském roce převažovaly s počtem 78 ženy. Mužů zemřelo 72 (Tabulka 7). Mezi zemřelými je evidováno také 5 mrtvě rozených dětí, 3 chlapců a 2 dívek. Nejstarším zemřelým bylo 83 let a ve všech 3 případech se jednalo o ženy.

Tabulka 7 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1882

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	72	78	150
%	48,0%	52,0%	100%

Nejvyšší úmrtnost se projevila ve skupině dětí do 1 roku, kterých zemřelo 30,67% celku. Nejméně mrtvých osob bylo ve věku 1–14 let. Tato skupina tvořila 10,67% celku (Tabulka 8).

46 dětí zemřelo do prvního roku života. Vyšší úmrtnost byla evidována u chlapců, kterých zemřelo 25. Dívek zemřelo 23. Nejvíce dětí, celkem 9, zemřelo kvůli onemocněním trávicí soustavy (katar střev, žaludku,...), 7 jedinců podlehl vrozené slabosti. Vždy 5 mrtvých postihl božec, záducha a plicní onemocnění (mimo tuberkulózu, která je evidována u 2 zemřelých). Dále se objevily neštovice, krtičnatost, záškrť a jiné. U 1 mrtvě rozeného chlapce nebyla příčina smrti zaznamenána.

Věková skupina 1–14 let zahrnovala 16 mrtvých, přičemž se jednalo o 7 chlapců a 9 dívek. 5 dětí zemřelo na úbytě. Záducha si vyžádala 4 životy. Objevily se také vodnatelnost mozku, katar průdušnice, katar plic, záškrť, zánět plen mozku a božec.

14 mužů a 12 žen, celkem 26 osob, zemřelo ve věkovém rozmezí 15–44 let. Celkem 12 jedinců zemřelo kvůli tuberkulóze. Po 3 osobách si vyžádal tyfus a také vodnatelnost. Objevily se také ochrnutí míchy, talovitost krve, křivice, žloutenice a jiné. Jeden muž spáchal sebevraždu zastřelením.

⁸⁹ Tamtéž, s. 78–97.

Věková skupina 45–64 let zahrnovala v tomto roce 35 osob. Jednalo se o 15 mužů a 20 žen. 10 osob zemřelo v důsledku plicních onemocnění, 5 osob zabila rakovina. Po 3 jedincích si vyžádaly tuberkulóza a onemocnění trávicí soustavy. Dvě osoby si vyžádala vodnatelnost a tyfus. 1 muž zemřel na otravu alkoholem.

Zemřelých osob starších 65 let bylo evidováno 27, z čehož bylo 11 mužů a 16 žen. U 7 jedinců se jednalo o sešlost věkem. 4 osoby zemřely následkem plicních onemocnění a taktéž kvůli rakovině. Vodnatelnost zapříčinila 3 úmrtí. Z dalších příčin úmrtí se objevily močokrevnost, tyfus, katar střev nebo žloutenice. 1 muž spáchal sebevraždu oběšením.

Tabulka 8 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1882

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	25	21	46	30,67%
1–14	7	9	16	10,67%
15–44	14	12	26	17,33%
45–64	15	20	35	23,33%
65+	11	16	27	18,00%
CELKEM	72	78	150	100%

V roce 1882 zemřelo nejvíce lidí v důsledku onemocnění dýchací soustavy a tuberkulózy, a to vždy 22. 15 jedinců zemřelo kvůli onemocněním trávicí soustavy. Vodnatelnost, záducha a rakovina byly evidovány vždy u 9 osob. 7 jedinců zemřelo stářím. Božec, vrozená slabost a tyfus postihly každý 6 osob.

2.5.2 Výsledky pro rok 1882 dle Bertillonovy klasifikace

U dětí do 1 roku byly nejčastěji jako příčiny úmrtí evidovány nemoci ústrojí zažívacího, kterým podlehl 11 osob. Nemoci soustavy nervové a čidel si vyžádaly 9 zemřelých. Následkem nemocí ústrojí dýchacího umřelo 8 dětí.

Celkem 8 jedinců ve věkové skupině 1–14 let zemřelo kvůli nemocem nakažlivým a cizopasným. Nemoci ústrojí dýchacího si vyžádaly 4 zemřelé a nemoci soustavy nervové a čidel 3.

Nemoci nakažlivé a cizopasně zabily 15 jedinců ve věku 15–44 let. Další 3 jedinci zemřeli následkem nemocí ústrojí zažívacího. Několik dalších skupin Bertillonovy klasifikace bylo diagnostikováno vždy pouze u 1 úmrtí.

U osob ve věkové kategorii 45–64 let byly v 9 případech zaznamenány nemoci ústrojí dýchacího. Nemocem nakažlivým a cizopasným podlehl 7 obyvatel a rakoviny a jiné nádory byly evidovány jako příčina úmrtí u 5 zemřelých.

Osoby starší 65 let umíraly v nejvíce případech kvůli stařecké sešlosti, zde se jednalo o 7 jedinců. U 4 zemřelých nebyla zjištěna pravá příčina smrti, tudíž byly zařazeny do skupiny neurčitých příčin úmrtí. Stejný počet osob podlehl rakovinám a jiným nádorům. Nemoci ústrojí dýchacího a nemoci ústrojí zažívacího postihly vždy tři jedince.

Roku 1882 zemřelo v Nové Pace celkem 37 osob následkem nemocí nakažlivých a cizopasných. Nemocem ústrojí dýchacího podlehl 25 jedinců a nemocem ústrojí zažívacího 21. Dalších 18 zemřelých si vyžádaly nemoci soustavy nervové a čidel a u 9 osob byly příčinou smrti stanoveny rakoviny a jiné nádory (Graf 4).

2.6 Rok 1883⁹⁰

2.6.1 Výsledky pro rok 1883 dle matričních zápisů

V tomto roce bylo v Nové Pace zaznamenáno celkem 182 zemřelých. Muži s počtem 104 osob výrazně převyšovali 78 žen (Tabulka 9). V celkovém součtu je zahrnuto 5 mrtvě narozených dětí, kdy se jednalo o 3 chlapce a 2 dívky. Nejstarší zemřelou osobou byl 83letý muž.

Tabulka 9 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1883

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	104	78	182
%	57,1%	42,9%	100%

Nejvíce jedinců zemřelo ve stáří do 1 roku. Tato skupina tvořila 25, 27% celku. Nejmenší zastoupení měli zemřelí ve věkovém rozmezí 1–14 let. Tato skupina tvořila 14, 29% celku (Tabulka 10).

Dětí do 1 roku zemřelo 46. Jednalo se o 26 chlapců a 20 dívek. 8 novorozenců zemřelo kvůli vrozené slabosti, stejný počet postihly úbytě. Plicním onemocněním podlehl 7 jedinců. 6 dětí zabil božec. 3 novorozenci zemřeli kvůli nedospělosti následkem předčasného porodu, přičemž jedna dívka se narodila již mrtvá. U 2 mrtvě rozených chlapců je jako příčina smrti uvedena mrtvice následkem těžkého porodu. U jedné mrtvě rozené dívky není příčina smrti uvedena.

26 dětí zemřelo v rozmezí 1–14 let, přičemž počet dívek a chlapců byl totožný, totiž 13 osob. 5 dětí podlehl tuberkulóze, 4 osoby zemřely na tyfus. Kvůli mázdřivce, zánětu plic a zánětu plen mozku zemřeli vždy 3 jedinci. 2 děti zemřely na záduchu a také spálu.

Osob starých od 15 do 44 let zemřelo v tomto roce 35. S počtem 24 jedinců, výrazně převažovali muži nad ženami, kterých zemřelo 11. Tuberkulóze podlehl 13 osob. Tyfus zabil 5 jedinců. 3 lidé zemřeli následkem plicních onemocnění a 2 kvůli vodnatelnosti. Objevily se také rakovina, krtičnatost, talovitost krve a jiné. U jednoho

⁹⁰ Tamtéž, s. 98–122.

muže bylo jako příčina úmrtí zapsáno ochrnutí plic následkem náhodného zadušení - smrt násilná.

Ve skupině osob ve věku 45–64 let zemřelo 42 jedinců. Jednalo se o 26 mužů a 16 žen. 8 z nich zemřelo kvůli plicním onemocněním. Dalších 5 na tuberkulózu, stejný počet také na vodnatelnost a břišní tyfus. Onemocnění trávicí soustavy zabila 3 osoby. Byly evidovány také rakovina, mrtvice, ochrnutí mozku, sešlost věkem, zvrhlost ledvin a další. 1 muž spáchal sebevraždu oběšením v pomatenosti smyslů.

Osob starších 65 let zemřelo 33, přičemž 15 bylo mužů a 18 žen. Devět jedinců zemřelo stářím, 7 kvůli vodnatelnosti a taktéž plicním onemocněním. Jako další příčiny úmrtí byly zapsány, tuberkule plic, ústrojná vada srdce, sněť starců, úplavice či vysílení následkem hnisání kloubu kyčelního.

Tabulka 10 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1883

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	26	20	46	25,27%
1–14	13	13	26	14,29%
15–44	24	11	35	19,23%
45–64	26	16	42	23,08%
65+	15	18	33	18,13%
CELKEM	104	78	182	100%

V roce 1883 zemřelo nejvíce lidí na tuberkulózu, jednalo se o 32 osob. Onemocnění dýchací soustavy byla vedena jako příčina úmrtí u 30 jedinců. 14 obyvatel zemřelo na vodnatelnost a 13 na tyfus. Sešlost věkem byla zaznamenána u 11 osob. Onemocněním trávicí soustavy podlehl 10 jedinců, vrozené slabosti 9. Božec byl jako příčina úmrtí zapsán u 6 dětí.

2.6.2 Výsledky pro rok 1883 dle Bertillonovy klasifikace

Zvláštní nemoci útlého věku postihly 13 jedinců ve stáří do 1 roku. Dalších 10 osob zemřelo důsledkem nemocí nakažlivých a cizopasných a 7 kvůli nemocem ústrojí oběhu krevního.

U jedinců ve věkovém rozmezí 1–14 let byly nejčastější příčinou smrti stanoveny nemoci nakažlivé a cizopasně, kterým podlehl celkem 16 osob. Nemoci ústrojí dýchacího se vyskytly u 4 zemřelých a nemoci soustavy nervové a čidel u 3.

Celkem 20 osob ve věku od 15 do 44 let zemřelo na nemoci nakažlivé a cizopasně. U 4 jedinců byly diagnostikovány nemoci ústrojí dýchacího a u 3 nemoci ústrojí zažívacího.

Nemocem nakažlivým a cizopasným podlehl 10 osob ve věkovém rozmezí 45–64 let. Nemoci ústrojí dýchacího a nemoci soustavy nervové a čidel postihly vždy sedm jedinců. Nemoci ústrojí zažívacího se projevíly jako smrtelné u 5 obyvatel.

Osob starších 65 let zemřelo v důsledku stařecké sešlosti 9. U 8 jedinců byly zaznamenány pouze doprovodné jevy skutečné příčiny smrti, tudíž byli zařazeni do skupiny neurčitých příčin úmrtí. Nemocem ústrojí dýchacího podlehl 7 osob.

V tomto roce v Nové Pace zemřelo celkem 58 osob na nemoci nakažlivé a cizopasně. Druhou nejčastější příčinou úmrtí se staly nemoci ústrojí dýchacího, kterým podlehl 28 jedinců. Nemoci soustavy nervové a čidel byly diagnostikovány u 19 zemřelých a nemoci ústrojí zažívacího se zvláštními nemocemi útlého věku u 14. Přesnou příčinu smrti se nepodařilo zjistit u 13 osob, tudíž byly zařazeny do kategorie neurčitých příčin úmrtí (Graf 5).

2.7 Rok 1884⁹¹

2.7.1 Výsledky pro rok 1884 dle matričních zápisů

V tomto roce zemřelo v Nové Pace 143 osob. Úmrtnost byla vyšší u žen, kterých zemřelo 74, zatímco mužů 69 (Tabulka 11). V počtu zemřelých jsou evidovány čtyři mrtvě rozené děti, kdy se jednalo o 3 dívky a 1 chlapce. Nejstarší zemřelou byla 88letá žena.

Tabulka 11 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1884

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	69	74	143
%	48,3%	51,7%	100%

Nejvyšší úmrtnost byla evidována u dětí do 1 roku, která činila 23,78% celku. Naopak nejméně osob zemřelo ve věku 1–14 let. Tato skupina tvořila 13,99% (Tabulka 12).

Osob v rozmezí 0–1 rok zemřelo celkem 34. S počtem 18 jedinců lehce převažovala úmrtnost dívek nad chlapci, kterých bylo 16. 6 dětí zemřelo v důsledku onemocnění trávicí soustavy, 5 kvůli plicním onemocněním. 4 děti zemřely na úbytě. U 3 osob je evidována jako příčina smrti vrozená slabost a u stejného počtu také mrtvice následkem těžkého porodu, přičemž 2 z nich byly mrtvě rozené. Objevily se dále osypky, křeč hlasivky, mázdřivka, zánět plen mozku a další.

Celkem 20 dětí zemřelo ve věku od 1 do 14 let. Opět převažovala úmrtnost u ženského pohlaví. Dívek zemřelo 12 a chlapců 8. Celkem 5 osob zemřelo na úbytě. Křivice a osypky byly evidovány vždy u 3 zemřelých. 2 děti zabil zánět plen mozku. Byly zaznamenány také neštovice, hlíza v hrdle či krtičnatost.

Ve věkovém rozmezí 15–44 let zemřelo 32 osob, přičemž se jednalo o 19 žen a 13 mužů. Nejvíce úmrtí si vyžádala tuberkule plic, které podlehl 13 osob. 4 jedinci zemřeli na tyfus. U 3 osob byla evidována ústrojná vada srdce. Objevily se také neštovice, růže snětivá či zánět pobřišnice. 1 žena spáchala sebevraždu oběšením.

⁹¹ Tamtéž, s. 122–142.

28 osob zemřelo ve věku 45–64 let. S počtem 16 mrtvých převyšovala úmrtnost mužů nad ženami, kterých zemřelo 12. Celkem 8 jedinců zabila tuberkule plic. 5 osob podlehl plicním onemocněním. Vodnatelnost, talovitost krve a tyfus si vyžádaly vždy 2 zemřelé. U 1 muže bylo evidováno ochrnutí mozku následkem oběšení.

Jedinců starších 65 let umřelo v tomto roce 29. Muži, s počtem 16 mrtvých, převyšovali nad zemřelými ženami, kterých bylo 13. Sešlost věkem byla zaznamenána u 7 osob. Plicní choroby postihly 6 jedinců. Dalších 5 zabila mrtvice. 4 osoby podlehl onemocněním trávicí soustavy. Objevila se také rakovina, růže, vodnatelnost a další.

Tabulka 12 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1884

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	16	18	34	23,78%
1–14	8	12	20	13,99%
15–44	13	19	32	22,38%
45–64	16	12	28	19,58%
65+	16	13	29	20,28%
CELKEM	69	74	143	100%

Nejvíce osob zemřelo v tomto roce na tuberkulózu, a to 30. Onemocnění dýchací soustavy si vyžádala 21 zemřelých a onemocnění trávicí soustavy 13. Mrtvice byla evidována u 10 osob. Tyfus a sešlost věkem si vyžádaly po 7 mrtvých. 5 osob zemřelo na zánět plen mozku a vodnatelnost.

2.7.2 Výsledky pro rok 1884 dle Bertillonovy klasifikace

U dětí do 1 roku se nejvíce projevíly nemoci nakažlivé a cizopasně, společně s nemocemi ústrojí zažívacího. V obou těchto skupinách bylo zaznamenáno 7 zemřelých. Nemocem ústrojí dýchacího a nemocem soustavy nervové a čidel podleho vždy 5 osob. Pouze u 4 jedinců byly diagnostikovány zvláštní nemoci útlého věku.

Celkem 8 jedinců ve věku od 1 do 14 let zemřelo na nemoci nakažlivé a cizopasně. Nemocem kůže a vaziva podkožního podleho 4 osoby a 3 děti zemřely v důsledku nemocí rheumatických, nemocí výživových, nemocí endokrinních žláz a jiných nemocí celkových.

Nemoci nakažlivé a cizopasně byly stanoveny jako příčina smrti u 19 osob ve věkové skupině 15–44 let. Další 4 jedinci umřeli následkem nemocí ústrojí oběhu krevního. Po 2 zemřelých evidujeme u nemocí soustavy nervové a čidel a nemocí ústrojí dýchacího.

Nemocem nakažlivým a cizopasným podleho 10 osob mezi 45 a 64 lety. U 5 osob byla smrt způsobena nemocemi ústrojí dýchacího a 4 jedinci zemřeli kvůli nemocem soustavy nervové a čidel.

Osoby starší 65 let umřely v 7 případech na nemoci ústrojí dýchacího. Stařecká sešlost byla evidována u 6 jedinců a nemocem soustavy nervové a čidel a nemocem ústrojí zažívacího podleho vždy 5 osob.

Roku 1884 zemřelo nejvíce obyvatel Nové Paky na nemoci nakažlivé a cizopasně. Jednalo se o 47 osob. U 21 jedinců byly evidovány nemoci ústrojí dýchacího u 18 poté nemocí soustavy nervové a čidel. Nemocem ústrojí zažívacího podleho v tomto roce 15 osob a stařecká sešlost byla zaznamenána u 6 zemřelých (Graf 6).

2.8 Rok 1885⁹²

2.8.1 Výsledky pro rok 1885 dle matričních zápisů

V roce 1885 bylo v Nové Pace evidováno 172 zemřelých. Mužská úmrtnost činila 89 jedinců, zatímco ženská 83. V celkovém součtu bylo zaznamenáno také sedm mrtvě rozených dětí, kdy se jednalo o 4 chlapce a 3 dívky. Nejstarší zemřelou osobou byla 89letá žena.

Tabulka 13 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1885

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	89	83	172
%	51,7%	48,3%	100%

Nejvíce osob zemřelo ve věkové skupině 0–1 rok, která tvořila 26,74% celku. Nejnižší úmrtnost byla evidována u osob ve věkovém rozmezí 1–14 let. Ty tvořily 11,05% ze všech zemřelých (Tabulka 14).

Děti do 1 roku bylo v matrice zemřelých evidováno 46. S velkým rozdílem převažovala úmrtnost chlapců, kterých bylo 29, zatímco dívek umřelo 17. Vrozené slabosti podlehl 8 dětí, 5 jich zemřelo na úbytě a 4 na cholera a na onemocnění trávicí soustavy. Kvůli předčasnému porodu zemřeli 3 jedinci a u stejného počtu byl zaznamenán božec. Dále se objevily například mrtvice následkem obtížného porodu a ochrnutí plic následkem obtížného porodu, a to vždy u 2 dětí, záducha, křivice, nabubření plen mozku a jiné.

19 osob zemřelo ve věkovém rozmezí 1–14 let. Jednalo se o 9 chlapců a 10 dívek. U 4 jedinců byly evidovány úbytě, dále pak vždy u 2 jedinců tyfus, ochrnutí mozku a zánět plen mozku. Objevily se také záducha, křivice, spála či božec.

32 osob zemřelo ve věkové skupině 15–44 let. S počtem 19 zemřelých převyšovala ženská úmrtnost nad mužskou, která zahrnovala 13 jedinců. Nejčastější příčinou smrti byla tuberkule plic, ta se vyskytla u 19 osob. Další 5 zemřelo

⁹² Tamtéž, s. 142–162.

následkem vodnatelnosti. Byly evidovány také zánět plic, zvrhlost jater či křeč žaludeční. 2 muži spáchali sebevraždu, jeden zastřelením a druhý požitím lučavky⁹³.

Jedinců ve věkovém rozmezí 45–64 let zemřelo 33. Jednalo se o 18 žen a 15 mužů. 6 osob podlehl tuberkuli plic. 5 jedinců zabila rakovina a stejný počet také srdeční vada. 4 osoby zemřely v důsledku zánětu plic. U dalších 3 byla evidována vodnatelnost. Jako další příčiny úmrtí byly zaznamenány alkoholismus, zvrhlost jater, úbytí nebo provleklá dna.

42 osob zemřelo ve věku 65 a více let. V mužské populaci bylo 23 zemřelých, v ženské 19. Celkem 10 jedinců zemřelo kvůli sešlosti věkem a stejný počet podlehl plicním onemocněním. U 5 osob byla jako příčina smrti zapsána mrtvice a u dalších čtyř vodnatelnost. Objevily se také růže, embolia cerebri, marasmus či pakostnice. Jeden muž se oběsil.

Tabulka 14 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1885

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	29	17	46	26,74%
1–14	9	10	19	11,05%
15–44	13	19	32	18,60%
45–64	15	18	33	19,19%
65+	23	19	42	24,42%
CELKEM	89	83	172	100%

V tomto roce zemřelo nejvíce osob, a to 36, na tuberkulózu. 22 jedinců zemřelo v důsledku onemocnění dýchací soustavy. U 13 osob byla jako příčina smrti uvedena vodnatelnost a u 11 sešlost věkem. 8 dětí podlehl vrozené slabosti a stejný počet osob také onemocněním trávicí soustavy. 7 zemřelých si vyžádala mrtvice, cholera a vady srdce.

⁹³ Kapalina, která je svým složením schopna rozpustit i velmi odolné kovy.

2.8.2 Výsledky pro rok 1885 dle Bertillonovy klasifikace

Celkem 13 dětí mladších 1 roku umřelo následkem nemocí nakažlivých a cizopasných. U dalších 10 byly zaznamenány zvláštní nemoci útlého věku a nemocem soustavy nervové a čidel podleho 5 osob.

U osob ve věkovém rozpětí 1–14 let byly s počtem 7 zemřelých nejčastějšími příčinami úmrtí nemoci nakažlivé a cizopasně a nemoci soustavy nervové a čidel. Nemocem ústrojí dýchacího podleho 2 jedinci a u nemocí ústrojí zažívacího, vrozených vad tvarových a nemocí reumatických, nemocí výživových, nemocí endokrinních žláz a jiných nemocí celkových registrujeme po 1 oběti.

Nemoci nakažlivé a cizopasně se staly příčinou smrti u 19 osob ve věku od 15 do 44 let. Nemocem ústrojí dýchacího podleho 4 jedinci a 2 zemřelí jsou evidováni u nemocí ústrojí zažívacího, nemocí ústrojí oběhu krevního, nemocí ústrojí dýchacího a u smrtí násilných a úrazových.

Obyvatelé ve věku 45–64 let umírali nejčastěji následkem nemocí nakažlivých a cizopasných, kterým podleho celkem 7 z nich. Rakoviny a jiné nádory, nemoci ústrojí oběhu krevního a nemoci ústrojí dýchacího zabily po 5 osobách. Neurčité příčiny úmrtí se objevily u 3 jedinců.

V důsledku stařecké sešlosti zemřelo 10 osob starších 65 let. Nemoci soustavy nervové a čidel a nemoci ústrojí dýchacího evidujeme u 7 jedinců. Vzhledem k nestanovení přesné příčiny smrti bylo 5 zápisů zařazeno mezi neurčité příčiny úmrtí.

V tomto roce zemřelo 48 obyvatel města kvůli nemocem nakažlivým a cizopasným. Druhou nejčastější příčinou smrti se staly nemoci soustavy nervové a čidel, kterým podleho 22 jedinců. Nemoci ústrojí dýchacího byly zaznamenány u 20 osob. Vzhledem k nejasnému určení příčiny smrti bylo 13 diagnóz zaevidováno ve skupině neurčité příčiny úmrtí. Nemoci ústrojí zažívacího zabily 12 osob (Graf 7).

2.9 Rok 1886⁹⁴

2.9.1 Výsledky pro rok 1886 dle matričních zápisů

V tomto roce zemřelo v Nové Pace 183 osob. Jedná se o rok s nejvyšší úmrtností v rozsahu této práce. Mužská úmrtnost převyšovala se 102 jedinci zemřelé ženy, kterých bylo 81 (Tabulka 15). V celkovém součtu jsou zaevidovány i 4 mrtvě rozené děti. Jednalo se o 2 chlapce a 2 dívky. Nejstarší zemřelou byla 87letá žena.

Tabulka 15 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1886

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	102	81	183
%	55,7%	44,3%	100%

Nejvyšší úmrtnost se projevila ve věkové skupině dětí do 1 roku, která tvořila 25,14% celku. Nejméně zemřelo dětí ve věku 1–14 let, tato skupina představovala 9,29% ze všech zaznamenaných úmrtí.

Celkem 46 dětí zemřelo do prvního roku života. Převažovala úmrtnost chlapců, kterých bylo 26, zatímco dívek 20. Onemocnění trávicí soustavy zabila 15 osob. Kvůli vrozené slabosti nepřežilo 10 jedinců. Na následky plicních onemocnění zemřelo 5 dětí. U 3 jedinců byla evidována tuberkulóza a u stejného počtu také nabubření plen mozku.

Ve skupině dětí od 1 do 14 let zemřelo 10 dívek a 7 chlapců, celkem tedy 17 osob. 6 z nich zemřelo následkem tuberkule plic. Další 4 podlehly zánětu plen mozku. Objevily se také zánět plic, zánět ledvin, křivice či ochrnutí srdce. 1 chlapec se utopil.

Ve věkové skupině 15–44 let zemřelo 36 osob. Výrazně převyšovala mužská úmrtnost, která zahrnovala 22 jedinců, oproti ženám, kterých bylo 14. Celkem 21 osob zemřelo následkem tuberkule plic. Dále byly evidovány ztučnění srdce, zánět plic, hlíza mozková, zánět ledvin vleklý, tyfus střevní a další. 1 muž spáchal sebevraždu zastřelením a 1 oběšením.

⁹⁴ SOA Zámorsk, fond Sběrka matrik Východočeského kraje 1587–1949, Farní úřad Nová Paka, Matrika zemřelých 1878–1905, s. 162–182.

41 osob zemřelo ve věkovém rozmezí 45–64 let. Mužská úmrtnost čítala 27 jedinců, čímž velmi převažovala nad úmrtností žen, kterých zemřelo 14. Tuberkule plic byla zapsána jako příčina úmrtí u 8 osob, plicní onemocnění a srdeční vada vždy u pěti. Rakovina a mrtvice se staly příčinou úmrtí u 3 jedinců. Objevily se také brhctická nemoc, rozklad krve, alkoholismus vleklý nebo žloutenice. 1 muž spáchal sebevraždu oběšením.

Osob starších 65 let zemřelo 43. Ženy s úmrtností 23 jedinců převyšovaly nad 20 zemřelými muži. Sešlost věkem byla evidována jako příčina úmrtí u 17 jedinců. Deset osob zemřelo v důsledku onemocnění dýchací soustavy. Tuberkule plic zabila čtyři jedince. Dále se objevily srdeční vada, ochrnutí mozku, zánět jater, mrtvice a další.

Tabulka 16 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1886

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	26	20	46	25,14%
1–14	7	10	17	9,29%
15–44	22	14	36	19,67%
45–64	27	14	41	22,40%
65+	20	23	43	23,50%
CELKEM	102	81	183	100%

V roce 1886 zemřelo 43 osob kvůli tuberkuli plic. 23 jedinců zabila onemocnění dýchací soustavy a 19 obyvatel zemřelo stářím. Onemocnění trávicí soustavy si vyžádala 17 mrtvých. 10 osob zemřelo v důsledku vad srdce a stejný počet dětí kvůli vrozené slabosti. U 6 jedinců byl evidován zánět plen mozku a u 5 rakovina.

2.9.2 Výsledky pro rok 1886 dle Bertillonovy klasifikace

Celkem 16 dětí ve věku do 1 roku podleho nemocem ústrojí zažívacího. Zvláštní nemoci útlého věku zabily 10 jedinců a 5 jich zemřelo následkem nemocí soustavy nervové a čidel.

Nemoci nakažlivé a cizopasně se staly příčinou úmrtí u 6 osob ve věku od 1 do 14 let. Nemocem soustavy nervové a čidel podleho 5 osob a 2 děti zemřely kvůli nemocem ústrojí močového a ústrojí pohlavního.

U 23 jedinců ve věkové kategorii 15–44 let byly důvodem úmrtí nemoci nakažlivé a cizopasně. Nemoci soustavy nervové a čidel zabily 4 osoby a u 3 evidujeme smrt následkem nemocí ústrojí močového a ústrojí pohlavního.

Stejně jako v předchozích věkových kategoriích i ve skupině osob ve věku 45–64 let zemřelo nejvíce osob na nemoci nakažlivé a cizopasně. Zde se jednalo o 8 jedinců. Dalších 7 zemřelých podleho nemocem soustavy nervové a čidel a 5 obětí registrujeme nemoci ústrojí oběhu krevního a nemoci ústrojí dýchacího.

Následky stařecké sešlosti zemřelo 15 osob ve věku nad 65 let. U 10 jedinců byly příčinou smrti stanoveny nemoci ústrojí dýchacího. Nemocem nakažlivým a cizopasným, nemocem soustavy nervové a čidel a nemocem ústrojí oběhu krevního podleho vždy 3 osoby.

Nejvyšší počet obětí, a to 44, podlehl v roce 1886 nemocem nakažlivým a cizopasným. Nemoci soustavy nervové a čidel byly diagnostikovány u 24 zemřelých a u dalších 22 se jednalo o nemoci ústrojí dýchacího. Na následky nemocí ústrojí zažívacího zemřelo 19 osob a stařecká sešlost byla evidována u 17 jedinců (Graf 8).

2.10 Rok 1887⁹⁵

2.10.1 Výsledky pro rok 1887 dle matričních zápisů

V tomto roce zemřelo celkem 172 osob. Úmrtnost mužů činila 91 jedinců, ženská zahrnovala 81 zemřelých. V součtu je také evidováno 6 mrtvě rozených dětí, kdy se jednalo o 3 chlapce a 3 dívky (Tabulka 17).

Tabulka 17 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1887

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	91	81	172
%	52,9%	47,1%	100%

Nejvyšší úmrtnost se projevila ve věkové skupině dětí do 1 roku, která tvořila 28,49% celku, naopak nejméně osob zemřelo v rozmezí 1–14 let. Tato skupina představovala 11,63% z celkového počtu (Tabulka 18).

Ve věku do 1 roku zemřelo celkem 49 dětí. Výrazně převyšoval počet zemřelých chlapců, kterých bylo 29, oproti 20 dívkám. 15 jedinců zemřelo kvůli vrozené slabosti, dalších 11 kvůli onemocněním trávicí soustavy. 4 děti zemřely v důsledku plicních onemocnění mimo tuberkulózu, která byla evidována u 2 zemřelých. Psotníku podlehl také 4 osoby. Objevily se také záněty plen mozkových, morbus brigthii či rozklad krve.

19 dětí zemřelo ve věku od 1 do 14 let. Jednalo se o 8 chlapců a 11 dívek. Devět z nich podlehl onemocnění dýchací soustavy a tuberkulii plic další 4. U 3 dětí byl evidován záněty plen mozkových. Dále se objevily psotník, rhachitis a diphteritis.

Ve věkové skupině osob od 15 do 44 let zemřelo 33 jedinců. S počtem 17 zemřelých osob převyšovala ženská úmrtnost nad mužskou, která zahrnovala 16 jedinců. Nejvíce jich zemřelo na tuberkulózu, celkem 18. Onemocnění dýchacího ústrojí byla evidována jako příčina smrti u 4 jedinců. 3 lidé zemřeli v důsledku alkoholismu, 2 kvůli rozkladu krve a zánětu ledvin.

36 osob zemřelo ve věku 45–64 let. S počtem 22 jedinců výrazně převyšovala mužská úmrtnost nad 14 zemřelými ženami. 7 osob zemřelo na rakovinu. Onemocnění

⁹⁵ Tamtéž, s. 182–200.

dýchací soustavy byla evidována u 6 jedinců, tuberkule plic se vyskytla u dalších 5. Objevily se také talovitost krve, kostižer, výron krve do mozku a další. U jedné ženy bylo zaznamenáno jako příčina úmrtí otřesení mozku při pádu, výlev krve do mozku. Jeden muž spáchal sebevraždu pomocí otrávení fosforem.

Osob starších 65 let zemřelo v tomto roce 34. Jednalo se o 16 mužů a 19 žen. Celkem 16 jedinců zemřelo stářím. Plicní onemocnění byla evidována u 7 osob a rakovina u 3. Jako další příčiny úmrtí byly zapsány zánět mozku, marasmus, zánět ledvin a jiné.

Tabulka 18 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1887

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	29	20	49	28,49%
1–14	8	11	19	11,05%
15–44	16	17	33	19,19%
45–64	22	14	36	20,93%
65+	16	19	34	20,35%
CELKEM	91	81	172	100%

V tomto roce zemřelo nejvíce osob na onemocnění dýchacího ústrojí, a to 30. Tuberkulóze podlehl 29 jedinců. Sešlost věkem byla zaznamenána u 16 osob. 15 dětí podlehl vrozené slabosti a 14 jedinců zemřelo následkem onemocnění trávicí soustavy. Rakovina zabila 11 osob. Zánět plen mozku postihl 7 jedinců a dalších 6 zemřelo kvůli zánětu ledvin.

2.10.2 Výsledky pro rok 1887 dle Bertillonovy klasifikace

Celkem 16 dětí ve stáří do 1 roku zemřelo kvůli zvláštním nemocem útlého věku. U 11 zemřelých byly evidovány nemoci ústrojí zažívacího a u 7 poté nemoci soustavy nervové a čidel.

Osoby ve věkové skupině 1–14 let umíraly nejčastěji následkem nemocí ústrojí dýchacího, kterým podlehl 8 jedinců. Nemoci nakažlivé a cizopasně si vyžádaly pět mrtvých a nemoci soustavy nervové a čidel 4.

Nemoci nakažlivé a cizopasně byly stanoveny jako příčina smrti u 19 osob ve věku 15–44 let. Nemocem soustavy nervové a čidel a nemocem ústrojí dýchacího podlehli 4 jedinci a po 2 zemřelých si vyžádaly nemoci krve a ústrojů krvetvorných, otravy vleklé a prudké a nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního.

Rakoviny a jiné nádory zabily 8 jedinců věkové kategorie 45–64 let. U 6 zemřelých byly důvodem úmrtí nemoci ústrojí dýchacího a u 5 osob to byly nemoci nakažlivé a cizopasně.

Osob starších 65 let zemřelo 16 v důsledku stařecké sešlosti. Nemoci ústrojí dýchacího se vyskytly u 7 osob a u 3 jedinců evidujeme rakoviny a jiné nádory a nemoci soustavy nervové a čidel.

V tomto roce byl největší počet zemřelých evidován v důsledku nemocí nakažlivých a cizopasných, které zabily 33 jedinců. U 29 osob se staly příčinou smrti nemoci ústrojí dýchacího a u dalších 21 nemoci soustavy nervové a čidel. Zvláštním nemocem útlého věku, stejně jako stařecké sešlosti, podlehl 16 jedinců. Nemoci ústrojí zažívacího si vyžádaly 15 zemřelých (Graf 9).

2.11 Rok 1888⁹⁶

2.11.1 Výsledky pro rok 1888 dle matričních zápisů

V roce 1888 zemřelo v Nové Pace celkem 151 obyvatel. Úmrtnost žen převyšovala s počtem 80 jedinců nad muži, kterých zemřelo 71 (Tabulka 19). Souhrn zahrnuje také 11 mrtvě rozených dětí. Zde se jednalo o 6 chlapců a 5 dívek.

Tabulka 19 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1888

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	71	80	151
%	47,0%	53,0%	100%

Nejvyšší úmrtnost byla evidována u dětí ve stáří do 1 roku, která činila 35,76% celku. Nejméně osob zemřelo ve věku od 1 do 14 let. Tato skupina tvořila 4,64% (Tabulka 20).

Ve věkové skupině dětí do 1 roku zemřelo celkem 54 jedinců. Dívek zemřelo 30, čímž převyšovaly úmrtnost chlapců, kterých umřelo 24. Onemocněním trávicí soustavy podlehl 15 jedinců. V lůně matčině zemřelo 10 dětí. Vrozené slabosti jich podlehl 8. Onemocnění dýchací soustavy zabila 5 osob a psotník s křivicí 4. Objevily se také křivice, zánět plen mozkových či narození mrtvého dítěte v důsledku těžkého porodu.

Dětí ve věku od 1 do 14 let zemřelo v tomto roce pouze 7. Mnohem více úmrtí bylo evidováno u dívek, jichž bylo 7, zatímco chlapci zemřeli 2. Tuberkule plic zabila tři osoby. Křivice si vyžádala 2 zemřelé. Jedna dívka zemřela na střevní tyfus a jedna kvůli zánětu střev.

22 jedinců zemřelo ve věkovém rozmezí 15–44 let. 10 zemřelých bylo mužského pohlaví a 12 pohlaví ženského. Tuberkule plic byla uvedena jako příčina úmrtí u 11 osob. Po 2 zemřelých si vyžádaly další plicní onemocnění, srdeční vady a tyfus. Objevila se také mrtvice, morbus brigthii, vodnatelnost, zánět plen mozku či rozklad krve.

⁹⁶ Tamtéž, s. 200–216.

Osob ve věku od 45 do 64 let zemřelo v Nové Pace v tomto roce 35 let. Jednalo se o 19 mužů a 16 žen. Plicním onemocněním podlehl 11 obyvatel. Dalších 5 tuberkulí plic. 3 osoby zemřely v důsledku rakoviny a stejný počet kvůli zánětu ledvin a stáří. Jako další příčiny úmrtí byly uvedeny srdeční vada, rozklad krve či vodnatelnost. Jeden muž zemřel následkem alkoholismu.

33 jedinců umřelo ve věku vyšším 65 let. Mužská úmrtnost činila 16 osob a ženská úmrtnost jich zahrnovala 17. Stářím zemřelo 17 osob. Dalších 7 podlehl tuberkulí plic. Onemocnění dýchací soustavy byla evidována u 4 jedinců. Jako příčiny smrti se objevily také zánět ledvin, mrtvice, talovitost krve a výlev krve do mozku.

Tabulka 20 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1888

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	24	30	54	35,76%
1–14	2	5	7	4,64%
15–44	10	12	22	14,57%
45–64	19	16	35	23,18%
65+	16	17	33	21,85%
CELKEM	71	80	151	100%

V roce 1888 zemřelo nejvíce osob, celkem 26, na tuberkulózu. Dalších 22 jedinců podlehl onemocněním dýchací soustavy a 20 zemřelo stářím. Onemocnění trávicího traktu zabila 16 osob. Nitroděložní úmrtí plodu bylo evidováno u 11 jedinců. Osm dětí podlehl vrozené slabosti. Zánět ledvin zabil 6 osob a 5 jich zemřelo v důsledku křivice.

2.11.2 Výsledky pro rok 1888 dle Bertillonovy klasifikace

V tomto roce se u dětí do 1 roku staly nejčastější příčinou úmrtí „nemoci ústrojí zažívacího“, kterým podlehl 15 jedinců. U 11 osob byly evidovány „zvláštní nemoci útlého věku“. „Nemoci ústrojí dýchacího“ a „nemoci soustavy nervové a čidel“ si vyžádaly po 5 zemřelých.

„Nemoci nakažlivé a cizopasně“ zabily 5 osob ve věkovém rozmezí 1–14 let. „Nemoci ústrojí zažívacího“ a „nemoci rheumatické, nemoci výživové, nemoci endokrinních žláz a jiné nemoci celkové“ byly diagnostikovány vždy u 1 oběti.

Následkem „nemocí nakažlivých a cizopasných“ zemřelo 13 jedinců ve věku mezi 15 a 44 lety. U „nemocí soustavy nervové a čidel“, „nemocí ústrojí oběhu krevního“ a „nemocí ústrojí dýchacího“ byli evidováni 2 zemřelí. Kvůli „nemocem krve a ústrojů krvetvorných“ a „nemocem ústrojí močového a ústrojí pohlavního“ zemřela vždy jedna osoba. Taktéž nebyla u 1 zemřelého diagnostikována pravá příčina úmrtí, tudíž byl zařazen do kategorie „neurčitých příčin úmrtí“.

Ve věkové kategorii 45–64 let umřelo celkem 11 osob v důsledku „nemocí ústrojí dýchacího“. U 7 jedinců propukly „nemoci nakažlivé a cizopasně“ a 3 oběti byly evidovány u „rakovin a jiných nádorů“, „nemocí ústrojí močového a ústrojí pohlavního“ a „stařecké sešlosti“.

„Stařecká sešlost“ byla stanovena příčinou úmrtí u 17 zemřelých starších 65 let. „Nemoci nakažlivé a cizopasně“ zabily 7 jedinců a „nemoci ústrojí dýchacího“ čtyři.

Roku 1888 zemřelo v Nové Pace celkem 34 osob kvůli „nemocem nakažlivým a cizopasným“. U 22 jedinců se staly příčinou úmrtí „nemoci ústrojí dýchacího“. „Stařecká sešlost“ byla evidována u 20 zemřelých. „Nemocem ústrojí zažívacího“ podlehl 16 jedinců a 11 obětí evidujeme u „nemocí soustavy nervové a čidel“ a u „zvláštních nemocí útlého věku“ (Graf 10).

2.12 Rok 1889⁹⁷

2.12.1 Výsledky pro rok 1889 dle matričních zápisů

V tomto roce bylo v matrice zemřelých evidováno 159 osob. Výrazně převyšovala úmrtnost mužů, kterých umřelo 91, oproti 68 ženám (Tabulka 21). Narodily se také 4 mrtvé děti. Jednalo se o 3 chlapce a 1 dívku. Nejstarší zemřelou osobou byl 89letý muž.

Tabulka 21 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1889

	Muži	Ženy	Celkem
Počet	91	68	159
%	57,2%	42,8%	100%

Nejvíce zemřelých jedinců bylo zaznamenáno ve věkové skupině dětí do 1 roku, která tvořila 24,53%. Nejméně osob naopak umřelo ve věku mezi 45 a 64 lety. Tato kategorie představovala 17,61% z celkového počtu (Tabulka 22).

39 dětí zemřelo do prvního roku života. Chlapců bylo evidováno 22 a dívek 17. Celkem 10 jedinců podlehl vrozené slabosti a stejný počet také onemocněním trávicí soustavy. Psotník byl evidován u 8 dětí. Jako další příčiny byly uváděny neštovice, atrophia, zánět plic a další.

Dětí ve věkovém rozmezí od 1 do 14 let zemřelo 29. Jednalo se o 18 chlapců a 11 dívek. U 8 osob byl evidován záškrt. Neštovice se objevily u 5 jedinců, tuberkule plic u 4. Onemocněním trávicí soustavy, zánětu plic a křivici podlehly vždy 2 osoby. Jedna dívka zemřela na následky roztržení lebky, k čemuž došlo náhodou.

31 osob zemřelo ve věku 15–44 let. Jedinců mužského pohlaví bylo 15, ženského 16. Nejčastější příčinou smrti se stala tuberkule plic, která byla zapsána u 19 osob. 4 obyvatelé zemřeli důsledkem zánětu ledvin. Dalšími příčinami smrti se staly neštovice, zánět pobřišnice, rozklad krve a další. 1 žena zemřela následkem popálení petrolejem a 1 muž kvůli roztržení lebky, ke kterému došlo náhodou.

⁹⁷ Tamtéž, s. 216–231.

Ve věku od 45 do 64 let zemřelo v tomto roce 28 jedinců. Mužská úmrtnost převyšovala s počtem 19 osob úmrtnost žen, kterých bylo evidováno 9. Celkem 10 osob podleho tuberkuli plic. Další plicní onemocnění byla zapsána jako příčina smrti u 5 jedinců a zánět ledvin u 3. Následkem alkoholismu zemřely 2 osoby a jeden muž spáchal sebevraždu oběšením.

Ve věku vyšším 65 let zemřelo 32 jedinců. Mužská úmrtnost čítala 17 osob a ženská 15. Stáří bylo jako příčina smrti uvedeno u 11 zemřelých. Plicním onemocněním podleho 5 osob, tuberkuli plic 3. Důsledkem zánětu ledvin a taktéž výlevu krevního do mozku zemřely 2 osoby. Objevily se také úplavice, rozklad krve, rakovina žaludku a jiné. 1 muž se oběsil.

Tabulka 22 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1889

	Muži	Ženy	Celkem	%
0–1	22	17	39	24,53%
1–14	18	11	29	18,24%
15–44	15	16	31	19,50%
45–64	19	9	28	17,61%
65+	17	15	32	20,13%
CELKEM	91	68	159	100%

Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána důsledkem tuberkulózy, které podleho 36 osob. Onemocněním trávicí soustavy podleho 16 osob a onemocnění soustavy dýchací 15. Stářím zemřelo 11 jedinců a vrozená slabost byla zaznamenána u 10 dětí. Devět zemřelých si vyžádal záškrt, 8 božec a 7 neštovice.

2.12.2 Výsledky pro rok 1889 dle Bertillonovy klasifikace

Celkem 10 dětí ve věkové skupině 0–1 rok zemřelo následkem nemocí ústrojí zažívacího, zvláštních nemocí útlého věku a nemocí soustavy nervové a čidel. Nemoci nakažlivé a cizopasně zabily 2 děti, rakoviny a jiné nádory, stejně jako nemoci ústrojí dýchacího evidovaly 1 oběť.

U osob ve věku 1–14 let se v 18 případech staly příčinou smrti nemoci nakažlivé a cizopasně. Vrozené vady tvarové, nemoci ústrojí dýchacího, nemoci ústrojí zažívacího a nemoci rheumatické, nemoci výživové, nemoci endokrinních žláz a jiné nemoci celkové evidujeme vždy u 2 zemřelých. Nemoci soustavy nervové a čidel, nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního a smrti násilné a úrazové si vyžádaly po 1 oběti.

Nemocem nakažlivým a cizopasným podlehl 20 osob ve věkové kategorii 15–44 let. Na následky nemocí ústrojí močového a ústrojí pohlavního zemřelo pět jedinců. U 2 zemřelých nebyla určena skutečná příčina smrti, jednalo se tedy o neurčité příčiny úmrtí.

Ve stáří mezi 45 a 64 lety zemřelo 10 jedinců na nemoci nakažlivé a cizopasně. Nemocem ústrojí dýchacího podlehl 5 jedinců a u 3 byly příčinou smrti stanoveny nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního.

U osob starších 65 let byla nejčastěji příčinou smrti stanovena stařecká sešlost, která byla stanovena u 9 zemřelých. Nemocem ústrojí dýchacího podlehl 5 jedinců a 4 osoby zemřely následkem nemocí nakažlivých a cizopasných.

Nemoci nakažlivé a cizopasně v tomto roce postihly 54 obyvatel města. Nemocem soustavy nervové a čidel podlehl 17 osob a nemocem ústrojí zažívacího 16. U 14 jedinců byly diagnostikovány nemoci ústrojí dýchacího. Stařecká sešlost a nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního zabily po 11 osobách (Graf 11).

2.13 Shrnutí počtu zemřelých, pohlaví, věkových skupin a úmrtí v jednotlivých měsících roku

V časovém rozmezí let 1879–1889 zemřelo v Nové Pace celkem 1748 osob. Nejméně jich umřelo roku 1879, kdy 122 zemřelých tvořilo 6,98% celku. Nejvyšší úmrtnost byla evidována roku 1886, kdy zemřelo 183 jedinců, tedy 10,47% celku (Tabulka 23). Vyšší úmrtnost byla evidována u mužského pohlaví a tvořila 921 mrtvých, tedy 53% celku. Žen zemřelo 827, tedy 47% celku. Nejpočetnější skupinou zemřelých byly osoby ve věku 0-1 rok, kterých zemřelo celkem 418, čili 23,9%. Mimo mrtvě narozené děti, které tvořily s počtem 56 jedinců 3,2%, byla nejméně početná skupina osob ve věku 1–14 let. V té zemřelo 203 osob, tedy 11,6% celku (Tabulka 24). S ohledem na měsíce roku byla nejvyšší úmrtnost zaznamenána v dubnu, kdy bylo evidováno 188 úmrtí. O 2 zemřelé méně registrujeme v květnu. Třetím měsícem v pořadí je březen, kdy umřelo 178 jedinců. Měsíce první poloviny roku si vyžádaly vyšší počet zemřelých, než měsíce poloviny druhé (Graf 12).

Tabulka 23 Počet zemřelých osob v každém roce zkoumaného období

Rok	Počet zemřelých	% z celku
1879	122	6,98%
1880	160	9,15%
1881	154	8,81%
1882	150	8,58%
1883	182	10,41%
1884	143	8,18%
1885	172	9,84%
1886	183	10,47%
1887	172	9,84%
1888	151	8,64%
1889	159	9,10%
Celkem	1748	100%

Tabulka 24 Úmrtnost podle pohlaví a věkových skupin za celé zkoumané období

Věková skupina	Muži		Ženy		Celkem %	
	Počet	% v dané skupině	Počet	% v dané skupině	Počet	% celkem
Mrtvorozené děti	32	3%	24	2,9%	56	3,2%
0–1	231	25%	187	22,6%	418	23,9%
1–14	92	10%	111	13,4%	203	11,6%
15–44	180	20%	159	19,2%	339	19,4%
45–64	209	23%	156	18,9%	365	20,9%
65+	177	19%	190	23,0%	367	21,0%
CELKEM	921	53%	827	47%	1748	100%

2.14 Shrnutí nejčastějších příčin úmrtí dle skupin Bertillonovy klasifikace

V celkovém souhrnu zkoumaných let se nejvyšší úmrtnost projevila u nemocí nakažlivých a cizopasných, kterým podlehl 488 osob, tedy 27,92% všech zemřelých. Druhou nejčastější příčinou smrti se staly nemoci ústrojí dýchacího, které postihly 240 jedinců (13,73%). Nemocem soustavy nervové a čidel podlehl 194 osob (11,1%). Častým důsledkem smrti byly též nemoci ústrojí dýchacího, které postihly 174 obyvatel města, tedy 9,95% celku. Stařecká sešlost byla evidována u 120 jedinců (6,86%). Zvláštní nemoci útlého věku byly diagnostikovány u 110 dětí, které tvořily 6,29% zemřelých. U ostatních skupin byla úmrtnost nižší než 100 jedinců (Tabulka 25, Graf 13).

Tabulka 25 Počet mrtvých v letech 1879–1889 dle skupin příčin úmrtí Bertillonovy klasifikace

Skupina příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	CELKEM
I.	36	51	41	37	58	52	48	44	33	34	54	488
II.	5	3	5	9	3	2	6	5	11	3	3	55
III.	1	1	1	2	2	4	5	4	0	5	2	27
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	0	0	1	1	0	0	2	1	2	1	1	9
VI.	13	16	18	18	19	18	22	24	21	11	14	194
VII.	5	11	10	4	6	5	11	11	2	4	3	72
VIII.	13	17	29	25	28	21	20	22	29	22	14	240
IX.	13	19	14	21	14	15	12	19	15	16	16	174
X.	3	2	1	2	5	0	1	9	6	6	11	46
XI.	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5
XII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
XIV.	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	6
XV.	9	10	9	5	14	4	10	10	16	12	11	110
XVI.	3	8	9	7	10	6	11	19	16	20	11	120
XVII.	2	2	4	2	2	2	3	3	2	0	5	27
XVIII.	9	11	8	8	13	6	13	5	4	2	2	81
XIX. ⁹⁸	4	4	3	5	4	4	7	4	6	11	6	58

2.15 Shrnutí nejčastějších nemocí uvedených jako příčina smrti

V Nové Pace zemřelo nejvíce osob následkem tuberkulózy plic, přesně 346 jedinců. Ostatní onemocnění dýchacího ústrojí postihla 245 zemřelých a nemocem trávicího traktu podlehl 159 osob. Sešlost věkem byla jako příčina smrti evidována u 123 zemřelých a u 111 jedinců byla příčinou úmrtí stanovena vodnatelnost. Vrozené slabosti podlehl 94 dětí. Dalších 57 osob umřelo následkem ústrojné vady srdce. U 56 zemřelých byla příčinou smrti stanovena rakovina. Tyfus byl evidován u 48 jedinců a 41 osob podlehl onemocnění ledvin.

⁹⁸ Mrtvě narozené děti.

2.16 Nejčastější skupiny příčiny úmrtí s ohledem na pohlaví zemřelých

Vzhledem k nejvyššímu počtu zemřelých na následky nemocí nakažlivých a cizopasných, právě zde vidíme i největší rozdíly v úmrtnosti dle pohlaví. Tyto choroby častěji postihovaly muže, a to celkem o 38 osob. Stejně tak nemocem ústrojí dýchacího podlehl více mužů. Bylo jich o 54 více, než žen. Naproti tomu důsledkem stařecké sešlosti umíraly častěji ženy, přičemž v této skupině činil rozdíl 32 osob. Tuto rozdílnost nelze přisuzovat předpokladu vyššího úmrtního věku ženského pohlaví, jelikož ve zkoumaném období činil průměrný věk žen 33,307 let a mužů 33,308 let. Zvláštní nemoci útlého věku se projevily častěji u chlapců, kterých zemřelo o 26 více než děvčat. U žen se častěji stalo, že nebyla určena pravá příčina smrti, celkem se jednalo o rozdíl 19 jedinců. O 18 mužů více než žen podlehl nemocem soustavy nervové a čidel a o 17 více jich zemřelo následkem smrti násilných a úrazových. U ostatních skupin činil rozdíl mezi jednotlivými pohlavími méně než 10 jedinců (Tabulka 26).

Tabulka 26 Počet zemřelých osob dle skupin příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace s ohledem na pohlaví

	Muži	Ženy
I.	263	225
II.	24	31
III.	12	15
IV.	16	12
V.	8	1
VI.	107	89
VII.	31	41
VIII.	147	93
IX.	84	91
X.	25	21
XI.	1	4
XII.	0	0
XIII.	1	4
XIV.	4	2
XV.	68	42
XVI.	44	76
XVII.	22	5
XVIII.	31	50

2.17 Srovnání úmrtnosti v daném období v různých městech Čech

Pro srovnání statistických výsledků této práce je vhodné uvést údaje z jiných měst nacházejících se na našem území.

V Hradci Králové v letech 1883–1889 zemřelo celkem 863 osob, oproti Nové Pace převažovala úmrtnost žen, která činila 437 jedinců, zatímco mužů zemřelo 426. Stejně jako v Nové Pace zemřelo nejvíce osob ve věku do 1 roku (23,5%) a nejméně mrtvých bylo evidováno ve věkové skupině 1–14 let (15,1%). Celkem 29 dětí se narodilo mrtvých. Nejvíce osob zemřelo důsledkem nemocí soustavy nervové a čidel (26,1%), nemocí nakažlivých a cizopasných (24,4%) a stařecké sešlosti (18,5%).⁹⁹

⁹⁹ M. VAŠATA, *Příčiny úmrtí královéhradeckého obyvatelstva ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909*, s. 52–56.

V Novém Bydžově převažovala v letech 1885–1895, stejně jako v Nové Pace, úmrtnost mužů, kterých zemřelo 1276, zatímco žen 1135. Nejvíce zemřelých zde bylo evidováno ve věkové skupině 15–59 let a nejméně jednotlivců zemřelo ve věku 1–14 let. Mrtvých dětí se narodilo 90. Zde se stala nejčastější příčinou úmrtí tuberkulóza dýchacího ústrojí (28,4%). Dále pak stařecká sešlost (10,2%) a po ní zánět plic, záškrť a rakovina.¹⁰⁰

Mezi lety 1883–1889 zemřelo v Kroměříži 701 mužů a 657 žen. Místní kronika evidovala 22 mrtvorozených dětí. Nejčastěji byly příčinou smrti stanoveny nemoci nakažlivé a cizopasně (23%), stařecká sešlost (11%) a nemoci ústrojí dýchacího (10%). U 18% zápisů nebyl autor schopný určit příčinu úmrtí, jelikož zápisy byly složeny pouze z doprovodných jevů chorob.

V Kladně v těchto letech převažovala s počtem 1847 zemřelých úmrtnost mužů nad ženami, kterých bylo evidováno 1665. Nejvíce jedinců zemřelo následkem nemocí nakažlivých a cizopasných (34%), nemocí ústrojí dýchacího (16%), nemocí ústrojí zažívacího (12%) a nemocí soustavy nervové a čidel (12%).¹⁰¹

¹⁰⁰ P. NOVOTNÁ, *Příčiny úmrtí v Novém Bydžově v letech 1885–1895 ve světle matričních zápisů*, s. 119–123.

¹⁰¹ P. VESELÝ, *Statistické zpracování příčin úmrtí v Kladně a Kroměříži podle matrik zemřelých z let 1883–1889*, s. 32–35.

ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření statistiky příčin úmrtí v Nové Pace v letech 1879–1889 a to na základě záznamů uvedených v matrice zemřelých pro léta 1878–1905 farního úřadu v Nové Pace, nacházející se v Státním oblastním archivu Zámorsk ve sbírce matrik Východočeského kraje.

V první části jsou charakterizovány prameny užitá pro získání informací nezbytných pro vytvoření této práce. Dále je zde popsána historie Nové Paky a poté její vývoj v oblasti průmyslu, dopravy, školství a zdravotnictví především v období 19. století. Nachází se zde také informace o stavu lékařství v českých zemích ve 2. polovině 19. století obecně, jelikož se jedná o podstatné informace, které dokazují masivní pokrok v této oblasti. Vzhledem k použití Bertillonovy klasifikace nemocí a příčin smrti pro vytvoření statistických údajů bylo nutné nastínit i historii tohoto dokumentu a jeho postupný vývoj. Posledním bodem této části je seznámení s historií klasifikací příčin úmrtí, které se užívaly na našem území až do doby zavedení klasifikace výše zmíněné.

Druhá část je tvořena statistickým výzkumem, který vychází ze zápisů uvedených v matrice zemřelých. Některé zde uvedené příčiny smrti však nelze považovat za důvěryhodné a správné, jelikož se v mnoha případech jednalo pouze o symptomy doprovázející skutečný důvod úmrtí. Stejně tak se často vyskytovaly příčiny úmrtí typu stařecká sešlost či vrozená slabost, které pod svým názvem mohly skrývat jakékoli choroby. V průběhu zkoumaných let se ve vedení zápisů vystřídali 2 písaři, přičemž písmo obou z nich bylo velmi dobře čitelné, psali česky, pouze několik diagnóz bylo uvedeno latinsky.

Díky zkoumání matričních záznamů bylo zjištěno, že nejčastějšími příčinami smrti novopackého obyvatelstva se staly nemoci nakažlivé a cizopasně, které postihly z celkového počtu 1748 jedinců 488 osob. Nemoci ústrojí dýchacího si vyžádaly 240 zemřelých a nemoci soustavy nervové a čidel 194. Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána ve věkové skupině osob do 1 roku, která činila 418 jedinců. Oproti tomu nejméně početnou skupinou zemřelých se staly děti ve věku 1–14 let, kterých

zemřelo 203. Mimo toto porovnání se nachází skupina dětí mrtvě narozených, kterých matrika evidovala 56.

Výzkum také zahrnoval porovnání úmrtnosti jednotlivců dle pohlaví. Bylo zjištěno, že častěji umírali muži, jejichž mortalita činila 921 osob, zatímco žen zemřelo 827. U mužské části obyvatelstva se více objevovaly nemoci nakažlivé a cizopasně, nemoci ústrojí dýchacího, zvláštní nemoci útlého věku či smrti násilné a úrazové. Více žen než mužů zemřelo v důsledku stařecké sešlosti. Nestalo se tak však, jak by bylo možné předpokládat, kvůli vyššímu věku dožití žen, jelikož průměrný věk obyvateľky Nové Paky činil ve zkoumaném období 33,307 let a průměrný věk muže byl 33,308 let. Stejně tak právě u žen nebyla častěji diagnostikována pravá příčina úmrtí.

V porovnání s ostatními městy, která byla podrobena zkoumání, lze říci, že pouze v Hradci Králové činily vyšší procento zemřelých osoby ženského pohlaví. Kroměříž, Nový Bydžov i Kladno, stejně jako Nová Paka, zaznamenaly vyšší úmrtnost mužů. Nemoci nakažlivé a cizopasně byly s velkým rozdílem zemřelých nejčastější příčinou smrti nejen v Nové Pace, ale také v Kladně, Kroměříži i Novém Bydžově. V Hradci Králové zemřelo nejvíce osob následkem nemocí soustavy nervové a čidel.

Data shromážděná v této práci by bylo možné podrobit dalšímu výzkumu dle jiných kritérií. Bylo by možné zaměřit se na spojitost jednotlivých onemocnění se zaměstnáním a předpokládanou životní úrovní jedinců. Stejně tak by bylo možné vytvořit statistiky zaznamenávající počet zemřelých v místní nemocnici a nejčastější příčiny úmrtí, které se zde vyskytovaly. Dalším zajímavým výzkumem by bylo porovnání počtu zemřelých a narozených v Nové Pace. V neposlední řadě by bylo možné zkoumat podrobněji úmrtnost v jednotlivých věkových kategoriích. Tato práce však měla cíle stanovené jiné cíle, proto se výše zmíněné možnosti výzkumu v práci neobjevují.

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY

PRAMENY:

SOA Zámorsk, SOkA Jičín, fond Archiv města Nová Paka: Epidemie nemocí, kart. č. 117, inv. č. 954.

: Městští lékaři, systematizace míst, platy, kart. č. 113, inv. č. 942.

: Zápis ohlášených onemocnění nebo úmrtí nakažlivými nemocemi, hlášení povinnými obci, kart. č. 117, inv. č. 955.

SOA Zámorsk, SOkA Jičín, fond Farní úřad Nová Paka, Ohledací lístky, kart. č. 35–37.

SOA Zámorsk, fond Sběrka matrik Východočeského kraje 1587–1949, Farní úřad Nová Paka, Matrika zemřelých 1878–1905, inv. č. 6553, kniha č. 6553.

LITERATURA:

Miloslav BAŘINA, *Z historie podnikání na Novopacku*, Achát 10, 2010, s. 25–27.

Miloslav BAŘINA, *Z historie podnikání na Novopacku*, Achát 11, 2010, s. 27–28.

Zdeněk BENEŠ, *Dějiny Nové Paky I. (do roku 1939)*, Praha 2012.

Josef BERAN, *Paměti města Nové Paky*, Praha 1871.

Jiří BRDLÍK, *Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval*, Praha 1957.

Jaroslav ČERNÝ, *Vývoj matričního záznamu z hlediska uvádění úmrtní diagnózy*, Genealogické a heraldické listy 2, 1993, s. 19–22.

Karel CHOUDONSKÝ – Josef THOMAYER, *Zdravotní slovník. Poučení o věcech lékařských pro kruhy širší*, Praha 1901.

František JIRŮTKA, *Okres novopacký v dějinách národních*, Jičín 1898.

*Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
Desátá revize obsahová aktualizace k 1.4.2014, technické opravy k 1.3.2017, Praha
2013.*

Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti, Bertillon, revise 1929, Praha 1934.

Novopacko: Vlastivědná monografie okresu, díl III., Nová Paka 1929.

Novopacko: Vlastivědná monografie okresu, díl II., Nová Paka 1927.

Petra NOVOTNÁ, *Příčiny úmrtí v Novém Bydžově v letech 1885–1895 ve světle
matričních zápisů*, bakalářská práce na KPVHA UHK, Hradec Králové 2016.

Vladimír SRB – Václav HAAS, *Statistika příčin smrti a statistická klasifikace nemocí,
úrazů a příčin smrti v Československu*, Praha 1956.

Jan K., STRÍTESKÝ, *Zdravotní a populační vývoj československého obyvatelstva*,
Praha 1971.

Petr SVOBODNÝ – Ludmila HLAVÁČKOVÁ, *Dějiny lékařství v českých zemích*,
Praha 2004.

Martin VAŠATA, *Příčiny úmrtí královéhradeckého obyvatelstva ve světle matričních
záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909*, bakalářská práce na KPVHA UHK, Hradec
Králové 2014.

Pavel VESELÝ, *Statistické zpracování příčin úmrtí v Kladně a Kroměříži podle matrik
zemřelých z let 1883–1889*, bakalářská práce na KPVHA UHK, Hradec Králové 2012.

Petr VOSTATEK, *Stav obecného školství na Hořicku a Novopacku roku 1869*, Hořice
1929.

ELEKTRONICKÉ ZDROJE:

Slovníčky – Nejčastější příčiny úmrtí – Genea, genealogické stránky. Dostupné z:
<http://www.genea.cz/informace/slovnicky/nejcastejsi-priciny-umrti/>, [cit. 25. 2. 2017].

Geografické údaje – Nová Paka, oficiální web města. Dostupné z:
<http://www.munovapaka.cz/geograficke-udaje/ds-8560/p1=13357>, [cit. 28. 11. 2016].

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

TABULKY:

Tabulka 1 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1879.	26
Tabulka 2 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1879.	27
Tabulka 3 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1880.	29
Tabulka 4 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1880.	30
Tabulka 5 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1881.	32
Tabulka 6 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1881.	33
Tabulka 7 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1882.	35
Tabulka 8 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1882.	36
Tabulka 9 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1883.	38
Tabulka 10 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1883.	39
Tabulka 11 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1884.	41
Tabulka 12 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1884.	42
Tabulka 13 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1885.	44
Tabulka 14 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1885.	45
Tabulka 15 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1886.	47
Tabulka 16 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1886.	48
Tabulka 17 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1887.	50
Tabulka 18 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1887.	51
Tabulka 19 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1888.	53
Tabulka 20 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1888.	54
Tabulka 21 Úmrtnost podle pohlaví v roce 1889.	56
Tabulka 22 Úmrtnost podle věkových skupin v roce 1889.	57
Tabulka 23 Počet zemřelých osob v každém roce zkoumaného období.	59
Tabulka 24 Úmrtnost podle pohlaví a věkových skupin za celé zkoumané období.	60


Tabulka 25 Počet mrtvých v letech 1879–1889 dle skupin příčin úmrtí Bertillonovy klasifikace.....	61
---	----

Tabulka 26 Počet zemřelých osob dle skupin příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace s ohledem na pohlaví.....	63
--	----


GRAFY:

Graf 1 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1879.....	71
Graf 2 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1880.....	71
Graf 3 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1880.....	72
Graf 4 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1882.....	72
Graf 5 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1883.....	73
Graf 6 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1884.....	73
Graf 7 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1885.....	74
Graf 8 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1886.....	74
Graf 9 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1887.....	75
Graf 10 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1888.....	75
Graf 11 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1889.....	76
Graf 12 Úmrtnost v závislosti na měsících roku.....	76
Graf 13 Celkový počet zemřelých dle skupin Bertillonovy klasifikace.....	77


Graf 1 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1879




Graf 2 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1880




Graf 3 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1880




Graf 4 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1882




Graf 5 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1883




Graf 6 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1884




Graf 7 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1885




Graf 8 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1886




Graf 9 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1887




Graf 10 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1888




Graf 11 Příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace v roce 1889



Graf 12 Úmrtnost v závislosti na měsících roku



Graf 13 Celkový počet zemřelých dle skupin Bertillonovy klasifikace



3 SEZNAM PŘÍLOH

3.1 Obrazové přílohy

Obrazová příloha 1 Ukázka z matriky zemřelých (1878–1905), inv. č. 6553, kniha č. 6553 s. 106–107.....	79
Obrazová příloha 2 Ohledací lístek s předtištěným formulářem.....	80
Obrazová příloha 3 Ohledací lístek psaný ručně.....	81
Obrazová příloha 4 Zpráva obecního lékaře o výskytu neštovic v roce 1889.....	82
Obrazová příloha 5 Zpráva od obecního úřadu MUDr. Matysovi o jeho stanovení obecním lékařem.....	83
Obrazová příloha 6 Pohled z roku 1866 na část novopackého náměstí s kostelem sv. Mikuláše.....	84
Obrazová příloha 7 Nemocniční místnost v prostoru, kde se dříve nacházel klášterní refektář.....	84
Obrazová příloha 8 Budova paulánského kláštera s nemocnicí.....	85
Obrazová příloha 9 Místní lékárna.....	85

3.2 Textové přílohy


Textová příloha 1 Skupiny příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace, revise z roku 1929.....	86
Textová příloha 2 Skupiny příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace z roku 1893.....	87
Textová příloha 3 Klasifikace příčin smrti v českých zemích k roku 1871.....	88
Textová příloha 4 Skupiny příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace z roku 1893.....	89
Textová příloha 5 Tabešní zpracování záznamů z novopacké matriky zemřelých 1879-1889.....	90

Obrazová příloha 1 Ukázka z matriky zemřelých (1878–1905), inv. č. 6553, kniha č. 6553 s. 106–107

1873.		Nová Paka.				1873.		Nová Paka.			
Den a měsíc	Úmrtí pohřbu	Číslo domu	Jmeno, stav, rodistě zemřelého	Náboženství		Pohlaví		Stáří		Nemoc a způsob úmrtí	
				katolická	evangelická	mužské	ženské	rok	měsíc	let	in
3. 5.	Dubna	222	Anna, manj. Jeana Prantiska Neumanna v manželství a pěstování Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.	1-20				Zaboucha v úmrt. listku ze dne 4. dubna. Čís. 103.	
4. 6.	Dubna	144	Josef, manj. Jozef mlynářský z Dubna naroz. v manželství v roce 1842. a pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.	67				Bolesť katar s nádornou plíc v úmrt. listku ze dne 4. dubna. Čís. 103.	
4. 6.	Dubna	144	Jeana Marie, manj. Jeana Jáchuba Jozef v úmrt. listku ze dne 4. dubna. Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.	17				Katolická v úmrt. listku ze dne 4. dubna. Čís. 104.	
7. 9.	Dubna	144	Jeana Josef, syn po Josefu Jozefovi, kováři v úmrt. listku ze dne 9. dubna. Pohřb. Václav Křiváček, Kapl.	Ev.	ž.	44				Talovitost katar v úmrt. listku ze dne 9. dubna. Čís. 106.	
8. 10.	Dubna	144	Kateřina, manj. Prantiska Křiváčekova, obuvníka ze Dubna, naroz. v manželství v roce 1842. a pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.	74				Hubnatost v úmrt. listku ze dne 8. dubna. Čís. 107.	
5. 10.	Dubna	273	Jeana Anna, vdova po Prantisku Jeany, mlynář v úmrt. listku ze dne 9. dubna. Pohřb. Václav Křiváček, Kapl.	Ev.	ž.	75				Ještělost v úmrt. v úmrt. listku ze dne 9. dubna. Čís. 105.	
9. 11.	Dubna	193	Josef, manj. Křiváček, syn Josefa Křiváčekova naroz. v manželství v roce 1842. a pohřb. Václav Křiváček, Kapl.	Ev.	ž.	19				Janet plíc. v úmrt. listku ze dne 9. dubna. Čís. 109.	
10. 12.	Dubna	370	Josef, manj. syn Antonína Křiváčka matice Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.					Ubylé v úmrt. listku ze dne 10. dubna. Čís. 110.	
11. 13.	Dubna	169	Josef, manj. syn Josefa Křiváčekova naroz. v manželství v roce 1842. a pohřb. Václav Křiváček, Kapl.	Ev.	ž.					Ubylé v úmrt. listku ze dne 12. dubna. Čís. 111.	
11. 13.	Dubna	144	Marie, manj. Jeana v úmrt. listku ze dne 11. dubna. Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.	49				Bolesť katar s nádornou plíc v úmrt. listku ze dne 11. dubna. Čís. 112.	
11. 13.	Dubna	313	Marie, manj. Jeana Jeana Karel Jáchuba, kováři v úmrt. listku ze dne 12. dubna. Pohřb. Václav Křiváček, Kapl.	Ev.	ž.					Ubylé v úmrt. listku ze dne 12. dubna. Čís. 113.	
13. 15.	Dubna	333	Bedřich, manj. syn Božena Víta, obuvníka Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.					Bojec v úmrt. listku ze dne 14. dubna. Čís. 115.	
15. 17.	Dubna	38	Marie, manj. Jeana Antonína Křiváčka v úmrt. listku ze dne 15. dubna. Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.					Bojec v úmrt. listku ze dne 15. dubna. Čís. 119.	
17. 19.	Dubna	314	Božena, manj. Jeana Josefa Nováčka, učitel na míst. škole Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.					Ubylé v úmrt. listku ze dne 18. dubna. Čís. 124.	
18. 20.	Dubna	126	Erbanová Vítko, vdova po Josefu Erbanovi, kováři v úmrt. listku ze dne 18. dubna. Pohřb. August. Lhánský, Kapl.	Ev.	ž.	32				Ještělost v úmrt. v úmrt. listku ze dne 18. dubna. Čís. 126.	

Obrazová příloha 2 Ohledací lístek s předtištěným formulářem

SOA Zámorsk, SOKA Jičín, fond Farní úřad Nová Paka, Ohledací lístky, kart. č. 35–37.





Úmrtní list.

Křtící jméno a příjmení *Františka Jisnová, rozená Klementová*
Stav *manželka Františka Jisnová, šv. J. Lukla ze Staré u Semce*
Místo narození a otcina *Loučice*
Náboženství *Katolická*
Stáří *50 let*
Všeobecná okresní nemocnice *ve Staré Pace č. 79.*
Poslední nemoc *raněná mrtvice / Apoplexia sanguinosa / Prolaps.*
Hojivší lékař nebo ranhojič *A*
Den a hodina úmrtí *23. prosince po půl noci*
Den a hodina pohřbu *25. prosince* *Mat. den 18. an.*
Dej. Kámo'
Fr. Jisnová
ohližitel mrtvých.
V. & A. Janata, N. Hydčov.

Obrazová příloha 3 Ohledací lístek psaný ručně

SOA Zámorsk, SOkA Jičín, fond Farní úřad Nová Paka, Ohledací lístky, kart. č. 35-37.



Obrazová příloha 4 Zpráva obecního lékaře o výskytu neštovic v roce 1889

SOA Zámorsk, SOkA Jičín, fond Archiv města Nová Paka, Zápis ohlášených onemocnění nebo úmrtí nakažlivými nemocemi, hlášení povinnými obci, kart. č. 117, inv. č. 955.

D. 170
1889

Onemocnění neštovicemi objevuje se na všech stranách města, jest roztroušené,
Většinou jsou to případy prozivé a jen výjím,
kou jsou případy u kterých jen poče neštovice
se objevují.
V školních dětech je případů nejvíce, a podepsaný je
převěděn, že škola je tím zdrojem, odkud nákaza
na vše strany se rozšíří a školní děti to jsou,
kteří i dospělým nákaou přenášejí, samy při tom
ani onemocní, proto podal podepsaný návrh
panu purkmistrovi jako předsedovi el. místní
školní rady, aby školy opět se zavřely a to
na dobu nejméně tři neděl.

V Nové Pace dne 27. ledna 1889

J. Václavětka,
městský lékař nys.

Obrazová příloha 5 Zpráva od obecního úřadu MUDr. Matysovi o jeho stanovení obecním lékařem

SOA Zámorsk, SOkA Jičín, fond Archiv města Nová Paka, Městští lékaři, systematizace míst, platy, kart. č. 113, inv. č. 942

Číslo 322 obca.
17886

Obecní zastupitelstvo v obci Zámorsk
přijalo dne 10. února 1926
MUDr. Matysovi
v
pověřeno!

Obecní zastupitelstvo v obci Zámorsk rozhodlo se ve schůzi dne 10. února 1926 ustanovit obecním lékařem MUDr. Matysovi v obci Zámorsk.

Je úřadu lékařem náležejícím k obci Zámorsk dle ústřední lékařské rady v obci Zámorsk, a bude mu poskytnuta veškerá právní pomoc a správa zdravotní péče v obci Zámorsk.

Obecní úřad v obci Zámorsk (dne 10. února 1926) se rozhodl obci Zámorsk poskytnout platy za práci se svým úřadem 1. dubna 1926, a bude mu vyplácen v obci Zámorsk v obci Zámorsk.

Je ustanovením, že lékařem v obci Zámorsk bude MUDr. Matysovi, a že obecní zastupitelstvo v obci Zámorsk bude v obci Zámorsk a v obci Zámorsk.


Obecní úřad v obci Zámorsk (dne 10. února 1926) se rozhodl obci Zámorsk poskytnout platy za práci se svým úřadem 1. dubna 1926, a bude mu vyplácen v obci Zámorsk v obci Zámorsk.

Obecní úřad v obci Zámorsk, dne 10. února 1926.
MUDr. Matysovi

MUDr. Matysovi:
MUDr. Matysovi

Obrazová příloha 6 Pohled z roku 1866 na část novopackého náměstí s kostelem sv. Mikuláše

Novopacko: Vlastivědná monografie okresu, díl II., Nová Paka 1927, s. 388.



Obrazová příloha 7 Nemocniční místnost v prostoru, kde se dříve nacházel klášterní refektář

Novopacko: Vlastivědná monografie okresu, díl II., Nová Paka 1927, s. 408.




Obrazová příloha 8 Budova paulánského kláštera s nemocnicí

Novopacko: Vlastivědná monografie okresu, díl II., Nová Paka 1927, s. 413.



Obrazová příloha 9 Místní lékárna

Novopacko: Vlastivědná monografie okresu, díl II., Nová Paka 1927, s. 417.



Textová příloha 1 Skupiny příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace, revise
z roku 1929

Číslo skupiny	Název skupiny
I.	Nemoci nakažlivé a cizopasně
II.	Rakoviny a jiné nádory
III.	Nemoci rheumatické, nemoci výživové, nemoci endokrinních žláz a jiné nemoci celkové
IV.	Nemoci krve a ústrojů krevtovorných
V.	Otravy vleklé a prudké
VI.	Nemoci soustavy nervové a čidel
VII.	Nemoci ústrojí oběhu krevního
VIII.	Nemoci ústrojí dýchacího
IX.	Nemoci ústrojí zažívacího
X.	Nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního
XI.	Nemoci těhotenství, porodu a stavu poporodního
XII.	Nemoci kůže a vaziva podkožního
XIII.	Nemoci kostí a ústrojí pohybu
XIV.	Vrozené vady tvarové
XV.	Zvláštní nemoci útlého věku
XVI.	Stařecká sešlost
XVII.	Smrti násilné a úrazové
XVIII.	Neurčité příčiny úmrtí

Textová příloha 2 Skupiny příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace z roku 1893

Číslo skupiny	Název skupiny
I.	Nemoci celkové
II.	Nemoci ústrojí nervového a čidel
III.	Nemoci ústrojí oběhu krevního
IV.	Nemoci ústrojí dýchacího
V.	Nemoci ústrojí trávicího
VI.	Nemoci ústrojí močového a přívěsků
VII.	Nemoci těhotenství
VIII.	Nemoci kůže a přívěsků
IX.	Nemoci ústrojí pohybového
X.	Vrozené vady vývojové
XI.	Nemoci dětského věku
XII.	Nemoci stáří
XIII.	Zevní příčiny (úrazy)
XIV.	Špatně definovatelné příčiny

Textová příloha 3 Klasifikace příčin smrti v českých zemích k roku 1871

Číslo skupiny	Název skupiny
	Nemoci
1.	Vrozená slabost dětí do 1 roku
2.	Neštovice
3.	Spalničky
4.	Spála
5.	Tyfus
6.	Úplavice
7.	Cholera
8.	Dávivý kašel
9.	Záněty dýchacího ústrojí
10.	Tuberkulóza plic
11.	Střevní katar
12.	Náhlé úmrtí
13.	Novotvary
14.	Vzteklina
15.	Stařecká sešlost
16.	Ostatní nemoci
17.	Násilná smrt
	Násilná smrt
a)	Náhodný úraz
b)	Sebevražda jedem/oběšením/zastřelením/utopením/jiným způsobem
c)	Vražda a zabití jedem/zastřelením/jiným způsobem
	Nejasná zevní příčina

Textová příloha 4 Skupiny příčin úmrtí dle Bertillonovy klasifikace z roku 1893

Číslo skupiny	Název skupiny
1.	Vrozená slabost z důvodu předčasného porodu nebo potratu
2.	Tuberculosa (všechny formy)
3.	Zánět plic
4.	Záškrt
5.	Dávivý kašel
6.	Neštovice
7.	Spála
8.	Spalničky
9.	Skvrnitý tyfus
10.	Břišní tyfus
11.	Úplavice
12.	Asijská cholera
13.	Průjem dětí (cholera infantum)
14.	Průjem ve vyšším věku (enteritis acuta, cholera nostras)
15.	Horečka omladnic
16.	Infekční nemoci z poranění
17.	Ostatní infekční nemoci
18.	Nemoci přenosné ze zvířat - zoonosy
19.	Mozková mrtvice - apoplexia cerebri
20.	Organické srdeční vady a nemoci oběhu krevního
21.	Zhoubné novotvary - carcinomy, sarkomy
22.	Ostatní přirozené příčiny smrti
23.	Úrazy
24.	Sebevražda
25.	Vražda a zabití

Textová příloha 5 Tabelární zpracování záznamů z novopacké matriky zemřelých
1879-1889

Rok	Den	Měsíc	Pohlaví	Stáří	Uvedená příčina smrti	Skupina příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace	Číslo příčiny úmrtí dle Bertillonovy klasifikace
úmrtí							
1879	3	1	m	2 roky a 9 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	3	1	ž	8 hodin	nedospělost následkem předčasného porodu	XV.	Předčasné narození (partus praematurus), nepočítaje v to mrtvě narozené
1879	7	1	ž	7 měsíců a 6 dní	vrozená slabost	XV.	Předčasné narození (partus praematurus), nepočítaje v to mrtvě narozené
1879	10	1	m	41 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	9	1	ž	22 let	horečka omladnic	XI.	Jiné nerozlišené příhody stavu poporodního
1879	11	1	m	40 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	13	1	ž	45 let	chrlení krve	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	14	1	ž	10 let, 7 měsíců a 20 dní	zánět nitroblány srdce	VII.	Prudký zánět nitroblány srdeční (endocarditis acuta)
1879	19	1	ž	2 roky, 7 měsíců a 29 dní	tracení horem dolem (cholera)	I.	Cholera asijská
1879	27	1	m	34 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	28	1	m	11 měsíců	křeč hlasivky	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1879	29	1	ž	8 měsíců a 19 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	30	1	ž	0	-	XIX.	
1879	31	1	ž	2 měsíce a 19 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1879	3	2	ž	40 let	ochrnutí srdce následkem ústrojné vady	VII.	Jiné nemoci srdeční
1879	6	2	m	9 měsíců a 7 dní	katar plic a vodnatelnost mozku	XIV.	Vrozené vady tvarové (nepočítaje v to mrtvě narozené)
1879	8	2	m	56 let	mrtvice následkem počasného alkoholismu	XI.	Alkoholismus vleklý nebo prudký
1879	10	2	ž	2 roky, 5 měsíců a 27 dní	počasný katar plic a hlava vodnatá	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu

1879	11	2	m	6 měsíců a 2 dny	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	13	2	m	22 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	19	2	m	49 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	23	2	m	1 roky a 3 měsíce	rychlý katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1879	25	2	m	11 měsíců a 23 dní	počasný katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1879	28	2	ž	59 let	nabubření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zduření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1879	1	3	m	54 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	6	3	m	36 let	počasný výpotek prsní	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1879	10	3	ž	4 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1879	11	3	m	60 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1879	17	3	m	85 let	počasný katar žaludku a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1879	18	3	m	69 let	vsouknutí střeva	IX.	Jiné nemoci střevní
1879	27	3	m	16 let a 6 měsíců	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1879	27	3	ž	72 let	brighčická zvrhlost ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1879	30	3	m	2 roky, 5 měsíců a 12 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1879	2	4	m	44 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	3	4	m	41 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	6	4	m	0	mrtvice následkem obtížného porodu	XIX.	
1879	6	4	m	65 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	7	4	ž	27 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1879	9	4	ž	10 měsíců	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	11	4	ž	25 let	tyf střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1879	13	4	m	72 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost

1879	14	4	m	16 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1879	16	4	m	10 dní	vrozená slabost a žloutenka novorozenců	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1879	18	4	m	23 let	vnitřní zakrávení následkem samovraždy zastřelením v stavu nepřičetném	XVII.	Jiné vraždy nebo zabití
1879	28	4	ž	1 rok, 9 měsíců a 11 dní	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1879	3	5	ž	21 let, 4 měsíce a 13 dní	tyf	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1879	6	5	ž	2 roky, 5 měsíců a 10 dní	nabubření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1879	7	5	ž	76 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1879	9	5	ž	47 let	vsouknutí střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1879	9	5	m	0	ochrnutí mozku následkem obtížného porodu	XIX.	
1879	13	5	m	25 let	ochrnutí střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1879	16	5	ž	14 dní	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1879	19	5	ž	16 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1879	25	5	m	79 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1879	27	5	ž	4 měsíce a 3 dny	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1879	27	5	m	2 měsíce a 23 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1879	2	6	m	3 měsíce a 7 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	2	6	m	77 let	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	7	6	m	9 měsíců a 5 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	8	6	ž	9 měsíců a 22 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1879	10	6	m	47 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	10	6	m	8 let, 1 měsíc a 11 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1879	11	6	m	53 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	15	6	m	3 roky a 20 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)

1879	15	6	m	1 rok a 9 měsíců	úbyť	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	17	6	ž	23 let, 1 měsíc a 27 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	18	6	ž	37 let	hnilina žeber a zápěstí	XIII.	Jiné nemoci kostí, vyjma tuberculosu
1879	20	6	ž	65 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	8	7	ž	69 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	20	7	m	23 let	ochrnutí mozku následkem sebevraždy střelením	XVII.	Sebevražda střelnými zbraněmi
1879	24	7	ž	43 let	ochrnutí měchýře močového	X.	Nemoci měchýře močového, vyjma nádory
1879	30	7	m	1 a 1/3 dne	ochrnutí plic následkem kataru průdušnic	VIII.	Zánět průdušek (bronchitis)
1879	2	8	ž	23 let, 1 měsíc a 25 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	4	8	m	7 měsíců a 5 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1879	5	8	ž	66 let	tracení horem dolem (cholera)	I.	Cholera asijská
1879	14	8	m	3 měsíce a 5 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1879	16	8	ž	77 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	26	8	ž	55 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1879	3	9	ž	5 let a 25 dní	záškrt	I.	Záškrt (diphtheria)
1879	7	9	m	76 let	močení krve	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1879	7	9	ž	55 let	tyf	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1879	10	9	m	24 let	úplavice	I.	Úplavice střevní (dysenteria)
1879	11	9	m	3 měsíce a 17 dní	puchýřina	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	15	9	ž	1 rok, 1 měsíc a 5 dní	tracení horem dolem	I.	Cholera asijská
1879	15	9	ž	66 let	počasný zánět žaludku	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1879	19	9	ž	49 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1879	24	9	m	49 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	26	9	ž	36 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	28	9	ž	24 let	tyf	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1879	4	10	ž	3 roky a 6 měsíců	mázdřivka	I.	Záškrt (difteria)
1879	6	10	m	5 let a 9 měsíců	záškrt	I.	Záškrt (difteria)
1879	7	10	m	73 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1879	8	10	m	1 měsíc a 19 dní	krtičnatost	I.	příjice (syphilis)
1879	10	10	ž	3 měsíce a 26 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1879	13	10	m	77 let	ochrnutí střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1879	13	10	m	47 let	otřesení mozku a míchy	VI.	Jiné nemoci míchy
1879	19	10	m	14 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1879	20	10	m	13 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1879	27	10	ž	65 let	počasný katar žaludku	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1879	27	10	ž	80 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1879	31	10	ž	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1879	10	11	m	66 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1879	12	11	m	67 let	nabubření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zbudření (oedem), vmetek (embolia), červená záhat' (thrombus) s krvácením a obyčejná záhat' plic
1879	15	11	ž	1 měsíc a 14 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1879	20	11	ž	19 dní	moučníka, katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1879	23	11	ž	41 let	ústrojná vada srdce a vodnatelnost	VII.	Jiné nemoci srdeční
1879	24	11	m	44 let	ústrojná vada srdce a vodnatelnost	VII.	Jiné nemoci srdeční
1879	26	11	ž	45 let	rak materníku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1879	27	11	m	72 let	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu

1879	28	11	ž	41 let	rak pobříšnice	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zaživací a pobříšnice
1879	30	11	m	65 let	hnilina kostí	XIII.	Jiné nemoci kostí, vyjma tuberculosu
1879	30	11	m	65 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1879	1	12	ž	20 let	tyf střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1879	3	12	ž	15 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1879	5	12	m	0	-	XIX.	
1879	5	12	m	62 let	rakovina kosti křížové	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných ústrojů neb ústrojů nerozlišených
1879	5	12	m	24 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1879	19	12	ž	49 let	vodnatelnost následkem krvotoku	XI.	Jiné nerozlišené příhody stavu poporodního
1879	20	12	ž	55 let	nabubření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zbudření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1879	22	12	m	22 let	úbyt mozku a vodnatelnost	VI.	Jiné nemoci míchy
1879	23	12	m	27 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1879	31	12	m	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	2	1	m	52 let	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1880	3	1	m	7 měsíců a 12 dní	ochrnutí střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1880	8	1	ž	35 let	nabubření plic následkem vodokrevnosti	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zbudření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1880	10	1	m	3 měsíce a 25 dní	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	15	1	ž	42 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	16	1	ž	9 měsíců a 17 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	17	1	m	37 let	souchotiny	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	22	1	ž	38 let	tuberkule hrtanu a plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1880	23	1	ž	78 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	31	1	m	31 let	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1880	1	2	ž	53 let	vodnatelnost následkem vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	6	2	m	11 dní	katar hrtanu	VIII.	Nemoci hrtanu (laryngu)
1880	7	2	m	8 měsíců a 22 dní	katar plic a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1880	8	2	m	40 let	paducina a rychlý katar střev	VI.	Padoucnice (epilepsia)
1880	12	2	m	47 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	13	2	ž	81 let	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1880	17	2	m	81 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1880	19	2	ž	61 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	19	2	m	82 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1880	19	2	m	56 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	22	2	ž	66 let	počasný zánět míchy	VI.	Jiné nemoci míchy
1880	23	2	ž	2 roky, 1 měsíc a 23 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1880	1	3	m	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	1	3	ž	12 dní	moučník, katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1880	5	3	m	55 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1880	5	3	ž	75 let	počasný katar střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1880	5	3	ž	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	8	3	m	22 let	ochrnutí plic, vodnatelnost	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1880	10	3	ž	62 let	křeče žaludeční	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1880	12	3	ž	44 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny

1880	14	3	m	71 let	vrhnutí krve	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	14	3	ž	10 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	14	3	m	62 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	15	3	m	6 let	padoucina	VI.	Padoucnice (epilepsia)
1880	15	3	ž	3 měsíce a 2 dny	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	15	3	m	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	17	3	ž	67 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	18	3	ž	1 rok a 1 měsíc	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1880	22	3	m	40 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	22	3	m	6 měsíců a 14 dní	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1880	24	3	m	11 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1880	25	3	ž	78 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	26	3	ž	13 let, 2 měsíce a 5 dní	zánět kloubu kyčelního	XIII.	Nemoci kloubů a jiných orgánů pohybu
1880	26	3	m	58 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	25	3	m	21 let, 8 měsíců a 4 dny	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	29	3	m	56 let	počasný zánět mychy	VI.	Jiné nemoci míchy
1880	30	3	ž	9 měsíců a 23 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1880	5	4	m	84 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	6	4	m	56 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1880	7	4	m	69 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	8	4	m	21 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	9	4	m	70 let	zvrhlost ledvin a močení krve	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1880	10	4	m	55 let	počasný katar střev a vodokrevnost	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1880	10	4	m	18 let a 5 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	11	4	m	52 let	vysílení následkem počasného kataru střev	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1880	13	4	ž	56 let	rak v obličejí	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu

1880	19	4	ž	65 let	úplavice	I.	Úplavice střevní (dysenteria)
1880	23	4	m	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	25	4	m	20 let, 11 měsíců a 4 dny	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	28	4	m	73 let	zvrhlost ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1880	30	4	m	11 měsíců a 25 dní	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1880	2	5	ž	51 let	kyla uskřínutá	IX.	Kýla (hernia), neprůchodnost střeva (obstructio intestini)
1880	3	5	m	0	nedospělost následkem potracení	XIX.	
1880	4	5	m	1,5 hodiny	modřice	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	7	5	m	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	8	5	ž	29 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	11	5	ž	60 let	počasný katar plic a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1880	11	5	m	56 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	11	5	m	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	13	5	m	17 let	tyf	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1880	16	5	m	74 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	17	5	ž	46 let	ochrnutí střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1880	17	5	ž	7 měsíců a 26 dní	tracení horem dolem (cholera)	I.	Cholera asijská
1880	17	5	ž	1 rok, 8 měsíců a 10 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	18	5	m	35 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	23	5	m	64 let	zánět kloubu kyčelního a počasný katar žaludku	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1880	24	5	m	17 let, 3 měsíce a 21 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	24	5	m	16 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	27	5	ž	78 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	29	5	ž	82 let	nádma plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1880	30	5	ž	54 let	zánět plic a pohrudnice	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1880	30	5	m	69 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková

1880	2	6	m	54 let	počasný zánět pobřišnice a vodnatelnost	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1880	4	6	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	6	6	m	40 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	7	6	m	38 let	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1880	8	6	m	2 měsíce a 24 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1880	12	6	m	2 měsíce a 13 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1880	16	6	m	61 let	vsouknutí střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1880	16	6	ž	45 let	vodnatelnost prsní	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	16	6	m	81 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1880	18	6	ž	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	19	6	ž	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	19	6	ž	66 let	ústrojní vada mozku	VI.	Jiné nemoci míchy
1880	23	6	m	40 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	24	6	ž	11 měsíců a 2 dny	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mízní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnicí)
1880	26	6	m	0	nedospělost následkem předčasného porodu	XIX.	
1880	1	7	ž	65 let	ústrojní vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	5	7	m	17 let, 7 měsíců a 17 dní	otřesení mychy, ochrnutí dolních končetin, měchýře močového a střev, nabubření plic	VI.	Jiné nemoci míchy
1880	14	7	m	36 let	zánět počasný pobřišnice, vodnatelnost břišní	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1880	18	7	ž	1 rok a 6 měsíců	vodnatelnost mozku	XIV.	Vrozené vady tvarové (nepočítaje v to mrtvě narozené)
1880	18	7	m	2 roky, 7 měsíců a 9 dní	počasný zánět střev a pobřišnice	IX.	Jiné nemoci střevní
1880	26	7	m	10 měsíců a 27 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	29	7	m	7 měsíců a 27 dní	tracení horem dolem (cholera infantum)	I.	Cholera asijská

1880	6	8	m	63 let	ústrojní vada mozku	VI.	Jiné nemoci míchy
1880	6	8	ž	0	ochrnutí plic následkem obtížného porodu	XIX.	
1880	12	8	ž	21 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	13	8	ž	16 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	19	8	m	3 roky, 6 měsíců a 24 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	20	8	ž	58 let	vodnatelnost následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	20	8	m	2 měsíce a 3 dny	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mizní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnici)
1880	20	8	m	1 měsíc a 17 dní	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mizní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnici)
1880	23	8	m	7 měsíců a 27 dní	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mizní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnici)
1880	25	8	ž	44 let	vodnatelnost následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	28	8	m	7 let, 5 měsíců a 27 dní	ochrnutí mozku a plic následkem náhodného utopení	XVII.	Nahodilé utopení
1880	3	9	ž	51 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	5	9	m	58 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1880	10	9	m	18 let, 11 měsíců a 14 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	16	9	ž	5 měsíců a 14 dní	tracení horem dolem (cholera infantum)	I.	Cholera asijská
1880	17	9	m	49 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	19	9	m	2 roky a 1 měsíc	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	24	9	ž	1 měsíc	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	24	9	ž	84 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice

1880	30	9	ž	28 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	30	9	m	62 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1880	2	10	m	48 let	ochrnutí mýchy	VI.	Jiné nemoci míchy
1880	4	10	m	5 let, 5 měsíců a 1 den	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mízní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnicí)
1880	9	10	m	30 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	10	10	m	0,5 hodiny	ochrnutí plic následkem obtížného porodu	XV.	Jiné
1880	11	10	ž	1 rok, 1 měsíc a 17 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	14	10	ž	9 let	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	16	10	ž	1 měsíc a 18 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	18	10	ž	35 let	úplavice počasná	I.	Úplavice střevní (dysenteria)
1880	20	10	ž	70 let	ústrojná vada srdce a vodnatelnost	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	23	10	m	26 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1880	23	10	m	67 let	katar počasný žaludku a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1880	25	10	m	3 roky a 8 měsíců	mázdřivka	I.	Záškrť (diphtheria)
1880	2	11	ž	59 let	křeče žaludeční	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1880	5	11	ž	0	hlava vodnatá	XIX.	
1880	5	11	ž	19 let	ústrojná vada srdce, vodnatelnost	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	12	11	m	61 let	tuberkule plic a hrtanu	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	14	11	m	87 let	nádma plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1880	15	11	ž	22 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1880	21	11	m	20 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	21	11	ž	42 let	ochrnutí mychy	VI.	Jiné nemoci míchy
1880	22	11	ž	49 let	vytížení následkem počasného kataru žaludku	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1880	25	11	ž	4 roky a 7 měsíců	mázdřivka	I.	Záškrť (diphtheria)

1880	26	11	m	1 minuta	ochrnutí plic následkem obtížného porodu	XV.	Následky porodu
1880	27	11	ž	62 let	katar žaludku a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1880	2	12	ž	1 měsíc a 13 dní	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1880	2	12	ž	7 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1880	12	12	m	9 měsíců a 5 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1880	12	12	ž	28 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1880	14	12	ž	55 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1880	18	12	m	65 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1880	18	12	m	50 let	ochrnutí plic následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1880	19	12	m	70 let	snět starců	VII.	Snět (gangraena)
1880	22	12	m	63 let	ochrnutí plic (samovražda) následkem oběšení ve stavu nepříčetnosti, totiž v ležkomyslnosti	XVII.	Sebevražda oběšením nebo uškrcením
1880	22	12	m	1 měsíc	žloutenice	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatis acuta flava)
1880	29	12	m	34 let	tyf	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1881	2	1	m	11 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1881	4	1	m	2 měsíce a 18 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	5	1	m	63 let	ústrojní vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	7	1	ž	68 let	kostižer a vodnatelnost	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krvetvorných
1881	10	1	ž	6 měsíců a 26 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	11	1	m	17 let	vnitřní zakrvácení následkem samovražděného zastřelení spáchaného v stavu nepříčetném	XVII.	Sebevražda střelnými zbraněmi
1881	17	1	ž	1 rok a 1 měsíc	katar počasný plic a vodnatelnost kožní	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	18	1	m	1 měsíc a 1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)

35,788052

1881	20	1	m	66 let	nabubření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zhubnutí (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1881	31	1	ž	10 měsíců a 15 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	1	2	m	3 roky a 3 měsíce	mázdřivka	I.	Záškrť (difteria)
1881	2	2	ž	82 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1881	5	2	ž	8 let, 10 měsíců a 19 dní	záněť plen mozku	VI.	Prostý záněť plen mozkových (meningitis)
1881	7	2	ž	67 let	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	8	2	ž	72 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1881	13	2	ž	39 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	14	2	ž	1 rok a 10 měsíců	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	14	2	m	1 rok, 6 měsíců a 10 dní	tracení horem dolem	I.	Cholera asijská
1881	19	2	m	61 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1881	19	2	m	52 let	těžkomyslnost	VI.	Předčasná zblbělost a jiné psychosy
1881	20	2	ž	71 let	záněť plic	VIII.	Záněť plic nerozlišený
1881	22	2	m	66 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1881	23	2	ž	72 let	počasný katar žaludku a střev	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1881	24	2	ž	78 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1881	24	2	m	2 měsíce a 6 dní	katar počasný plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	24	2	ž	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	25	2	m	61 let	vodnatelnost následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	25	2	m	3 měsíce a 6 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	26	2	m	69 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1881	27	2	m	23 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	1	3	ž	85 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	1	3	ž	64 let	vodnatelnost následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	1	3	m	2 měsíce a 10 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	3	3	m	40 let	zmrznutí v záchvatu mrtvice následkem pití	XVII.	Neobvyklá zima
1881	4	3	ž	27 let	ochrnutí mozku následkem paduciny	VI.	Padoucnice (epilepsia)
1881	5	3	m	71 let	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1881	5	3	ž	55 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	6	3	m	58 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1881	10	3	ž	52 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	10	3	m	69 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	11	3	m	61 let	vodnatelnost následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	13	3	m	29 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	17	3	m	55 let	ochrnutí mychy	VI.	Jiné nemoci míchy
1881	22	3	ž	57 let	vodnatelnost následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	23	3	ž	8 měsíců a 20 dní	spalničky	I.	Spalničky (morbilli)
1881	24	3	ž	41 let	tyf	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1881	24	3	ž	65 let	katar a nádma plic (běhavka)	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1881	30	3	m	58 let	vřed žaludku	IX.	Vřed žaludeční a dvanáctníkový
1881	2	4	m	10 měsíců a 5 dní	spalničky	I.	Spalničky (morbilli)
1881	9	4	ž	1 rok, 9 měsíců a 26 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	15	4	m	2 roky, 4 měsíce a 20 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1881	17	4	ž	3 roky, 11 měsíců a 10 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	18	4	ž	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1881	22	4	m	1 rok a 3 dny	křeč hlasivky	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)

1881	22	4	m	21 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	23	4	m	0	vysílení následkem krvotoku před porodem	XIX.	
1881	XIV.	4	ž	4 roky	počasný katar střev a vodnatelnost	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1881	25	4	ž	42 let	rak materníku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1881	26	4	m	18 let	ústrojná vada srdce, vodnatelnost, katar střev	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	27	4	m	0	nedospělost následkem potracení	XIX.	
1881	28	4	ž	1 rok, 4 měsíce a 21 dní	katar plic po spalničkách	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	29	4	m	71 let	močokrevnost	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1881	3	5	m	54 let	odměk mozku	VI.	Jiné nemoci míchy
1881	3	5	m	55 let	ochrnutí dolních končetin, tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1881	3	5	ž	2 měsíce a 14 dní	počasný katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1881	4	5	ž	1 rok, 7 měsíců a 21 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	4	5	ž	18 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	5	5	ž	66 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	5	5	ž	1 rok, 1 měsíc a 24 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1881	5	5	m	55 let	překrvení mozku, křeče končetin, růže obličeje, zánět průdušnice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1881	6	5	ž	17 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	7	5	m	6 let a 3 měsíce	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1881	10	5	ž	36 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	11	5	ž	74 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	15	5	ž	3 roky, 3 měsíce a 10 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	20	5	ž	51 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1881	21	5	m	75 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený

1881	21	5	m	2 měsíce a 1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1881	22	5	ž	66 let	zánět pohrudnice	VIII.	Zánět pohrudnice (pleuritis)
1881	25	5	ž	30 let	mrtvice následkem stížení bleskem	XVII.	Blesk
1881	26	5	m	2 měsíce	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	28	5	ž	4 roky	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1881	29	5	ž	40 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1881	31	5	ž	74 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	3	6	ž	42 let	otrávení lihem (alcoholismus)	V.	Alkoholismus vleklý nebo prudký
1881	6	6	m	59 let	hlíza plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	7	6	ž	79 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	7	6	m	17 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1881	9	6	ž	32 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	12	6	ž	75 let	rak materníku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1881	14	6	m	22 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	15	6	m	40 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	15	6	m	2 měsíce a 28 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	16	6	ž	1 rok, 3 měsíce a 15 dní	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	21	6	ž	1 rok a 4 měsíce	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	22	6	ž	45 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1881	23	6	m	5 měsíců a 13 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1881	1	7	m	8 let, 7 měsíců a 8 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1881	4	7	ž	24 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	10	7	m	57 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	15	7	ž	76 let	počasný katar žaludku	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1881	17	7	m	66 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	26	7	m	68 let	nádor mozku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných ústrojů neb ústrojů nerozlišených

1881	6	8	m	61 let	výměšek pohrudnice	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	11	8	ž	24 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	22	8	ž	24 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1881	27	8	m	22 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	4	9	m	44 let	ochrnutí mozku a plic následkem poranění lebky a hrudníku, smrt násilná	XVII.	Jiné vraždy nebo zabití osob starších 1 roku
1881	8	9	m	61 let	ústrojná vada srdce a vodnatelnost	VII.	Jiné nemoci srdeční
1881	14	9	m	27 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	20	9	m	50 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1881	21	9	m	35 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	21	9	m	58 let	tyf skvrnitý	I.	Tyf skvrnitý (typhus exanthematicus)
1881	23	9	ž	98 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	27	9	ž	69 let	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1881	28	9	ž	74 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1881	28	9	ž	69 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	5	10	ž	5 měsíců	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1881	6	10	m	3 měsíce a 20 dní	rychlý katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1881	12	10	ž	79 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1881	12	10	ž	79 let	provleklý katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1881	15	10	m	57 let	zánět plic a pohrudnice	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	15	10	ž	84 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	16	10	ž	3 roky a 19 dní	úbytě a provleklý katar plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	21	10	m	5 let, 1 měsíc a 4 dny	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1881	21	10	m	46 let	chrlení krve	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny

1881	25	10	ž	8 let, 11 měsíců a 4 dny	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	27	10	ž	17 hodin	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1881	28	10	m	8 měsíců a 8 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	29	10	ž	48 let	souchotiny	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	1	11	m	41 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	2	11	m	4 dny	katar průdušnice	VIII.	Zánět průdušek (bronchitis)
1881	3	11	ž	32 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1881	8	11	m	66 let	zánět a provleklá nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1881	8	11	ž	55 let	zánět provleklý pobřišnice a vodnatelnost	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1881	10	11	ž	12 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1881	14	11	m	16 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1881	15	11	ž	57 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	15	11	ž	5 dní	křeč sanice (trismus)	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1881	17	11	m	68 let	počasný katar žaludku	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1881	19	11	ž	62 let	vodnatelnost a rychlý katar žaludku	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1881	24	11	m	0	nedospělost následkem potracení	XIX.	
1881	25	11	ž	12 hodin	katar průdušnice	VIII.	Zánět průdušek (bronchitis)
1881	27	11	ž	6 měsíců a 15 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	27	11	ž	49 let	počasný katar žaludku a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1881	4	12	ž	87 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1881	8	12	ž	62 let	rak materníku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1881	14	12	m	2 měsíce a 18 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	20	12	m	42 let	tuberkule plic a krtičnatost	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1881	20	12	ž	70 let	rychlý katar střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1881	21	12	m	1/4 hodiny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)

1881	25	12	m	73 let	počasný katar plic a kyčelní hlíza	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1881	26	12	m	10 měsíců a 27 dní	rychlý katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1881	31	12	ž	74 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	16	1	ž	77 let	katar plic a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1882	17	1	m	33 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	26	1	ž	60 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	26	1	ž	60 let	rak ve střevách	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	28	1	m	80 let	katar střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1882	31	1	m	70 let	tyf střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1882	31	1	m	67 let	rak jater	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	7	2	m	0	-	XIX.	
1882	8	2	ž	77 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	8	2	ž	6 měsíců a 9 dní	rychlý katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	9	2	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1882	9	2	m	69 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	10	2	ž	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1882	10	2	ž	13 dní	vrozená slabost a křeč sanice	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	10	2	ž	13 dní	vrozená slabost a křeč sanice	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	12	2	m	2 měsíce a 23 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	14	2	m	61 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1882	15	2	ž	1 měsíc a 16 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	17	2	m	1 rok, 7 měsíců a 11 dní	vodnatelnost mozku	XIV.	Vrozené vady tvarové (nepočítaje v to mrtvě narozené)
1882	17	2	m	6 let, 2 měsíce a 16	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

				dni			
1882	18	2	ž	7 měsíců a 19 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1882	21	2	ž	4 měsíce a 13 dní	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1882	21	2	ž	51 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	22	2	m	29 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	23	2	m	10 dní	nabubření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zhubření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1882	27	2	ž	51 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1882	28	2	m	46 let	zánět plic, ochrnutí srdce	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	1	3	m	76 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1882	6	3	m	1 rok a 16 dní	katar průdušnice	VIII.	Zánět průdušek (bronchitis)
1882	6	3	ž	35 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1882	7	3	ž	51 let	rak střev a vodnatelnost	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	8	3	m	32 let	ochrnutí míchy	VI.	Jiné nemoci míchy
1882	8	3	ž	29 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	8	3	m	19 let, 3 měsíce a 9 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	9	3	ž	61 let	počasný katar plic, výklop materníku	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	10	3	ž	0	nedospělost	XIX.	
1882	12	3	ž	2 měsíce a 18 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	16	3	ž	67 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1882	19	3	m	47 let	úbyt mozku	VI.	Jiné nemoci míchy
1882	21	3	m	4 měsíce a 23 dní	počasný katar hrtanu	VIII.	Nemoci hrtanu (laryngu)
1882	25	3	ž	42 let	zánět pobřišnice	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1882	26	3	m	4 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1882	26	3	ž	45 let	zánět pobřišnice	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1882	28	3	m	55 let	zánět snětivý ruky	VII.	Snět' (gangraena)

1882	3	4	m	31 let	žloutenice, rozředění krve, vodnatelnost	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatis acuta flava)
1882	5	4	ž	74 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	5	4	m	1 rok	záducha a křivice	III.	Křivice (rachitis)
1882	6	4	ž	28 let	rychlé nabuření plic po porodu	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zduření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1882	10	4	ž	10 měsíců a 6 dní	nabuření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1882	10	4	m	2 roky	záducha, křivice, neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1882	11	4	m	9 měsíců a 2 dny	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1882	12	4	m	69 let	počasný katar a nabuření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zduření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1882	14	4	m	42 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	17	4	ž	4 měsíce a 23 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	19	4	ž	4 roky, 10 měsíců a 28 dní	záducha a úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	23	4	m	53 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvetvorných
1882	25	4	m	60 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	27	4	m	80 let	ochrnutí mozku a plic následkem oběšení v stavu nepříčetném	XVII.	Sebevražda oběšením nebo uškrcením
1882	28	4	m	16 let, 11 měsíců a 7 dní	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvetvorných
1882	29	4	m	5 minut	ochrnutí plic při těžkém porodu	XV.	Následky porodu
1882	30	4	m	1 rok, 9 měsíců a 19 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	3	5	ž	2 roky a 25 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	11	5	ž	24 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	12	5	m	25 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	12	5	m	2 měsíce a 18 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1882	13	5	ž	0	nedospělost následkem předčasného porodu	XIX.	
1882	15	5	ž	75 let	ústrojní vada mozku následkem mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1882	15	5	m	60 let	rak žaludku a vodnatelnost	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	18	5	m	51 let	počasná otrava alkoholem - povšechná sešlost	V.	Alkoholismus vlekly nebo prudký
1882	18	5	m	2 měsíce a 19 dní	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	23	5	ž	50 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	23	5	ž	51 let	ochrnutí srdce následkem ústrojné vady	VII.	Jiné nemoci srdeční
1882	26	5	m	6 let	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	27	5	m	69 let	počasný katar plic, vodnatelnost	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	27	5	ž	48 let	tyf a chrlení krve	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1882	28	5	ž	2 měsíce a 5 dní	katar střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	28	5	m	11 měsíců a 10 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1882	29	5	m	69 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	30	5	ž	39 let	vodnatelnost z nedokrevnosti	VII.	Jiné nemoci ústrojí oběhu krevního
1882	2	6	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1882	11	6	ž	1 rok, 1 měsíc a 1 den	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1882	11	6	ž	74 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1882	11	6	m	56 let	počasný katar plic a vodnatelnost	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	11	6	ž	61 let	zánět plic a pohrudnice	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	13	6	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1882	16	6	m	70 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1882	18	6	ž	38 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	19	6	m	2 měsíce a 1 den	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	24	6	ž	54 let	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)

1882	24	6	m	45 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1882	25	6	ž	1 rok, 2 měsíce a 3 dny	rychlý katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1882	26	6	ž	67 let	močokrevnost	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1882	26	6	m	2 roky, 5 měsíců a 7 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	26	6	ž	31 let	vodnatelnost po krvotoku	XI.	Potrat (abortus) beze zmínky o hnilobě (sepsi), ale počítaje v to krvácení
1882	27	6	ž	60 let	počasný katar střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1882	X.	6	ž	62 let	zánět plic a nabubření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1882	30	6	ž	1 rok, 1 měsíc a 22 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	4	7	ž	61 let	zánět průušnice na obou stranách	I.	Růže (erysipelas)
1882	5	7	ž	6 let, 3 měsíce a 6 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1882	6	7	m	4 měsíce a 3 dny	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	7	7	ž	68 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1882	8	7	ž	18 let	křivice, krtičnatost, zánět plen mozku	III.	Křivice (rachitis)
1882	8	7	ž	1 rok, 7 měsíců a 19 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1882	9	7	m	2 měsíce a 15 dní	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1882	11	7	ž	63 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	12	7	ž	74 let	žloutenice	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatis acuta flava)
1882	13	7	ž	3 měsíce a XIV. dní	katar plic a střev, božec	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	13	7	m	9 měsíců a 5 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1882	13	7	ž	2 měsíce a 10 dní	katar plic a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	15	7	ž	1 měsíc a 17 dní	katar dusivý plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1882	16	7	ž	41 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1882	17	7	m	3 měsíce a 18 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1882	26	7	m	19 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	31	7	m	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	1	8	ž	3 měsíce	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1882	6	8	m	10 měsíců a 28 dní	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mízní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnicí)
1882	10	8	m	0	nedospělost	XIX.	
1882	12	8	m	62 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	14	8	ž	20 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	16	8	ž	59 let	vřed žaludku	IX.	Vřed žaludeční a dvanáctníkový
1882	24	8	m	64 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1882	26	8	ž	70 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	26	8	m	62 let	růže, nabuření plen mozku	I.	Růže (erysipelas)
1882	10	9	m	64 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1882	21	9	ž	72 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	22	9	m	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1882	25	9	ž	2 měsíce a 13 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	4	10	m	20 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	8	10	ž	69 let	ochrnutí mozku následkem močokrevnosti	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1882	15	10	m	0	mrtvice následkem obtížného porodu	XIX.	
1882	27	10	m	2 měsíce a 10 dní	počasný katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	6	11	m	16 let, 10 měsíců a 22 dní	tyf skvrnitý	I.	Tyf skvrnitý (typhus exanthematicus)
1882	9	11	ž	60 let	chrlení krve, katar žaludku	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)

1882	10	11	m	20 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	11	11	m	28 let	počasný zánět střev	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1882	14	11	m	4 měsíce a 22 dní	kolika střevní	IX.	Jiné nemoci střevní
1882	23	11	ž	59 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1882	25	11	m	2 hodiny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1882	25	11	ž	59 let	nabubření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zhubnutí (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1882	1	12	ž	17 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	13	12	m	36 let	zakrvácení následkem střelné rány do hlavy - samovražda v pomatenosti smyslů	XVII.	Sebevražda střelnými zbraněmi
1882	15	12	ž	13 dní	záškrt	I.	Záškrt (diphtheria)
1882	15	12	m	65 let	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1882	19	12	ž	8 let, 6 měsíců a 4 dny	záškrt	I.	Záškrt (diphtheria)
1882	19	12	ž	37 let	tyf skvrnitý	I.	Tyf skvrnitý (typhus exanthematicus)
1882	21	12	ž	2 roky, 3 měsíce a 1 den	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1882	25	12	ž	14 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1882	27	12	m	6 měsíců a 10 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1882	30	12	m	21 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1882	29	12	ž	77 let	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1883	13	1	ž	22 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1883	13	1	ž	2 měsíce a 23 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1883	14	1	m	1 minuta	ochrnutí plic následkem těžkého porodu	XV.	Následky porodu

1883	15	1	ž	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	22	1	m	32 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	24	1	ž	68 let	počasný katar a rozedma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	25	1	ž	3 roky, 4 měsíce a 11 dní	mázdřivka	I.	Záškrť (diphtheria)
1883	26	1	m	53 let	úbyt míchy	VI.	Úbyt míchy (tabes dorsalis)
1883	27	1	m	72 let	zvrhlost ledvin, vodnatelnost	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1883	29	1	ž	33 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	29	1	ž	41 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	30	1	m	1 rok, 11 měsíců a 2 dny	mázdřivka	I.	Záškrť (diphtheria)
1883	2	2	m	68 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	2	2	m	1 rok, 3 měsíce a 18 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	6	2	ž	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	7	2	m	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	7	2	m	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	9	2	ž	34 let	vodnatelnost následkem brightické nemoci	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1883	9	2	m	21 let	tyf skvrnitý	I.	Tyf skvrnitý (typhus exanthematicus)
1883	9	2	m	54 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	11	2	m	69 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	12	2	m	63 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	14	2	ž	3 měsíce a 3 dny	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1883	15	2	m	78 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	18	2	ž	62 let	sešlost věkem a těžkomyslnost	VI.	Předčasná zblbělost a jiné psychosy
1883	19	2	m	22 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	19	2	m	6 měsíců a 24 dní	provlekly katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu

1883	20	2	m	4 hodiny	ochrnutí plic po těžkém porodu	XV.	Následky porodu
1883	21	2	ž	6 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1883	23	2	m	7 měsíců a 17 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	23	2	ž	79 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	25	2	m	67 let	vodnatelnost, srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1883	25	2	ž	73 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1883	26	2	m	69 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	28	2	m	36 let	obluzení opilců - zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1883	4	3	ž	70 let	dýchavičnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	5	3	m	8 měsíců a 24 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1883	7	3	ž	10 měsíců a 3 dny	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1883	8	3	m	15 let	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	9	3	ž	67 let	zánět	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	10	3	m	53 let	provlekly katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	16	3	ž	54 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	19	3	m	67 let	počasný katar a nádma plic, vodnatelnost	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	19	3	ž	64 let	kýla uskřinutá	IX.	Kýla (hernia), neprůchodnost střeva (obstructio intestini)
1883	20	3	m	29 let	vysílení následkem tyfu	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	21	3	m	6 měsíců	počasný katar plic, žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1883	22	3	ž	1 rok a 3 měsíce	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	23	3	m	5 měsíců a 29 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1883	25	3	m	50 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	27	3	ž	52 let	provlekly zánět pobřišnice - vodnatelnost	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny

1883	28	3	ž	5 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1883	29	3	m	60 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	30	3	m	19 let, 10 měsíců a 4 dny	zúžení střeva následkem kýly uskřinuté	IX.	Kýla (hernia), neprůchodnost střeva (obstructio intestini)
1883	30	3	ž	80 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	1	4	m	7 let	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	2	4	ž	54 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	2	4	m	40 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1883	3	4	m	60 let	samovražda oběšením následkem pomatenosti mysli	XVII.	Sebevražda oběšením neb uskrcením
1883	3	4	ž	1 rok a 20 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1883	4	4	m	67 let	počasný katar a nádma plic - růže v obličejí	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	4	4	ž	17 let	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mízní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnicí)
1883	7	4	m	44 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krevetvorných
1883	8	4	ž	74 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	8	4	ž	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	9	4	m	1 rok a 9 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1883	10	4	m	11 měsíců a 17 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	11	4	m	3 měsíce a 29 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	11	4	ž	49 let	počasný katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	11	4	ž	11 měsíců a 22 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	13	4	m	1 měsíc a 16 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1883	15	4	ž	3 měsíce a 16 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1883	17	4	ž	11 měsíců a 28 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	18	4	ž	82 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	21	4	ž	51 let	rak materníku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1883	21	4	ž	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost

1883	24	4	m	70 let	nádma plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1883	24	4	ž	67 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	25	4	ž	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	27	4	ž	0	-	XIX.	
1883	27	4	ž	6 let, 1 měsíc a 28 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	29	4	m	1 rok a 13 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1883	30	4	m	64 let	nádma plic a vodnatelnost	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	4	5	ž	1 rok, 1 měsíc a 5 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1883	8	5	ž	56 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	11	5	ž	2 měsíce a 26 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1883	12	5	ž	73 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	12	5	m	64 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	12	5	m	1 rok, 2 měsíce a 11 dní	nedokrevnost	IV.	Chudokrevnost (anaemia)
1883	14	5	m	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	14	5	ž	32 let	tyf střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	18	5	m	68 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	19	5	m	1 rok a 20 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	19	5	m	40 let	kostižer žeber - talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krevetvorných
1883	22	5	m	70 let	úplavice	I.	Úplavice střevní (dysenteria)
1883	24	5	ž	73 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	25	5	ž	73 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	28	5	m	0	ochrnutí mozku následkem těžkého porodu	XV.	Následky porodu
1883	2	6	ž	27 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	5	6	ž	74 let	snět starců	VII.	Snět' (gangraena)
1883	7	6	ž	70 let	vysílení následkem hnisání kloubu koleního	XIII.	Jiné nemoci kostí, vyjma tuberculosu
1883	8	6	ž	4 roky a 6 měsíců	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1883	13	6	m	31 let	tuberkule plic, vodnatelnost	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1883	14	6	m	20 let, 3 měsíce a 4 dny	ochrnutí plic následkem náhodného zadušení - smrt násilná	XVII.	Nahodilé mechanické zadušení
1883	16	6	ž	0	nedospělost následkem předčasného porodu	XIX.	
1883	17	6	m	70 let	provleklý katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1883	19	6	m	72 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1883	19	6	m	46 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1883	23	6	m	54 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1883	24	6	ž	25 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	25	6	m	64 let	provleklý katar plic a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1883	27	6	m	35 let	tuberkule plic, chrlení krve	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	27	6	ž	1 rok, 4 měsíce a 23 dní	záškrt	I.	Záškrt (diphtheria)
1883	27	6	m	8 měsíců a 29 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1883	28	6	m	53 let	vodnatelnost, ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1883	29	6	ž	25 let	vředy v hrdle a v hrtanu následkem příjice	I.	Příjice (syphilis)
1883	30	6	m	24 let, 4 měsíce a 10 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	30	6	m	52 let	zánět obratlů ledvinových	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1883	15	7	ž	53 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1883	16	7	ž	5 let, 8 měsíců a 5 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1883	17	7	m	43 let	provleklý zánět mýchy	VI.	Jiné nemoci mýchy
1883	20	7	m	37 let	výměšek pohrudniční	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1883	20	7	ž	4 roky, 2 měsíce a 1 den	tyf	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	XIV.	7	ž	75 let	ústrojná vada srdce, vodnatelnost	VII.	Jiné nemoci srdeční
1883	25	7	ž	12 let a 5 dní	tyf skvrnitý	I.	Tyf skvrnitý (typhus exanthematicus)

1883	26	7	m	24 let, 9 měsíců a 12 dní	zánět pobřišnice	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1883	28	7	ž	3 měsíce a 11 dní	zánět hrtanu	VIII.	Nemoci hrtanu (laryngu)
1883	1	8	m	21 dní	tracení horem dolem (cholera)	I.	Cholera asijská
1883	4	8	m	0	mrtvice následkem těžkého porodu	XIX.	
1883	9	8	ž	56 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	13	8	m	5 let, 11 měsíců a 19 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1883	14	8	ž	13 let, 1 měsíc a 8 dní	zánět pobřišnice a střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1883	20	8	m	61 let	rak hltanu, ústrojná vada srdce, vodnatelnost	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu
1883	27	8	m	7 měsíců a 26 dní	rychlý katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1883	28	8	ž	3/4 hodiny	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1883	28	8	m	3 měsíce a 15 dní	rychlý katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1883	8	9	m	1 rok, 11 měsíců a 29 dní	spála	I.	Kašel zádušný (tussis convulsiva)
1883	11	9	m	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	11	9	ž	47 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	13	9	ž	69 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	18	9	m	63 let	pobřišnice provleklá, vodnatelnost	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1883	21	9	m	22 let, 9 měsíců a 14 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	21	9	ž	3/4 hodiny	nedospělost následkem předčasného porodu	XV.	Předčasné narození (partus praematurus), nepočítaje v to mrtvě narozené
1883	27	9	m	24 let, 8 měsíců a 24 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	28	9	m	1 rok a 9 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1883	29	9	ž	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	29	9	m	59 let	kolika střevní	IX.	Jiné nemoci střevní
1883	30	9	m	7 let a 23 dní	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)

1883	5	10	ž	1 měsíc a 3 dny	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	8	10	m	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	9	10	ž	18 let, 5 měsíců a 7 dní	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	13	10	ž	62 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	15	10	ž	58 let	ústrojná vada mozku	VI.	Prdu
1883	17	10	m	30 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	19	10	m	1 rok, 4 měsíce a 28 dní	spála	I.	Kašel zádušný (tussis convulsiva)
1883	20	10	ž	5 měsíců a 21 dní	nabubření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1883	22	10	m	48 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	1	11	m	3 roky, 1 měsíc a 26 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	2	11	ž	50 let	provleklá pakostnice	III.	Dna (podgra)
1883	5	11	m	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1883	7	11	m	4 měsíce a 20 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	12	11	m	56 let	výměšek hrudníku	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, výjma tuberkulosu
1883	15	11	m	64 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	19	11	ž	1 rok, 6 měsíců a 12 dní	mázdřivka	I.	Záškrť (difterie)
1883	20	11	ž	63 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1883	20	11	m	54 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	21	11	m	52 let	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1883	28	11	m	16 let, 4 měsíce a 9 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	29	11	m	26 let	úbyt mozku - blbost	VI.	Jiné nemoci míchy
1883	X.	11	m	59 let	mrtvice, zvrhlost ledvin	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1883	4	12	m	19 dní	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1883	6	12	m	8 hodin	nedospělost následkem předčasného porodu	XV.	Předčasné narození (partus praematurus), nepočítaje v to mrtvě narozené

1883	8	12	m	9 let, 6 měsíců a 13 dní	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1883	8	12	ž	54 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1883	11	12	ž	8 měsíců a 17 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1883	12	12	m	36 let	kýla uskřínutá	IX.	Kýla (hernia), neprůchodnost střeva (obstructio intestini)
1883	13	12	m	69 let	katar provlekly měchýře močového	X.	Nemoci měchýře močového, vyjma nádory
1883	18	12	m	15 let, 2 měsíce a 10 dní	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1883	20	12	m	0	mrtvice následkem těžkého porodu	XIX.	
1883	20	12	m	59 let	zvrhlost ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1883	22	12	m	49 let	úbyt mozku	VI.	Jiné nemoci míchy
1883	29	12	ž	1 rok, 3 měsíce a 1 den	zánět plic při spále	I.	Spála (scarlatina)
1883	30	12	m	64 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1884	3	1	ž	23 let	tyf břišní a zánět plic	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1884	4	1	m	54 let	katar hrtanu a nabubření plic	VIII.	Nemoci hrtanu (laryngu)
1884	4	1	ž	36 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1884	5	1	m	41 let	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1884	8	1	m	63 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	8	1	ž	55 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1884	12	1	ž	7 let	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1884	12	1	ž	1 rok, 3 měsíce a 8 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	13	1	m	9 let, 10 měsíců a 4 dny	hlíza v hrdle	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	13	1	m	3 měsíce a 8 dní	katar hrtanu	VIII.	Nemoci hrtanu (laryngu)
1884	15	1	ž	17 dní	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1884	19	1	m	72 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1884	20	1	ž	39 let	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1884	24	1	m	6 měsíců	křeč hlasivky	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1884	26	1	ž	64 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený

1884	29	1	m	78 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1884	30	1	ž	60 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krvetvorných
1884	1	2	m	2 roky, 1 měsíc a 16 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1884	4	2	ž	33 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1884	8	2	m	3 roky, 2 měsíce a 22 dní	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1884	12	2	m	72 let	výměšek v hrudníku	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	13	2	m	58 let	křeče žaludeční	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1884	21	2	ž	1,5 dne	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1884	22	2	m	68 let	katar žaludku - vada srdce	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	23	2	ž	35 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	28	2	ž	37 let	vysílení následkem horečky omladnic	XI.	Jiné nerozlišené příhody stavu poporodního
1884	28	2	m	57 let	provlekly katar a nádma plic - vodnatelnost	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1884	6	3	ž	65 let	křeče žaludeční	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1884	8	3	ž	26 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	14	3	ž	9 let	zánět pobřišnice	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1884	14	3	m	11 let	tyf břišní - zánět plic	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1884	15	3	ž	50 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1884	16	3	ž	59 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	22	3	m	1 rok a 9 měsíců	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	23	3	m	61 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1884	27	3	ž	49 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	28	3	m	11 měsíců a 21 dní	křeč sanice	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1884	2	4	m	77 let	provlekly katar a nádma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)

1884	6	4	ž	1 rok, 3 měsíce a 8 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	10	4	m	31 let	tuberkule plic, výměšek poprsnice	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	11	4	m	11 měsíců a 22 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	16	4	ž	0	vrozená slabost	XIX.	
1884	19	4	ž	2 měsíce a 23 dní	rychlý katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	23	4	m	51 let	ústrojná vada mozku	VI.	Jiné nemoci soustavy nervové
1884	24	4	ž	25 dní	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mizní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnici)
1884	25	4	ž	81 let	zvrhlost jater	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatitis acuta flava)
1884	26	4	m	74 let	počasný katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	1	5	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1884	4	5	ž	3 měsíce a 27 dní	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	8	5	ž	8 měsíců a 10 dní	křeč hlasivky	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1884	12	5	m	52 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1884	12	5	m	73 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1884	14	5	ž	1 měsíc a 23 dní	rychlý katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	21	5	ž	4 roky, 3 měsíce a 9 dní	zánět průdušnice po osypkách	I.	Spalničky (morbilli)
1884	22	5	ž	62 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	28	5	m	1 rok a 1 den	provlekklý katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	28	5	ž	29 let	tyf břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1884	X.	5	m	47 let	zánět poplicnice a výměšek v hrudníku	VIII.	Zánět pohrudnice (pleuritis)
1884	29	5	ž	9 měsíců a 28 dní	mázdřivka	I.	Záškrť (diphtheria)
1884	3	6	ž	1 minuta	mrtvice následkem těžkého porodu	XV.	Následky porodu
1884	3	6	m	24 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1884	6	6	ž	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1884	6	6	ž	4 měsíce a 15 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	8	6	ž	1 rok, 1 měsíc a 9 dní	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1884	8	6	m	67 let	vodnatelnost, ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1884	10	6	ž	2 roky, 1 měsíc a 11 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	10	6	m	1 rok, 3 měsíce a 5 dní	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1884	10	6	m	55 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	11	6	m	26 let	tuberkule plic - vodnatelnost	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	18	6	ž	61 let	vodokrevnost	IV.	Chudokrevnost (anaemia)
1884	21	6	ž	1 rok, 1 měsíc a 15 dní	osypky	I.	Spalničky (morbilli)
1884	22	6	ž	2 roky, 9 měsíců a 21 dní	osypky	I.	Spalničky (morbilli)
1884	25	6	m	10 měsíců a 1 den	osypky	I.	Spalničky (morbilli)
1884	27	6	m	10 měsíců a 27 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1884	27	6	ž	7 měsíců a 25 dní	katar plic, žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	28	6	ž	1 rok, 5 měsíců a 20 dní	malokrevnost, katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	30	6	ž	80 let	sešlost věkem	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	30	6	ž	37 let	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1884	1	7	m	35 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	1	7	ž	88 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1884	2	7	m	2 roky a 6 měsíců	osypky	I.	Spalničky (morbilli)
1884	3	7	ž	43 let	pakostnice provleklá	III.	Dna (podgra)
1884	3	7	m	2 roky	krtičnatost	I.	Tuberkulóza soustavy mízní (vyjma uzliny průduškové v okruží a za pobřišnici)
1884	3	7	m	60 let	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny

1884	3	7	ž	8 měsíců	katar plicní	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	8	7	m	1 měsíc a 7 dní	katar střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	9	7	ž	5 let	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1884	13	7	m	40 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1884	15	7	ž	14 dní	zatvrdlost sklípkovatiny podkožní	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1884	15	7	ž	40 let	ochrnutí míchy	VI.	Jiné nemoci míchy
1884	17	7	ž	75 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1884	26	7	ž	26 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	X.	7	ž	50 let	paducina - náhlé ochrnutí plic	VI.	Padoucnice (epilepsia)
1884	1	8	m	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	3	8	m	72 let	provleklá nádma plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	6	8	ž	20 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	9	8	ž	46 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	11	8	m	27 let	nabubření plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zbudření (oedem), vmetek (embolia), červená záhat' (thrombus) s krvácením a obyčejná záhat' plic
1884	20	8	m	65 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1884	22	8	m	74 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1884	27	8	ž	47 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1884	28	8	ž	4 měsíce	úbyť	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	1	9	m	5 měsíců a 3 dny	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1884	6	9	m	4 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1884	7	9	m	70 let	žaludeční křeče	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1884	18	9	m	38 let	růže snětivá	VII.	Snět' (gangraena)
1884	18	9	ž	21 let a 11 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1884	24	9	ž	24 let	ochrnutí mozku následkem oběšení	XVII.	Sebevražda oběšením neb uškrcením
1884	27	9	m	47 let	ochrnutí mozku následkem oběšení	XVII.	Sebevražda oběšením neb uškrcením
1884	29	9	ž	0	ochrnutí plic následkem těžkého porodu	XIX.	
1884	1	10	m	1 měsíc a 21 dní	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	4	10	m	7 měsíců a 17 dní	zánět průdušnice	VIII.	Zánět průdušek (bronchitis)
1884	11	10	m	74 let	ranění mrtvicí, zaražení moče	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1884	17	10	m	74 let	růže v obličejí	I.	Růže (erysipelas)
1884	18	10	m	28 let	tyfus břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1884	25	10	m	55 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1884	28	10	m	55 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	2	11	ž	42 let	zánět pobřišnice	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1884	2	11	ž	67 let	růže a nabubření plen mozku	I.	Růže (erysipelas)
1884	6	11	ž	69 let	rak prsní	II.	R
1884	7	11	ž	39 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	16	11	m	33 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	16	11	m	81 let	růže v obličejí	I.	Růže (erysipelas)
1884	23	11	m	2 měsíce a 23 dní	úbytí	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	22	11	ž	30 let	vodnatelnost prsní	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1884	27	11	m	1 měsíc a 21 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1884	30	11	m	29 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	5	12	ž	47 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	6	11	ž	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1884	7	12	m	46 let	typhus	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1884	12	12	m	6 měsíců	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	12	12	ž	0	mrtvice následkem těžkého porodu	XIX.	

1884	15	12	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1884	14	12	m	77 let a 6 měsíců	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1884	14	12	ž	43 let	ústrojní vada srdce, vodnatelnost	VII.	Jiné nemoci srdeční
1884	15	12	ž	1 rok a 9 měsíců	úbyť	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1884	15	12	ž	86 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1884	16	12	ž	71 let	žaludeční katar	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1884	22	12	ž	69 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1884	24	12	m	45 let	provleklá nádma plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1884	27	12	m	51 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krvetvorných
1884	28	12	m	0	mrtvice následkem těžkého porodu	XIX.	
1884	31	12	m	43 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	2	1	m	4 měsíce	záškrt	I.	Záškrt (diphtheria)
1885	2	1	m	44 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	2	1	m	52 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	4	1	ž	44 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	7	1	ž	1 rok, 1 měsíc a 12 dní	úbyť	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	7	1	m	37 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	7	1	m	36 let	křeč žaludeční	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1885	8	1	ž	61 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	15	1	m	0	vrozená slabost	XIX.	
1885	17	1	ž	7 let, 2 měsíce a 12 dní	typhus	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1885	22	1	ž	68 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	23	1	m	65 let	provleklý katar	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	25	1	ž	69 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	28	1	ž	64 let	rak dělohy	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1885	30	1	ž	0	předčasný porod	XIX.	
1885	31	1	ž	66 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	2	2	m	81 let	provleklý katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu

1885	31	1	ž	71 let	mrtvice - ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	1	2	m	13 let a 13 dní	typhus břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1885	1	2	m	65 let	počasný katar plic a střev	IX.	Průjem, katarh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1885	3	2	ž	58 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	7	2	ž	74 let	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1885	10	2	ž	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	12	2	ž	12 dní	modřice	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	17	2	ž	43 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	20	2	m	1 rok, 8 měsíců a 11 dní	křeč hlasivky	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1885	20	2	m	58 let	úbytí	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	21	2	m	1 rok a 9 měsíců	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1885	XIV.	2	m	52 let	provleklá dna, vysílení	III.	Dna (podgra)
1885	26	2	m	7 měsíců a 11 dní	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1885	2	3	m	60 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	4	3	m	73 let	zadržení moče	X.	Nemoci měchýře močového, vyjma nádory
1885	7	3	m	43 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	7	3	m	66 let	ochrnutí mozku následkem oběšení	XVII.	Sebevražda oběšením neb uškrcením
1885	10	3	ž	22 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	15	3	ž	55 let	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1885	18	3	m	1 rok a 10 měsíců	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1885	20	3	ž	80 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	21	3	ž	41 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	22	3	ž	11 měsíců a 10 dní	úbytí	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	24	3	m	36 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	30	3	ž	1 rok a 16 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1885	4	4	m	0	mrtvice následkem obtížného porodu	XIX.	
1885	4	4	ž	10 měsíců	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1885	6	4	ž	70 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	6	4	ž	17 let a 5 měsíců	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	6	4	ž	20 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	7	4	m	71 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	11	4	m	67 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	11	4	m	27 let	zakrvácení střelením, samovražda v pomatenosti smyslů	XVII.	Sebevražda střelnými zbraněmi
1885	14	4	ž	88 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	14	4	ž	62 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	14	4	m	63 let	ochrnutí končetin dolních	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	17	4	ž	23 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	17	4	ž	70 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	18	4	m	9 měsíců a 8 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1885	20	4	ž	33 let	odměk mozku	VI.	Jiné nemoci míchy
1885	23	4	m	74 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	24	4	ž	3 roky a 9 měsíců	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1885	25	4	ž	61 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	27	4	ž	8 měsíců a 21 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	27	4	ž	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	X.	4	ž	65 let	vodnatelnost, ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	30	4	ž	10 měsíců a 10 dní	nabubření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1885	3	5	ž	3 roky a 6 měsíců	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	4	5	ž	67 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	8	5	m	17 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1885	8	5	ž	35 let	vodnatelnost následkem ústrojné vady srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční

1885	19	5	ž	61 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	20	5	m	78 let	pakostnice	III.	Dna (podgra)
1885	21	5	m	2 roky a 20 dní	křeč hlasivky	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1885	20	5	ž	19 let a 1 měsíc	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	21	5	m	34 let	zánět žaludku a střev následkem otrávení lučavkou, samovražda	XVII.	Sebevražda požitím jedů pevných nebo tekutých, nebo látek žíravých
1885	21	5	ž	49 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	26	5	m	70 let	snět levé hoření končetiny	VII.	Sněť (gangraena)
1885	29	5	m	63 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1885	30	5	m	1 minuta	ochrnutí plic při obtížném porodu	XV.	Následky porodu
1885	31	5	ž	89 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	1	6	m	2 roky, 7 měsíců a 15 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	2	6	m	10 měsíců	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1885	3	6	ž	64 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	3	6	m	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	4	6	m	2 roky, 3 měsíce a 20 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	6	6	m	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	9	6	m	16 let, 4 měsíce a 9 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	11	6	m	23 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	16	6	m	67 let	truchlomyšlnost	VI.	Předčasná zblbělost a jiné psychosy
1885	17	6	m	8 měsíců	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1885	18	6	m	74 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	21	6	m	59 let	delirium potatyrum	V.	Alkoholismus vleklý nebo prudký
1885	23	6	ž	1 rok, 6 měsíců a 11 dní	spála	I.	Kašel zádušný (tussis convulsiva)
1885	25	6	ž	19 let a 1 měsíc	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	25	6	m	1 den	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1885	26	6	m	15 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)

1885	27	6	ž	45 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zaživací a pobřišnice
1885	26	6	ž	34 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	27	6	ž	36 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	2	7	ž	39 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	5	7	ž	6 měsíců a 23 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	6	7	ž	3 měsíce a 10 dní	tracení horem a dolem (cholera infantum)	I.	Cholera asijská
1885	8	7	m	16 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1885	8	7	m	17 dní	tracení horem a dolem (cholera infantum)	I.	Cholera asijská
1885	8	7	m	2 měsíce a 19 dní	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1885	14	7	m	8 měsíců	záducha	VIII.	Záducha (asthma)
1885	18	7	m	1 měsíc a 18 dní	tracení horem a dolem (cholera infantum)	I.	Cholera asijská
1885	23	7	ž	39 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	24	7	m	70 let	katar žaludku	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1885	24	7	ž	80 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	26	7	m	60 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	30	7	m	15 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1885	1	8	ž	66 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	1	8	m	1 rok a 5 měsíců	božec	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1885	2	8	ž	53 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	5	8	m	6 měsíců	tracení horem a dolem	I.	Cholera asijská
1885	7	8	m	0	předčasný plod	XIX.	
1885	10	8	ž	1 měsíc a 3 dny	tracení horem dolem (cholera infantum)	I.	Cholera asijská
1885	10	8	ž	3 měsíce a 23 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	13	8	ž	75 let	katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1885	23	8	ž	9 dní	katar žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1885	23	8	ž	3 měsíce a 16 dní	tracení horem a dolem	I.	Cholera asijská

1885	26	8	ž	0	předčasný plod	XIX.	
1885	1	9	m	24 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1885	31	8	m	7 měsíců a 23 dní	tracení horem dolem	I.	Cholera asijská
1885	1	9	ž	83 let	počasný katar plic a žaludku	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1885	2	9	ž	36 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	3	9	m	0	mrtvice následkem těžkého porodu	XIX.	
1885	5	9	m	41 let	zvrhlost jater, žloutenice	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatitis acuta flava)
1885	11	9	ž	61 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	11	9	m	66 let	provlekly katar plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1885	14	9	m	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	17	9	m	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1885	17	9	m	55 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	18	9	m	56 let	rak jater	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1885	21	9	ž	73 let	rak žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1885	25	9	m	8 minut	ochrnutí plic následkem těžkého porodu	XV.	Následky porodu
1885	29	9	ž	52 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	1	10	ž	1 rok, 4 měsíce a 14 dní	vodnatelnost mozku	XIV.	Vrozené vady tvarové (nepočítaje v to mrtvě narozené)
1885	2	10	m	17 dní	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	11	10	ž	72 let	růže	I.	Růže (erysipelas)
1885	12	10	m	69 let	ústrojná vada srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	22	10	m	84 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1885	2	11	ž	51 let	rakovina žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1885	4	11	ž	46 let	zánět jater	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatitis acuta flava)

1885	4	11	m	72 let	embolia cerebri	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	7	11	ž	0	potravení	XIX.	
1885	9	11	m	80 let	vodnatelnost mozku	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	12	11	m	65 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	15	11	ž	38 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	16	11	m	3 měsíce a 27 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1885	17	11	ž	55 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	17	11	m	10 měsíců a 7 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1885	18	11	ž	6 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1885	19	11	m	51 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	19	11	m	60 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1885	22	11	m	78 let	marasmus	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1885	25	11	ž	1 rok, 2 měsíce a 23 dní	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	28	11	ž	35 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	30	11	m	25 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	3	12	ž	56 let	zánět pobříšnice	IX.	Zánět pobříšnice (peritonitis), bez označené příčiny
1885	6	12	m	12 dní	všeobecná slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1885	7	12	m	65 let	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	8	12	ž	14 dní	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	9	12	m	65 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1885	13	12	m	49 let	alcoholismus	V.	Alcoholismus vlekklý nebo prudký
1885	16	12	ž	1 měsíc a 20 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1885	22	12	m	54 let	bronchial-katar	VIII.	Zánět průdušek (bronchitis)
1885	23	12	ž	2 roky, 8 měsíců a 12 dní	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1885	28	12	m	8 měsíců a 28 dní	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu

1885	29	12	ž	16 let, 9 měsíců a 22 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	29	12	m	1 rok, 9 měsíců a 17 dní	střevní katar	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1885	30	12	m	27 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1885	31	12	ž	1 rok, 5 měsíců a 16 dní	nabubření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	1	1	ž	50 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	1	1	m	52 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	1	1	m	65 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	1	1	ž	52 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	3	1	ž	47 let	hlíza mozku	VI.	Zánět mozku (nikoli epidemický)
1886	10	1	m	8 měsíců a 1 den	nabubření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	13	1	ž	56 let	žloutenice	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatis acuta flava)
1886	14	1	m	70 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	18	1	ž	45 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1886	21	1	m	11 měsíců a 10 dní	všeobecná slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	21	1	ž	65 let	vodnatelnost mozku	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1886	21	1	m	53 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	20	1	m	0	abortus	XIX.	
1886	25	1	ž	26 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	28	1	m	55 let	rakovina dolní čelisti	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu
1886	29	1	m	2 měsíce	vysílení	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1886	29	1	m	47 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	2	2	m	22 let a 9 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	4	2	m	3 roky a 8 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1886	7	2	m	60 let	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	10	2	ž	67 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	11	2	ž	67 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	12	2	m	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	13	2	m	3 měsíce	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	14	2	m	29 let a 7 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	17	2	ž	46 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	17	2	ž	35 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	17	2	ž	2 měsíce a 3 dny	nabubření plen mozku	VI.	Úbyt míchy (tabes dorsalis)
1886	17	2	m	67 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	19	2	ž	61 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	20	2	m	17 let a 6 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	20	2	m	65 let	nádma plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	27	2	m	3 roky a 12 dní	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	27	2	ž	65 let	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	4	3	m	67 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	4	3	m	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	5	3	m	46 let	chrlení krve	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1886	7	3	ž	80 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	9	3	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	9	3	ž	12 let	zánět plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	12	3	ž	2 měsíce a 21 dní	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	11	3	ž	1 rok, 2 měsíce a 20 dní	ochrnutí srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	11	3	m	8 měsíců	úbytě	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	11	3	ž	8 měsíců	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1886	13	3	ž	0	předčasný porod	XIX.	
1886	14	3	ž	1,5 hodiny	slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	19	3	m	50 let	sešlost věkem (omrzlina)	XVI.	Stařecká sešlost

1886	20	3	ž	0	těžký porod	XIX.	
1886	23	3	ž	64 let a 11 měsíců	ochrnutí střev	IX.	Jiné nemoci střevní
1886	22	3	m	65 let	zánět jater	IX.	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater (atrophia hepatis acuta flava)
1886	23	3	ž	10 let	nemoc brighthická	X.	Nerozlišenýzánět ledvin
1886	31	3	m	31 let a 1 měsíc	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	31	3	m	46 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1886	1	4	m	1 rok a 4 měsíce	zánět mozku	VI.	Zánět mozku (nikoli epidemický)
1886	1	4	m	60 let	brighthická nemoc	X.	Nerozlišenýzánět ledvin
1886	2	4	m	17 let	padoucina	VI.	Padoucnice (epilepsia)
1886	3	4	m	11 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	4	4	m	1 měsíc a 23 dní	nabubření plen mozku	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	8	4	m	22 let, 1 měsíc a 8 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	10	4	m	42 let	nemoc brighthická	X.	Nerozlišenýzánět ledvin
1886	11	4	m	75 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	15	4	m	42 let a 6 měsíců	oběšení (samovražda)	X.	Sebevražda oběšením neb uškrcením
1886	16	4	m	53 let	oběšení (samovražda)	XVII.	Sebevražda oběšením neb uškrcením
1886	19	4	m	44 let	zastřelení (samovražda)	XVII.	Sebevražda střelnými zbraněmi
1886	19	4	m	50 let	brighthická nemoc	X.	Nerozlišenýzánět ledvin
1886	22	4	ž	1 měsíc	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	26	4	m	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	30	4	m	54 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	4	5	ž	1 rok, 5 měsíců a 15 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	5	5	ž	78 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	7	5	ž	32 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	7	5	m	30 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	10	5	m	56 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	11	5	m	22 let a 10 měsíců	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	12	5	ž	70 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	14	5	ž	69 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	17	5	ž	30 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	18	5	ž	8 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	18	5	m	11 měsíců	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků

1886	18	5	ž	6 měsíců a 7 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	19	5	ž	12 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	19	5	ž	1 rok a 10 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	23	5	m	49 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	26	5	m	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	26	5	ž	68 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	31	5	m	20 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	4	6	ž	21 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	7	6	ž	53 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	9	6	ž	77 let	rakovina jater a žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1886	10	6	m	1 měsíc a 1 den	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	14	6	ž	44 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	14	6	ž	1 rok a 9 dní	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	16	6	m	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	17	6	ž	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	18	6	m	62 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	19	6	ž	8 let a 4 měsíce	zánět ledvin, všeobecná vodnatelnost	X.	Prudký zánět ledvin (nephritis acuta)
1886	20	6	m	2 roky, 6 měsíců a 20 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	25	6	ž	7 let, 1 měsíc a 9 dní	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	25	6	m	52 let	alkoholicismus vlekly	V.	Alkoholismus vlekly nebo prudký
1886	25	6	m	6 měsíců a 14 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	26	6	m	17 let a 1 měsíc	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	29	6	ž	58 let	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	1	7	ž	67 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	2	7	m	76 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	2	7	ž	16 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího

1886	7	7	m	8 měsíců	katar střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	7	7	m	46 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	8	7	m	49 let	rak žaludeční	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1886	8	7	m	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	9	7	m	1 měsíc a 8 dní	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	11	7	m	48 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	12	7	ž	4 měsíce a 18 dní	katar plic a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	11	7	ž	2 měsíce a 19 dní	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	16	7	m	66 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	18	7	m	66 let	zánět plic a pohrudnice	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	20	7	ž	15 let	zánět mozku	VI.	Zánět mozku (nikoli epidemický)
1886	20	7	m	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	20	7	ž	1 rok	křivice (scrophulosa)	III.	Křivice (rachitis)
1886	23	7	ž	69 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	23	7	m	1 měsíc a 20 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1886	25	7	ž	60 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	29	7	m	64 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	30	7	ž	11 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	30	7	m	1 měsíc a 24 dní	katarrh střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	31	7	m	43 let	typhus střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1886	3	8	ž	3 roky a 1 měsíc	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	3	8	m	34 let	scrophulosa, rozklad krve	III.	Křivice (rachitis)
1886	9	8	m	20 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků

1886	13	8	m	1 hodina	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	15	8	ž	6 let a 7 měsíců	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	20	8	m	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	22	8	ž	45 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	24	8	ž	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	24	8	m	38 let	zánět ledvin vlekly	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1886	23	8	ž	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	31	8	m	63 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvetvorných
1886	2	9	ž	2 roky a 16 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	2	9	m	67 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	4	9	m	8 měsíců a 4 dny	enteritis acuta	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	5	9	m	47 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	5	9	ž	66 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1886	9	9	ž	22 let a 2 měsíce	hlíza mozková	VI.	Zánět mozku (nikoli epidemický)
1886	11	9	ž	42 let	rakovina střev	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1886	14	9	ž	42 let	tuberkule střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	14	9	m	7 dní	psotník	VII.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1886	14	9	ž	48 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	17	9	m	11 měsíců a 22 dní	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	17	9	ž	27 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	21	9	ž	3 měsíce a 12 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	23	9	ž	2 měsíce a 5 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	24	9	m	1 rok, 4 měsíce a 3 dny	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	2	10	ž	16 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	5	10	m	11 měsíců	katarrh plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu

1886	6	10	m	6 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	8	10	m	7 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1886	12	10	m	2 roky, 5 měsíců a 11 dní	utopil se	XVII.	Nahodilé utopení
1886	12	10	ž	69 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	11	10	m	67 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	19	10	m	1 rok a 5 měsíců	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1886	20	10	ž	63 let	rakovina dělohy	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1886	22	10	m	52 let	ubytí mozku, marasmus	VI.	Jiné nemoci míchy
1886	23	10	m	78 let	výlev krve do mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1886	3	11	m	44 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	5	11	m	70 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvevorných
1886	10	11	m	35 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	13	11	m	28 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	16	11	ž	76 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	20	11	ž	73 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	25	11	ž	21 let a 4 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1886	27	11	ž	73 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	29	11	ž	9 měsíců a 9 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	1	12	m	74 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvevorných
1886	1	12	m	44 let	ztučnění srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1886	10	12	ž	74 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	10	12	m	44 let	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1886	14	12	ž	3 měsíce a 25 dní	katar střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1886	16	12	m	66 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	19	12	m	74 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	24	12	ž	87 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1886	25	12	m	0	mrtvý plod	XIX.	
1886	25	12	m	53 let	vleklý zánět ledvin	X.	Vleklý zánět ledvin (nephritis chronica)

1886	29	12	ž	70 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1886	29	12	m	53 let	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1887	1	1	m	4 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	1	1	m	56 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	8	1	m	0	mrtvý plod	XIX.	
1887	9	1	m	2 měsíce a 27 dní	katarrh střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	10	1	m	48 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	11	1	ž	21 hodin	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	17	1	ž	62 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krvetvorných
1887	19	1	m	46 let	otrávení fosforem (sebevražda)	XVII.	Sebevražda požitím jedů pevných nebo tekutých, nebo látek žíravých
1887	26	1	m	65 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	28	1	m	4 roky a 8 dní	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	29	1	ž	55 let	rakovina žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1887	29	1	m	10 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	30	1	m	75 let	marasmus	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1887	2	2	ž	76 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	3	2	m	80 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	7	2	m	72 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	9	2	ž	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	10	2	ž	39 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	12	2	ž	68 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	17	2	ž	5 měsíců a 10 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1887	18	2	m	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	26	2	ž	81 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	23	2	m	55 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	26	2	m	4 měsíce a 15 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1887	27	2	m	19 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	27	2	m	24 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	4	3	ž	77 let	zánět mozku	VI.	Zánět mozku (nikoli epidemický)
1887	5	3	m	50 let	vada srdeční	VII.	Jiné nemoci srdeční

1887	6	3	ž	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	8	3	ž	40 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	11	3	m	86 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	15	3	ž	2 roky a 6 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	15	3	ž	73 let	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1887	20	3	ž	7 měsíců a 20 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	20	3	m	42 let	delirium potatorum, oedem plic	V.	Alkoholismus vleký nebo prudký
1887	25	3	ž	72 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	25	3	m	7 měsíců a 12 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	27	3	ž	67 let, 8 měsíců a 22 dní	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krevetvorných
1887	28	3	ž	43 let a 10 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	1	4	m	43 let	oboustranná tuberculosa plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	1	4	ž	1 minuta	nepravidelný porod bez pomoci lékařské	XV.	Následky porodu
1887	3	4	m	4 měsíce a 7 dní	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1887	2	4	m	38 let	tuberculosa plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	4	4	ž	3 roky, 5 měsíců a 22 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	5	4	ž	32 let	typhus střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1887	6	4	ž	78 let	rakovina žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1887	7	4	m	29 let	zánět pohrudnice	VIII.	Zánět pohrudnice (pleuritis)
1887	8	4	m	40 let	alkoholicismus chronický	V.	Alkoholismus vleký nebo prudký
1887	13	4	m	81 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	16	4	m	71 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	17	4	m	49 let	výron krve do mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1887	18	4	ž	55 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krevetvorných
1887	22	4	ž	1 rok a 2 měsíce	zánět průdušek a plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1887	22	4	ž	0	nedonošený plod mrtvě narozený	XIX.	
1887	22	4	ž	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)

1887	24	4	ž	89 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	25	4	ž	75 let	výlev krevní do mozku (mrtvice)	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1887	27	4	m	1 rok a 4 měsíce	katarrh plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1887	27	4	ž	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	28	4	ž	76 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	30	4	ž	40 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krevetvorných
1887	3	5	ž	86 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	7	5	ž	61 let	rakovina žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1887	8	5	ž	1 rok a 2 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	16	5	m	22 let a 2 měsíce	morbus brigthii	X.	Nerozlišenýzánět ledvin
1887	18	5	ž	75 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	23	5	ž	45 let	rakovina jater	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1887	22	5	m	36 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	22	5	m	55 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1887	25	5	m	28 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	25	5	m	67 let	rakovina jícnu	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu
1887	25	5	ž	17 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1887	26	5	m	3 roky a 26 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1887	27	5	m	2 roky	zánět plic a střev	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1887	30	5	m	48 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	29	5	m	53 let	kostižer, rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krevetvorných
1887	29	5	m	62 let	rakovina žaludku a jater	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1887	30	5	ž	31 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	5	6	m	59 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny

1887	7	6	m	1 měsíc	katarrh plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1887	7	6	ž	38 let	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1887	10	6	ž	66 let	úplavice červená	I.	Úplavice střevní (dysenteria)
1887	15	6	m	45 let	rozedma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1887	16	6	m	66 let	rozedma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1887	17	6	m	36 let	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	17	6	m	5 měsíců a 10 dní	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krve
1887	19	6	m	9 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	24	6	ž	46 let	oedem plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zduření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1887	25	6	ž	50 let	rakovina levého prsu	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory prsů
1887	27	6	m	5 let a 11 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	1	7	ž	62 let	marasmus všeobecný	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1887	1	7	m	50 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	4	7	ž	52 let	rakovina dělohy	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího
1887	5	7	m	32 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	6	7	m	31 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	9	7	m	50 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	13	7	ž	16 let a 5 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	14	7	ž	83 let	sešlost věkem	XVI.	Starecká sešlost
1887	21	7	ž	1 rok a 6 měsíců	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	23	7	ž	8 měsíců a 23 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	24	7	m	9 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	25	7	ž	1 rok	katarrh plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1887	28	7	m	44 let	atrophia cerebri	VI.	Jiné nemoci míchy

1887	3	8	m	57 let	zánět pobříšnice	IX.	Zánět pobříšnice (peritonitis), bez označené příčiny
1887	3	8	ž	34 let	zánět plen mozkových (alkoholicismus chronický)	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	3	8	m	4 měsíce	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	5	8	m	11 měsíců	cholera novorozenců	I.	Cholera asijská
1887	5	8	m	1 měsíc a 16 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	6	8	m	67 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	7	8	ž	16 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	12	8	m	67 let	rakovina žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobříšnice
1887	13	8	m	1 rok a 1 měsíc	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	13	8	m	2 měsíce a 20 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	15	8	ž	11 let a 4 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	18	8	ž	24 let a 9 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	22	8	ž	6 měsíců a 4 dny	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	30	8	ž	2 měsíce	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	30	8	m	47 let	zánět střev a pobříšnice	IX.	Jiné nemoci střevní
1887	30	8	ž	1 rok a 2 měsíce	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	2	9	ž	56 let	otřesení mozku při pádu, výlev krve do mozku	XVII.	Neo
1887	2	9	m	49 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	5	9	m	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	9	9	ž	4 měsíce a 15 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	10	9	m	1 měsíc a 24 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	11	9	m	69 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková

1887	12	9	ž	7 měsíců a 3 dny	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	13	9	m	0	v lůně matčině zemřelé	XIX.	
1887	18	9	m	1 rok a 17 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	20	9	m	58 let	rakovina jater a žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1887	23	9	ž	47 let	vnitřní zakrvácení	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1887	25	9	m	73 let	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1887	28	9	ž	9 měsíců a 24 dní	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	28	9	ž	31 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	1	10	ž	1 rok, 10 měsíců a 9 dní	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	2	10	ž	87 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	4	10	ž	23 let a 7 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	6	10	m	4 měsíce	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	9	10	m	76 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	10	10	m	50 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1887	12	10	m	1 měsíc a 22 dní	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	13	10	ž	27 let, 11 měsíců a 28 dní	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1887	13	10	ž	0	předčasný porod	XIX.	
1887	17	10	m	1 měsíc a 6 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1887	19	10	m	72 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1887	22	10	ž	1 rok a 5 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	26	10	m	0,5 hodiny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	13	10	ž	86 let	zánět pobřišnice	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1887	29	10	ž	28 let a 8 měsíců	ochrnutí mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1887	29	10	ž	72 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	30	10	m	19 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)

1887	1	11	ž	4 měsíce a 3 dny	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1887	2	11	ž	54 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1887	3	11	ž	96 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1887	6	11	ž	42 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krevetvorných
1887	8	11	m	62 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	12	11	m	50 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	11	11	ž	0	narodilo se mrtvé	XIX.	
1887	14	11	ž	64 let	rakovina žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1887	28	11	m	0	narodilo se mrtvé	XIX.	
1887	29	11	m	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	6	12	m	22 let a 2 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	9	12	ž	2 měsíce a 7 dní	katarrh střev a žaludku	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1887	15	12	m	58 let	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1887	16	12	m	5 měsíců a 16 dní	katarrh plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1887	19	12	m	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	19	12	m	20 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1887	21	12	m	36 let	tuberkulosa plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1887	27	12	ž	2 roky a 6 měsíců	rhachitis	IV.	Křivice (rachitis)
1887	29	12	m	3 roky a 6 měsíců	diphtheritis	I.	Záškrt (diphtheria)
1887	31	12	ž	46 let	hniloba kosti pánevní - rozklad krve	XIII.	Jiné nemoci kostí, vyjma tuberculosu
1887	31	12	ž	3 roky a 9 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1887	31	12	m	65 let	oedem plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zduření (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1888	1	1	ž	49 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	8	1	ž	4 měsíce a 6 dní	diphtheritis	I.	Záškrt (diphtheria)
1888	13	1	ž	62 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	14	1	ž	70 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	15	1	ž	59 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený

1888	17	1	m	58 let	oedem plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zduřnění (oedem), vmetek (embolia), červená záhať (thrombus) s krvácením a obyčejná záhať plic
1888	23	1	ž	51 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	25	1	ž	79 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	10	2	ž	72 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	12	2	ž	40 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1888	17	2	m	6 měsíců a 12 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	20	2	ž	1 měsíc a 14 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	26	2	ž	60 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	1	3	m	27 let, 11 měsíců a 28 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	1	3	ž	30 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	1	3	m	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1888	2	3	m	73 let	brighthická nemoc	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1888	3	3	ž	67 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	5	3	ž	84 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	7	3	m	2 roky	diphtheritis	I.	Záškrt (diphtheria)
1888	7	3	m	3 měsíce a 5 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	12	3	ž	67 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	11	3	m	73 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	12	3	m	55 let	diphtheritis	I.	Záškrt (diphtheria)
1888	12	3	m	62 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	16	3	ž	81 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	17	3	m	21 let a 3 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	17	3	ž	80 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	17	3	m	0	narodilo se mrtvé	XIX.	
1888	22	3	m	1 den	žloutenka novorozenců	XV.	161
1888	22	3	m	55 let	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1888	24	3	m	83 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	26	3	ž	78 let	zánět pohrudnice	VIII.	Zánět pohrudnice (pleuritis)
1888	29	3	m	75 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	30	3	ž	28 let	souchotiny	I.	Spála (scarlatina)

1888	1	4	m	59 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	3	4	ž	2 měsíce a 13 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	5	4	m	50 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	10	4	m	66 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	11	4	ž	41 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	12	4	m	68 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	12	4	m	50 let	rakovina pije	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory pohlavních a močových ústrojí mužských
1888	13	4	ž	27 let, 11 měsíců a 28 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	13	4	m	1 den	žloutenka novorozenců	XV.	Jiné zvláštní nemoci útlého věku
1888	18	4	m	20 let a 9 měsíců	tyfus břišní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1888	23	4	m	40 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	25	4	m	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1888	26	4	m	62 let	hniloba krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvetvorných
1888	29	4	m	6 hodin	předčasně porozené	XV.	Předčasné narození (partus praematurus), nepočítaje v to mrtvě narozené
1888	28	4	m	42 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	30	4	ž	73 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	1	5	m	61 let	zánět plic a pohrudnice	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	1	5	ž	80 let	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1888	3	5	m	65 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	4	5	m	3 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1888	7	5	m	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1888	11	5	m	3 měsíce a 2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1888	11	5	m	4 měsíce a 5 dní	katarrh střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	12	5	m	68 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	17	5	ž	0	v lůně matčině odumřelo	XIX.	

1888	17	5	ž	55 let	embolia cerebri	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1888	19	5	ž	7 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1888	24	5	ž	37 let	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1888	25	5	m	46 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	25	5	ž	19 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	27	5	ž	10 let a 2 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	28	5	m	78 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	29	5	ž	3 měsíce a 4 dny	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	28	5	ž	40 let	srdečná vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1888	30	5	m	75 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1888	1	6	m	10 měsíců	katarrh průdušek	VIII.	Zánět průdušek (bronchitis)
1888	2	6	m	0	těžký porod	XIX.	
1888	2	6	ž	14 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1888	5	6	ž	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1888	5	6	m	58 let	typhus střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1888	5	6	m	1 rok, 8 měsíců a 23 dní	anglická nemoc	III.	Křivice (rachitis)
1888	6	6	ž	63 let	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1888	8	6	m	54 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvevorných
1888	11	6	ž	3 roky, 5 měsíců a 7 dní	zánět střev	IX.	Průjem, katarrh střevní a vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)
1888	13	6	ž	74 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	16	6	m	7 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	20	6	ž	7 měsíců a 14 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	22	6	m	2 minuty	následkem těžkého porodu	XV.	Následky porodu
1888	22	6	m	2 měsíce a 25 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	29	6	m	64 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	29	6	ž	59 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	30	6	ž	62 let	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny

1888	2	7	ž	10 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1888	2	7	m	10 měsíců a 15 dní	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1888	5	7	ž	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1888	5	7	ž	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1888	12	7	m	64 let a 6 měsíců	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1888	14	7	ž	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	23	7	ž	53 let	rakovina jater	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1888	31	7	m	68 let	tuberkulosa plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	2	8	ž	28 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvevorných
1888	2	8	m	31 let	tyfus střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1888	6	8	ž	6 měsíců	rhachetis	III.	Křivice (rachitis)
1888	8	8	ž	85 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	10	8	ž	73 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	10	8	ž	1 měsíc	katarrh střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	10	8	ž	4 měsíce a 10 dní	křivice	III.	Křivice (rachitis)
1888	10	8	m	0	mrtvě narozeno	XIX.	
1888	13	8	m	20 let a 11 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	14	8	m	77 let	carcinoma sophagi (sešlost věkem)	XVI.	Stařecká sešlost
1888	16	8	ž	3 dny	bezvzduchnost plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	17	8	ž	9 měsíců a 24 dní	anglická nemoc	III.	Křivice (rachitis)
1888	17	8	m	52 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1888	19	8	ž	8 let a 9 měsíců	tyfus střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1888	26	8	ž	6 měsíců a 17 dní	katarrh střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	31	8	m	5 měsíců a 26 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	31	8	ž	17 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1888	1	9	ž	9 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)

1888	2	9	ž	29 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	2	9	ž	59 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1888	9	9	m	5 měsíců a 5 dní	cholera novorozenců	I.	Cholera asijská
1888	12	9	ž	5 měsíců a 15 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	12	9	ž	76 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	13	9	ž	35 let a 10 měsíců	vodnatelnost	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1888	26	9	ž	1 rok a 5 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	29	9	ž	6 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1888	1	10	ž	2 měsíce a 8 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	3	10	ž	7 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1888	9	10	m	52 let	rozedma plic	VIII.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1888	12	10	m	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	13	10	m	21 let a 3 měsíce	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	19	10	ž	10 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1888	22	10	ž	72 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	23	10	ž	1 měsíc a 23 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1888	1	11	m	0	narodilo se mrtvé	XIX.	
1888	3	11	ž	2 měsíce a 18 dní	zánět pobříšnice	IX.	Zánět pobříšnice (peritonitis), bez označené příčiny
1888	3	11	ž	63 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1888	12	11	m	1 měsíc a 14 dní	rhachitis	III.	Křivice (rachitis)
1888	13	11	m	72 let	talovitost krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krvetvorných
1888	15	11	m	59 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1888	16	11	m	43 let	mrtvice	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1888	27	11	m	69 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	28	11	ž	53 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	3	12	m	76 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost

1888	4	12	ž	0	narodilo se mrtvé	XIX.	
1888	6	12	ž	53 let	brigthická nemoc	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1888	9	12	ž	36 let	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1888	11	12	m	74 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	13	12	m	1 měsíc a 26 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1888	17	12	ž	68 let, 5 měsíců a 13 dní	výlev krve do mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhať mozková
1888	19	12	m	63 let	alkoholicismus chronic	V.	Alkoholismus vleklý nebo prudký
1888	23	12	ž	3 měsíce	žaludeční katarrh	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1888	29	12	m	55 let	rakovina jícnu	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu
1888	30	12	ž	58 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1888	31	12	ž	9 let a 2 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1888	31	12	ž	3 měsíce a 20 dní	katarrh žaludeční	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1889	1	1	m	8 let a 2 měsíce	tyfus střevní	I.	Tyf břišní (typhus abdominalis)
1889	1	1	ž	39 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	3	1	ž	0	odumřela v lůně natčině	XIX.	
1889	4	1	m	65 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	4	1	ž	2 měsíce a 20 dní	katarrh žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	5	1	m	18 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	7	1	m	3 měsíce	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1889	9	1	ž	43 let	zánět pobříšnice	IX.	Zánět pobříšnice (peritonitis), bez označené příčiny
1889	12	1	m	10 hodin	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	13	1	ž	2 roky	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	15	1	m	70 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojí krevetvorných
1889	19	1	m	59 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	22	1	m	9 let	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1889	29	1	m	60 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu

1889	1	2	ž	15 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	6	2	m	75 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1889	6	2	m	4 roky, 2 měsíce a 20 dní	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1889	7	2	m	1 rok, 7 měsíců a 27 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	9	2	m	87 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	10	2	m	51 let	rakovina jater a žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1889	10	2	ž	6 měsíců a 17 dní	katarrh žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	11	2	m	30 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	11	2	m	17 let a 23 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	18	2	m	75 let	oběsil se (snicida)	XVII.	Sebevražda oběšením neb uškrcením
1889	20	2	ž	59 let	brigthická nemoc	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	20	2	m	70 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	20	2	ž	52 let	brigthická nemoc	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	22	2	m	2 měsíce a 25 dní	atrophia	XIX.	Jiné nemoci míchy
1889	24	2	ž	15 let a 6 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	24	2	ž	76 let	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	25	2	ž	67 let a 5 měsíců	nedokrevnost	IV.	Chudokrevnost (anaemia)
1889	25	2	ž	48 let	ztučnění srdce	VII.	Jiné nemoci srdeční
1889	25	2	ž	28 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1889	28	2	m	89 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	2	3	m	2 měsíce a 22 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1889	4	3	ž	9 let a 1 měsíc	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1889	8	3	m	2 roky, 2 měsíce a 12 dní	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1889	10	3	m	15 let a 6 měsíců	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1889	10	3	m	3 roky, 10 měsíců a 17 dní	katarrh žaludku	IX.	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)
1889	12	3	m	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1889	15	3	ž	45 let	zánět pobřišnice	IX.	Zánět pobřišnice (peritonitis), bez označené příčiny
1889	18	3	ž	1 rok	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)

1889	21	3	m	1 rok, 6 měsíců a 6 dní	vodnatelnost mozku	XIV.	Vrozené vady tvarové (nepočítaje v to mrtvě narozené)
1889	21	3	m	33 let a 3 měsíce	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	26	3	m	21 let a 9 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	26	3	ž	8 let, 6 měsíců a 23 dní	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	28	3	m	39 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	30	3	m	64 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	1	4	ž	72 let	výlev krevní do mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat mozková
1889	1	4	m	42 let	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1889	1	4	m	3 měsíce	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1889	7	4	m	63 let	samovražda oběšením	XVII.	Sebevražda oběšením neb uškrcením
1889	9	4	ž	75 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1889	11	4	m	23 let a 10 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	14	4	m	4 roky a 11 měsíců	diphterie	I.	Záškrť (diphtheria)
1889	15	4	m	4 měsíce a 20 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1889	16	4	m	35 let a 10 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	18	4	m	53 let	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1889	21	4	m	61 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	21	4	ž	68 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	21	4	ž	10 měsíců a 20 dní	nádor sleziny	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1889	24	4	m	74 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1889	25	4	ž	12 dní	atrophia	XIX.	Jiné nemoci míchy
1889	26	4	m	8 měsíců a 2 dny	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1889	27	4	m	50 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	30	4	m	7 let a 6 měsíců	neštovice	I.	Neštovice pravé (variola)
1889	2	5	m	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	1	5	m	20 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	4	5	m	1 měsíc a 7 dní	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)

1889	6	5	ž	2 měsíce a 10 dní	katarrh střevní	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	11	5	m	37 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	14	5	ž	65 let	marasmus univesalis	XVIII.	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny
1889	14	5	ž	6 měsíců a 15 dní	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1889	14	5	m	0,25 hodiny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	15	5	m	5 let, 5 měsíců a 17 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	15	5	m	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	20	5	m	33 let a 3 měsíce	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	20	5	ž	5 měsíců	diphterie	I.	Záškrt (diphtheria)
1889	22	5	ž	74 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	22	5	m	45 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	23	5	ž	80 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	28	5	ž	33 let	rozklad krve	IV.	Jiné nemoci krve a ústrojů krvetvorných
1889	30	5	ž	49 let	tuberkule plic a střev	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	31	5	m	57 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční
1889	30	5	ž	59 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1889	1	6	m	58 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1889	3	6	ž	65 let	brigthická nemoc	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	7	6	m	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1889	6	6	m	84 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	8	6	ž	65 let	úplavice (dysenterie)	I.	Úplavice střevní (dysenteria)
1889	12	6	ž	16 let a 9 měsíců	brigthická nemoc	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	15	6	m	2 měsíce	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	17	6	m	38 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	20	6	ž	1 rok a 6 měsíců	zánět plen mozkových	VI.	Prostý zánět plen mozkových (meningitis)
1889	22	6	m	65 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	24	6	ž	23 dní	zánět žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků

1889	26	6	ž	3 roky a 11 měsíců	roztržštění lebky (smrt náhodou)	XVII.	Poranění pádem, rozdrcením, sřícením
1889	27	6	m	2 měsíce a 24 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	30	6	m	5 let, 4 měsíce a 14 dní	záškrt	I.	Záškrt (diphtheria)
1889	4	7	ž	2 hodiny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	5	7	m	50 let	výlev krevní do mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1889	10	7	m	33 let	roztržštění lebky (smrt náhodou)	XVII.	Poranění pádem, rozdrcením, sřícením
1889	21	7	ž	39 let a 6 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	22	7	ž	81 let	rakovina žaludku	II.	Rakovina a jiné zhoubné nádory roury zažívací a pobřišnice
1889	31	7	m	4 měsíce a 18 dní	katarrh střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	1	8	ž	17 let a 23 dní	popálení petrolejem	XVII.	Popálení úrazové (jiné než při požáru)
1889	1	8	ž	2 měsíce a 7 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	3	8	ž	1 rok, 4 měsíce a 20 dní	rachitis	III.	Křivice (rachitis)
1889	4	8	ž	18 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	4	8	ž	1 rok a 2 měsíce	rachitis	III.	Křivice (rachitis)
1889	5	8	m	4 roky a 4 měsíce	defterie	I.	Záškrt (diphtheria)
1889	6	8	m	52 let	alkoholicismus vleký (snicida)	V.	Alkoholismus vleký nebo prudký
1889	7	8	m	6 dní	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	9	8	m	60 let	oedem plic	VIII.	Překrvení (hyperaemia) plic, zduření (oedem), vmetek (embolia), červená záhat' (thrombus) s krvácením a obyčejná záhat' plic
1889	10	8	m	56 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	12	8	m	5 let a 6 měsíců	hydrocephalus chronic	XIV.	Vrozené vady tvarové (nepočítaje v to mrtvé narozené)
1889	12	8	m	3 roky a 1 měsíc	croup	I.	Záškrt (diphtheria)
1889	15	8	ž	61 let	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený

1889	16	8	ž	77 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1889	18	8	m	50 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	21	8	ž	30 let	tuberkule plic a chrlení krve	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	1	9	m	0	odumřelo v lůně matčině	XIX.	
1889	3	9	m	70 let	ochrnutí plic	VIII.	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu
1889	22	9	ž	7 měsíců	katarrh žaludku a střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	23	9	ž	55 let	zánět pobříšnice	IX.	Zánět pobříšnice (peritonitis), bez označené příčiny
1889	23	9	ž	35 let a 10 měsíců	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	27	9	ž	33 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	30	9	m	68 let	přirozená smrt udušením	XVIII.	Náhlá smrt
1889	3	10	ž	43 let	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	4	10	m	60 let	zánět ledvin	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	4	10	ž	65 let	výlev krevní do mozku	VI.	Krvácení mozkové, vmetek nebo záhat' mozková
1889	8	10	m	33 let	morbus brigthii	X.	Nerozlišený zánět ledvin
1889	9	10	m	8 měsíců a 23 dní	zánět střev	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	10	10	m	2 dny	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	11	10	ž	20 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	16	10	ž	38 let	zánět pohrudnice	VIII.	Zánět pohrudnice (pleuritis)
1889	15	10	m	4 měsíce a 15 dní	katarrh střevní a žaludeční	IX.	Průjem (diarrhoea) a katarrh střevní (enteritis) - u dětí do 2 roků
1889	19	10	m	1 měsíc a 4 dny	psotník	VI.	Křeče u dětí mladších 5 let (eclampsia)
1889	31	10	ž	1 rok, 2 měsíce a 24 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	1	11	ž	několik minut	následkem těžkého porodu	XV.	Následky porodu
1889	3	11	ž	15 hodin	vrozená slabost	XV.	Vrozená slabost (debilitas congenitalis)
1889	4	11	ž	1 rok a 6 měsíců	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1889	5	11	m	6 let, 2 měsíce a 7	diphtheritis	I.	Záškrť (diphtheria)

				dni			
1889	6	11	m	66 let	zánět pobříšnice	IX.	Zánět pobříšnice (peritonitis), bez označené příčiny
1889	11	11	ž	57 let	tuberculosa plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	12	11	m	62 let	emphysema pulmonum	IV.	Rozedma plicní (emphysema pulmonum)
1889	21	11	m	1 rok, 3 měsíce a 14 dní	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	21	11	ž	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	22	11	m	69 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	23	11	m	62 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	23	11	m	77 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	24	11	ž	4 roky, 3 měsíce a 2 dny	zánět plic	VIII.	Zánět plic nerozlišený
1889	24	11	ž	33 let	neoplasina ovarii	X.	Nemoci pohlavních ústrojů ženských, neoznačené za venerické
1889	1	12	ž	80 let	sešlost věkem	XVI.	Stařecká sešlost
1889	5	12	ž	6 let a 2 měsíce	diphtherie hrtanu	I.	Záškrt (diphtheria)
1889	7	12	m	8 let, 4 měsíce a 17 dní	diphtheria peracta	I.	Záškrt (diphtheria)
1889	10	12	m	3 roky, 2 měsíce a 12 dní	diphtherie hrtanu	I.	Záškrt (diphtheria)
1889	10	12	ž	29 let	tuberkule plic	I.	Tuberkulóza ústrojí dýchacího
1889	13	12	m	66 let	srdeční vada	VII.	Jiné nemoci srdeční