

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KATEDRA PEDOLOGIE A OCHRANY PŮD



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**Analýza tržních cen zemědělských pozemků v regionech
Příbram, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Rychnov nad Kněžnou**

Vedoucí práce Ing. Jaroslava Janků, CSc.
Bakalant: Bundová Lenka

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Fakulta životního prostředí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Lenka Bundová

Územní technická a správní služba v životním prostředí

Název práce

Analýza tržních cen zemědělských pozemků v okresech Příbram, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Rychnov nad Kněžnou

Název anglicky

Analysis of market prices of agricultural land in the districts Příbram, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Rychnov nad Kněžnou

Cíle práce

Cílem práce je analyzovat tržní ceny zemědělských pozemků v regionech Příbram, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Rychnov nad Kněžnou, zejména ve vztahu k cenám zjištěným dle oceňovací vyhlášky.

Metodika

Bude využíváno všech dostupných zdrojů, databází realitních kanceláří, údajů katastrálních úřadů a nabídek realitních serverů. Preferována bude analýza realizovaných cen před nabídkovými.

Tržní ceny budou analyzovány ve vztahu k lokalitě či bonitě, bude vyjádřen důvod pro maximální či minimální cenu a cenová hladina porovnána s cenou zjištěnou v oceňovací vyhlášce.

Doporučený rozsah práce

30 – 40 stran

Klíčová slova

Zemědělská půda, tržní cena, BPEJ, oceňování, bonita, administrativní cena

Doporučené zdroje informací

- Bradáč, A. 2009. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Cerm, 2009. 753 s. ISBN: 9788072046300.
- Ferguson, S., Furtan, H., Carlberg, J. 2006. The political economy of farmland ownership regulations and land prices, Agricultural Economics. 10.1111/j.1574-0862.2006.00139.x, 35, 1, (59-65).
- Gardi, C., Panagos, P., Van Liedekerke, M., Bosco, C., & De Brogniez, D. 2015. Land Take and Food Security: Assessment of Land Take on the Agricultural Production in Europe. Journal of Environmental Planning and Management. 10.1080/09640568.2014.899490, 58, (898-912).
- Goodwin, B.K., Mishra, A. K., Ortalo-Magné, F.N. 2003. What's Wrong with Our Models of Agricultural Land Values? American Journal of Agricultural Economics. 10.1111/1467-8276.00479, 85, 3, (744-752).
- Guyomard, H., Lankoski, J., Ollikainen, M. 2009. Impacts of agricultural policies on crop land prices, Food Economics – Acta Agriculturae Scandinavica. Section C, 10.1080/16507540903474681, 6, 2, (88-98).
- Karl, G.L., Gareth, T. 2005. Parcel size, location and commercial land values. Journal of Real Estate Research 27, 343–354.
- LEPŠ, J. – ŠMILAUER, P. *Biostatistika*. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7394-587-9.
- Ministerstvo zemědělství. 2017. Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Praha.
- Pederson, G.D., Khitarishvili, T. 2002. Analysis of Land Prices under Uncertainty: A Real Option Valuation Approach, Economic Studies on Food, Agriculture, and the Environment. 10.1007/978-1-4615-0609-6, (153-168).
- Zazvonil, Z. 1996. Oceňování na tržních principech. 1. vyd.— Praha : Ceduk, 1996— 173 s. ISBN: 80-902109-0-2.

Předběžný termín obhajoby

2022/23 LS – FŽP

Vedoucí práce

Ing. Jaroslava Janků, CSc.

Garantující pracoviště

Katedra pedologie a ochrany půd

Elektronicky schváleno dne 13. 2. 2023

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Vedoucí katedry

Elektronicky schváleno dne 24. 2. 2023

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Děkan

V Praze dne 05. 03. 2023

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Analýza tržních cen zemědělských pozemků v regionech Příbram, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Rychnov nad Kněžnou vypracovala samostatně a citovala jsem všechny informační zdroje, které jsem v práci použila, a které jsem rovněž uvedla na konci práce v seznamu použitých informačních zdrojů. Jsem si vědoma, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení § 35 odst. 3 tohoto zákona, tj. o užití tohoto díla. Jsem si vědoma, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to i bez ohledu na výsledek její obhajoby. Svým podpisem rovněž prohlašuji, že elektronická verze práce je totožná s verzí tištěnou a že s údaji uvedenými v práci bylo nakládáno v souvislosti s GDPR.

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí práce Ing. Jaroslavě Janků, CSc.

V Praze dne

Analýza tržních cen zemědělských pozemků v regionech Příbram, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Rychnov nad Kněžnou

Abstrakt

Tématem této bakalářské práce je „Analýza tržních cen zemědělských půd v regionech“. Vztahy nabídkových cen zemědělské půdy vzhledem k jejich lokalitě a dále ve vztahu mezi úřední cenou a cenou nabídkovou.

V první části je stručný popis a definice jednotlivých pojmu půdy a samozřejmě jejich šest nejzákladnějších degradací. Popisuji, z jakých číselných kódů je tvořena BPEJ, její úřední cenu a kde tyto informace naleznu a k čemu je potřebuji.

V části druhé se zaměřuji na zjištění cen administrativních a cen tržních. Tržní ceny dále zpracovávám matematickými metodami statistické analýzy do grafů a tabulek, s cílem určit vzájemné vztahy mezi tržní cenou a kvalitativními atributy půd.

Klíčová slova

zemědělská půda, tržní cena, bonita, administrativní cena, udržitelné hospodaření, okres

Analysis of market prices of agricultural land in the regions Příbram, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Rychnov nad Kněžnou

Abstract

The topic of this bachelor thesis is "Analysis of market prices of agricultural land in regions". The relationships between offer prices and price of agricultural land in relation to their location and also in the relationship between the official price and the offer price.

In the first part there is a brief description and definition of the different concepts of land and of course their six most basic degradations. I describe what numerical codes make up the BPEJ, its official price and where to find this information and what is needed for it.

In part two, I focus on finding administrative and market prices. Further, I processed processing market prices into graphs and tables using mathematical methods of statistical analysis, in order to determine the correlations between market price and soil quality attributes.

Keywords

agricultural land, market price, credit rating, administrative price, sustainable management, district

Obsah

Obsah	8
1. Úvod.....	1
2 Cíl práce.....	2
3 Literární rešerše	2
3.1 Půda	2
3.2 Degradační faktory půdy.....	2
3.2.1 Zábor půdy	3
3.2.2 Eroze.....	3
3.2.3 Utužení ornice	4
3.2.4 Ztráta organické hmoty	4
3.2.5 Ztráta biologické diverzity	4
3.3 Bonitovaná půdní ekologická jednotka BPEJ.....	5
3.4 Hlavní půdní jednotka	8
3.5 Klasifikace půd	8
3.5.1 Půdní typy.....	9
4 Výsledky	15
4.1 Základní zpracování datového souboru	15
4.2 Bodové rozdělení četností	16
4.3 Intervalová rozdělení četností	19
4.4 Charakteristiky poloh	20
4.5 Charakteristiky variability	21
4.6 Charakteristika koncentrace	21
5 Testování statistických hypotéz.....	22
4.7 Test normality (všechny okresy)	23
6 Charakteristika okresů.....	27
7 Závěr	34
8 Přehled literatury a použitých zdrojů.....	36
9 Seznam obrázků, tabulek, grafů a zkratek.....	39
Seznam obrázků	39
Seznam tabulek	39
Přílohy	40

1. Úvod

Předmětem zkoumání této bakalářské práce jsou tržní ceny zemědělské půdy ve vybraných regionech, respektive okresech. Motivací k tomuto zpracování jsou níže uvedené skutečnosti. Tradiční oceňovací model pro stanovení úředních cen, jenž by mohl odrážet ekonomickou efektivnost zemědělské výroby na konkrétním pozemku, dostačně nereprezentuje proces, kterým by se dali určit ceny tržní, cena určená vyhláškovým modelem je v průměru více než 4krát nižší, než tržní cena (Farmy.cz, 2022). Přestože je trh s půdou stále silněji vnímán, jako vhodná protiinflační investice i z řad nezemědělských investorů a s půdou úzce spjatá zemědělství prokazuje dlouhodobě stabilní ziskovost, vedou tyto objektivní ekonomické profity spíše ke kvalitativní biologické degradaci tohoto omezeného, nezastupitelného a na současném stupni poznání i neobnovitelného přírodního zdroje.

Hlavním důvodem je zejména intenzifikace zemědělství a změna preferencí pěstování některých plodin. Při dlouhodobém působení eroze se mění kvantitativní i kvalitativní vlastnosti půdy, což spočívá ve zmenšování hloubky půdního profilu a plochy půd a ve změnách jejich vlastností a snížení úrodnosti půd. Tyto a další aspekty degradace zemědělské půdy se v konečném důsledku mohou projevit na snížení ceny takto zasažených pozemků, v určitém katastrálním území se může jednat až o 50% pokles cen. (Novotný a spol., 2017). Eroze a následné ztráty půdy má dlouhodobý vliv na výnosy zemědělců, kteří jsou pro udržení hektarových výnosů nutni používat ve zvýšené míře umělých hnojiv, což vede v konečném důsledku ke zvýšením nákladů na pěstování plodin. Dalším přímým důsledkem eroze, takto hnojených pozemků, je následné znečištění vodních zdrojů hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.

Práce je koncepčně členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je nastíněna problematika spojená s oceňováním nemovitostí obecně, přičemž práce se postupně orientuje k detailnějšímu popisu metod pro oceňování půd, zejména těch zemědělských.

Práce tak přehledně jmenuje, definuje a stručně popisuje klíčové pojmy celé problematiky, jako jsou „zemědělská půda“, „tržní cena (sjednaná cena), „administrativní cena“, „bonita“, a tak dále. Na základě takto nadefinovaných klíčových složek cenotvorby je v praktické části přistoupeno k analýze tržních cen s cílem věcně zdůvodnit jejich extrémní hodnoty a dále pak porovnat samostatné tržní cenové hladiny s cenou zjištěnou v oceňovací vyhlášce.

2 Cíl práce

Cílem práce je analyzovat tržní ceny zemědělských pozemků, zejména ve vztahu k lokalitě umístění pozemku a k jeho administrativní stanovené ceně, jenž je určena příslušnou vyhláškou. Výsledky analýzy jsou následně interpretovány v širším tržním kontextu tak, aby našly odpověď na hlavní výzkumnou otázku: Jak významnými faktory pro určování tržních cen pozemků jsou jejich lokalita.

K dosažení cíle BP bylo nejprve nutné stanovení postupných cílů jako je vyhledání veřejně dostupných informací k pozemkům v příslušných lokalitách a jejich administrativní setřídění do přehledné formy a vytvoření základního souboru statistických dat.

3 Literární rešerše

3.1 Půda

Pod pojmem půda je možné si představit část země, po které se pohybujeme nebo část zemského povrchu, který se využívá k zemědělské činnosti. Je také možné si půdu představit jako životní prostor pro rostlinné i živočišné organismy. ČSN definuje půdu tak, že „půda je vrchní vrstva zemské kůry přeměněná zvětráváním a fyzikálními/chemickými a biologickými procesy. Je složena z minerálních částic organické hmoty vody vzduchu a živých organismů uspořádaných v genetických půdních horizontech (ČSN ISO 11074 kvalita půdy – slovník, 2016). Půdu je tedy také možné popsat jako část přírody, která je plná života, která nás živí a velkou měrou přispívá k ochraně půd. Půdu je možné nazvat ve vztahu k délce její obnovy, kdy obnova degradované půdy do jejího původního stavu se počítá na stovky let neobnovitelným zdrojem. Proces obnovení cca 2,5 cm povrchové kůry do původního stavu trvá přibližně 500let (Pimentel a kol., 2010).

Z výše uvedeného vyplývá, že půda je nejcennějším přírodním bohatstvím, neobnovitelným zdrojem a základním výrobním faktorem v zemědělství a lesnictví.

3.2 Degradační faktory půdy

Degradace půd způsobuje ročně značné škody, odhaduje se, že se pohybují v rozmezí 4 až 10mld. Kč ročně. U přibližně 50% zemědělské půdy je doporučeno

hospodaření, které má zabránit další erozi půdy. V posledních letech se vlivem ochrany zemědělského půdního fondu tento proces degradace významně nezvyšuje i když stále lze konstatovat, že na většině ohrožených půd není stále prováděna systematická ochrana.

Mezi hlavní degradační faktory půdy patří

- Zábory půd (těsnění půdy)
- Eroze
- Utužení ornice (zhutnění půdy)
- Ztráta organické hmoty
- Ztráta biologické diverzity (difuzní znečištění)
- Kontaminace půdy

3.2.1 Zábor půdy

Zábor půdy je proces, kterým se zemědělská půda přeměňuje na zastavěné plochy. Tyto procesy jsou spojeny s přeměnou zemědělské půdy na oblasti pro stavební účely, které se dají definovat jako obytné, průmyslové a infrastrukturní. Patří mezi ně skladové haly, obchodní střediska, parkoviště, komunikace a občanská výstavba. Procesem záborem půd jsou nevíce postiženy státy západní Evropy (FAO a ITPS, 2015). V České republice je denně odnímáno cca 15 ha zemědělské půdy (MZ, strategie resortu MZ České republiky do roku 2030, 2017).

3.2.2 Eroze

Eroze je považována za vážný problém degradace, kdy dochází ke ztrátám nejúrodnější části zemědělské půdy – ornice. Jako následek vodní eroze je znečišťování vodních toků, což vede ke zhoršování prostředí pro vodní organismy a následně sebou nese zvyšování nákladů na úpravu vody (MZ, Strategie resortu MZ ČR do roku 2030, 2017). V České republice je vodní erozí ohroženo 60% zemědělské půdy a větrnou erozí zhruba 14% zemědělské půdy. Na území EU je přibližně 11,4 % postiženo mírnou až vysokou úrovní eroze půdy to je více než 5tun na ha za rok (Panagos a kol., 2016, 2015, 2017).

3.2.3 Utužení ornice

Jedná se o závažnou degradaci půdy, která v důsledku omezuje vsakování, infiltraci srážkové vody do půdy. Jedná se o fyzikální degradační proces, kterým se mění půroditost a propustnost půdy (Abdelrahman a kol., 2016). V České republice je utužením ohroženo 40 % ZPF (MZ, Strategie do roku 2030, 2017).

V Evropě je závažným utužením ornice postiženo zhruba 33mil. Hektarů. Jedná se o 4% plochy členských států EU (Lamandé a kol., 2012). Odhadem je 23 % - 36 % půd v Evropě náchylných utužení ornice a zhruba 18 % jich je již mírně utuženo (Jones a kol., 2012).

3.2.4 Ztráta organické hmoty

Ztráta organické hmoty je následkem lidské činnosti, která souvisí se změnami využívání půdy. Jedná se o přeměnu nezemědělských ploch, na plochy zemědělské a s tím spojené používání hnojiv a extenzivní střídání plodin.

Organická hmota v půdě ovlivňuje strukturu půdy a tím i další aspekty jako je zadržování vody, biologickou rozmanitost atd. Všechny tyto aspekty mají zásadní vliv na celkovou úrodnost půdy. Základní částí organické hmoty půdy je organický uhlík. Studie ukazují, že zhruba 45 % minerálních půd v Evropě je postiženo nízkým obsahem organického uhlíku s rozsahem 0-2 %, 2-6 % organického uhlíku, což se uvádí jako střední obsah uhlíku, má přibližně dalších 45% půdy (De Brogniez a kol., 2015; Lugato a kol., 2014). Organická hmota je zásadní pro kvalitu a úrodnost půdy, a tak je nutné používání organických hnojiv.

3.2.5 Ztráta biologické diverzity

Kontaminace půdy některými typy polutantů (znečišťujících látek), mezi které je možné zahrnout toxické látky, jejichž zdrojem je spalování fosilních paliv, exhalace z dopravy, vypouštění splaškových odpadních vod, černé skládky. Dále také nesprávné použití kalů z čističek odpadních vod, hnojiv, agrochemikálií, především pesticidů na zemědělskou půdu, má významný dopad na půdní biologická společenstva a tím i na funkci půdy, zdroje podzemních vod a v neposlední řadě také na bezpečnost potravin.

3.3 Bonitovaná půdní ekologická jednotka BPEJ

Bonitovaná půdní ekologická jednotka neboli BPEJ oproti klasickým půdním průzkumům hodnotí i stanovištní poměry, to vše směruje k tomu, aby se zjistila ekonomická hodnota daného stanoviště. (Vopavil, 2021). Proces bonitace vycházel z komplexního průzkumu půd (KPJ) uskutečněného v letech 1961-1971 na celém území ČSSR a následně pokračoval v letech 1973-1978.

Z provedeného výzkumu vznikla soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), která tvoří základní mapovací a oceňovací jednotky. Taktto definované jednotky slouží k ocenění produkční i mimoprodukční schopnosti zemědělské půdy a zhodnocení podmínek jejich využití.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je tvořena pětimístným kódem ve tvaru X.XX.XX, který charakterizuje klimatický region (KR), hlavní půdní jednotku (HPJ), sklonitost a expozici, skeletovitost a hloubku půdy, jenž specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku (Česká republika, 1998).

V rámci bonitace bylo určeno přes 2100 kódů BPEJ a dále bylo proveden o rozčlenění na 13 skupin půdních typů označeno PT1-PT13. Ze specifických vlastností půdy, které jsou dány úrodností zjišťovaných při bonitaci půdního fondu a bylo provedeno stanovení cen zemědělské půdy. Toto ekonomické ocenění je dáno produkčním oceněním BPEJ, a to na základě parametrizovaných neutrálních výnosů 10 hlavních plodin a normativních nákladů potřebných k jejich naplnění. Jedná se například o pšenici, oves, ječmen, kukuřice, brambory, cukrová řepa, řepka, víceleté plodiny. V ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je vedena databáze ekonomických parametrů oceňování zemědělské půdy. Pro stanovení úředních cen zemědělské půdy bylo také kritérium ekonomické ocenění hrubého ročního rentního efektu (HRRE) rostlinné výroby, v daných agroekologických podmírkách, při normativně stanovené efektivnosti hospodaření (Česká republika, 2018).

První číslice v kódu **X.xx.xx**, s rozsahem hodnot 0-9, charakterizuje klimatický region (KR), který zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Tyto klimatické regiony byly vyčleněny pouze pro účely bonitace zemědělského půdního fondu. K určení téhoto KR bylo použito mnoha kritérií a rozhodujícími jsou suma průměrných denních teplot rovných nebo vyšších než 10°C, průměrné roční teploty a průměrné teploty ve vegetačním období, průměrný úhrn ročních srážek a srážek ve vegetačním období.

Dále pravděpodobnost výskytu suchých vegetačních období v %, výpočet vláhové jistoty, hranice sucha a dále také nadmořská výška, údaje o známých klimatických singularitách a faktor mezoreliéfu. Zpracování a zevšeobecnění těchto údajů, z let 1901–1950, provedl Český hydrometeorologický ústav pro Českou i Slovenskou republiku a vytvořil déšť klimatických regionů. Charakteristika KR a přiřazení číselného kódu regionu je uvedeno ve vyhlášce 227/2018 Sb. v příloze č. 1 (Česká republika, 2018).

Druhá a třetí číslice kódu BPEJ x.**XX**.xx, s rozsahem hodnot 01-78, slouží k určení hlavní půdní jednotky (HPJ), která je definována jako účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodnňovacím opatřením (reliéfem území) (Česká republika, 2018).

Čtvrtá číslice v kódu x.xx.**Xx**, s rozsahem hodnot 0-9, vyjadřuje sdružený kód stanovištních faktorů, kterými jsou sklonitost a expozice. Sklonitost je charakterizována od úplné roviny se sklonem 0 - 1° až po sráz se sklonem 25°, přesná charakteristika kódu je uvedena v tab. č. 1. Sklonitost pozemku zásadně ovlivňuje jak vhodnost pěstování určitých druhů a kombinací plodin, tak použití různých druhů protierozních opatření organizačního, agrotechnického a technického charakteru. Expozice, s rozsahem hodnot 0-3, vyjadřuje polohu dané lokality vůči světovým stranám, charakteristika kódu je uvedena v tab. č. 2. Expozice pozemku má vliv také na vegetační podmínky, které jsou dány rozdílnými teplotami, osvitem a také srážkami.

V klimatických regionech (KR) s kódy BPEJ 0-5 je jižní expozice brána jako negativní a ostatní expozice se uvažují jako sobě rovné. V KR u číselných kódů 6-9 se uvažuje severní expozice jako negativní a expozice východ – západ a jih se uvažují jako sobě rovné (Česká republika, 2018).

Sdružení faktorů sklonitosti a expozice je dán jejich vzájemnou souvislostí a společně se podílejí na kvalitě daného kódu BPEJ.

Tabulka 1- Charakteristika kódu sklonitosti

Kód	Kategorie	Charakteristika
0	0-1°	úplná rovina
1	1-3°	rovina
2	3-7°	mírný sklon
3	7-12°	střední sklon
4	12-17°	výrazný sklon
5	17-25°	příkrý sklon
6	25°	sráz

zdroj Vyhláška č. 227/2018 Sb., v platném znění

Pátá číslice v kódu x.xx.xX, s rozsahem hodnot 0-9, vyjadřuje výslednou hodnotu kombinace skeletovitosti, která je dána podílem štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm a hloubky půdy (Česká republika, 2018). Jedná se o dvě vzájemně velmi blízké charakteristiky, které se ve svém důsledku výrazně ovlivňují hospodaření na půdě a také její funkce.

Tabulka 2 - Charakteristika kódu expozice

Kód	charakteristika
0	se vše směrovou expozicí
1	jih (jihozápad až jihovýchod)
2	východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod)
3	sever (severozápad až severovýchod)

zdroj Vyhláška č. 227/2018 Sb., v platném znění

Tabulka 3 - Charakteristika kódu kombinace sklonitosti a expozice

Číselný kód kombinace sklonitosti a expozice	Kód sklonitosti	Kód expozice
0	0-1	0
1	2	0
2	2	1
3	2	3
4	3	1
5	3	3
6	4	1
7	4	3
8	5-6	1
9	5-6	3

zdroj Vyhláška č. 227/2018 Sb., v platném znění

3.4 Hlavní půdní jednotka

Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem s příbuznými ekologickými a agronomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány půdním typem. Subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí půdy u některých výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu skeletovitosti a stupněm hydromorfismu V ČR je 78 HPJ, seskupených do 13 skupin. (Janků, 2003).

3.5 Klasifikace půd

V ČR jej určujeme dle Taxonomického klasifikačního systému půdy (TKSP), má hierarchickou strukturu a půdy rozlišujeme podle jistých diagnostických znaků.

Taxonomické systémy jsou založeny na hodnocení určitých diagnostických znacích identifikovatelné v konkrétní půdě, sodě či vrtu. Hodnotí se mocnost, ohraničení, tvary přechodů jednoho horizontu do druhého. Barvy, struktura, zrnitost, skeletovitost, vlhkost, konzistence (Pavlů, 2018).

Taxonomický klasifikační systém půdy (TKSP) má následující hierarchii.

Referenční třídy půd

velké skupiny půd, který vystupují v zahraničních klasifikačních systémech (hlavně WRB) a umožňují české půdy s nimi korelovat (substantivum končící – sol)

Půdní typy

hlavní oporné jednotky klasifikačního systému, charakterizované určitými diagnostickými horizonty a jejich sekvincemi nebo diagnostickými znaky (substantivum nekončící – sol)

Půdní subtypy

výrazné modifikace půdního typu podle znaků v hloubce níže 0,20 – 0,25 m (adjektivum za substantivem)

Půdní variety

charakterizují výskyt horizontů a znaků ve svrchních 0,20-0,25 m u lesních půd, dále vyjadřují méně výrazné znaky v půdním profilu než subtypové (druhé adjektivum za substantivem)

Ekologické fáze

charakterizují formy nadložního humusu lesních půd

Degradační a akumulační fáze

vyjadřují projevy kontaminace, intoxikace, eroze, akumulace aj.

Půdní formy

vyjadřují typ substrátu, jeho zrnitosti, vrstevnatosti a mineralogického složení, ovlivňujících pedogenezi; je to kategorie spojená s jakoukoliv genetickou taxonomickou úrovní. (Taxonomický klasifikační systém půd, 2004)

3.5.1 Půdní typy

1, LEPTOSOLY

Vytvářející se z rozpadu pevných či zpevněných hornin. Výrazná skeletovitost již ve svrchních horizontech.

Litozem – přítomnost iniciální horizontu Ai nedosahuje mocnosti více jak 5 cm. Nezáleží na chemickém složení matečné horniny.

Ranker – vzniká rozpadem silikátových hornin méně humozná

Rendzina – nachází se v oblastech karbonátových hornin.

Pararendzina – vzniká rozpadem karbonátosilikátových zpevněných hornin např. opuk v oblastech křídových pánev (Pavlů, 2018).

2, REGOSOLY

Vznik z nezpevněných sedimentů, zejména píska a štěrkopísku.

Regozemě – minerálně chudý substrát (křemenné písky apod.) vyznačují lehkou zrnitostí, a to i u těžších substrátů v případě narušování vodní erozí. Mají kyselé pH, jsou extrémně vodopropustné a vysýchavé. Původní vegetace jsou chudé borové lesy. Hlavním půdotvorným procesem je slabá humifikace (Pavlů, 2018).

3, FLUVISOLY

Do této třídy jsou zařazeny půdní typy s velice různorodým chemismem. Společným rysem je dlouhodobé periodické usazování sedimentů, vysoký obsah organické hmoty v celém profilu, vrstevnatost půdního profilu, střídání zrnitosti.

Fluvizem – se vyznačují příznivými fyzikálními vlastnostmi, nacházejí se ve větších plochách, zejména nížinách, a půdotvorný proces je periodicky přerušován akumulační činností vodního toku

Koluvizem – vznikají hlavně na úpatí svahů, kam je materiál z výšších úrovní transportován v důsledku eroze (Pavlů, 2018).

4, VERTISOLY

Velkou část tvoří bobtnavé jíly. Jejich znakem jsou změny jílů v suchých a vlhkých obdobích. V suchých obdobích vznikají hluboké trhliny. Jsou to těžké půdy. Z chemického hlediska jsou poměrně kvalitní, humózní s nasyceným sorpcním komplexem jejich fyzikální vlastností. Zemědělství je zde jen omezené.

Smonice – půdy vyvinuté ze smektických jílů v suchých oblastech (Pavlů, 2018).

5, ČERNOSOLY

Černozem – je nejúrodnější mírně vápnitý půdní typ ležící na sprašových pokryvech nížin, bývalé stepí a lesostepí. Černozem se nachází v nížinách, kde je teplejší podnebí s menším množstvím srážek. Černozem je nejúrodnější typ půdy. Převaha humínových kyselin, PH neutrální. Obsah humusu kolem 3 %.

Černice – se vyskytují v depresních polohách černozemí a v oblastech s vyššími úhrny srážek. Vysoký obsah kvalitního humusu (Pavlů, 2018).

6, LUVISOL

Je typická pro oblasti mírného klimatu s dostatkem srážek pro růst listnatých či smíšených lesů. Vznikají půdotvorným procesem zvaným ilimerizace.(mechanický přesun především jílových částic, tedy menších než 0,001 mm) prosakující vodou z horní části půdy do střední části profilu.) Podle intenzity ilimerizace jsou rozlišeny.

Šedozem – půdní typ vznikající v oblastech přechodů černozemí k hnědozemím. Poměrně hluboký humózní horizont.

Hnědozem – je půdní typ typický svou hnědou barvou, Je méně kvalitní než černozem (vyjma extrémně suchých období). Hnědozemě jsou typické pro rovinaté či jen mírně zvlněné oblasti, kde se dříve vyskytovaly spraše či sprašové hlíny vznikající převážně v dobách ledových v předpolí ledovců. Původní vegetační pokrytí bylo tvořeno listnatým lesem, který později ustoupil zemědělskému využití. V současnosti se jedná o široce využívanou zemědělskou půdu.

Luvizem – Dříve byly luvizemě nazývány illimerizované půdy. Vznikají z prachovic, polygenetických hlín i lehčích substrátů v rovinatém a mírně zvlněném terénu pahorkatin; podnebí je již značně humidnější. Obsah humusu je střední a jeho kvalita je méně příznivá (Pavlů, 2018).

7, KAMBISOLY

Jedná se o nejrozšířenější půdní typ na území České republiky zhruba 50% území. Je vázána na silně členité reliéfy. Nachází se ve svažitých podmírkách Mateční horniny jsou většinou nekarbonátové, skeletnaté, a proto je v půdní hmotě dostatek materiálu, který poměrně lehko podléhá zvětrávání, čímž se neustále uvolňují živiny, železo a jiné látky.

Kambizem – se vyskytují v mírném humidním klimatickém pásmu, a to především pod listnatými lesy. Vyznačují se kambickým hnědým metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků.

Pelozem – vznikl pedoplasmací slabě zpevněných jílů a slínů v hlavním souvrství svahovin jílovitě zvětrávajících břidlic. Podmínkou je, aby obsah jílu ($<1\mu\text{m}$) v převážné části pelického horizontu dosáhl hodnot nad 35 %. Tento horizont má plasmatickou, resp. porfyricko-plasmatickou stavbu matrice s tlakově orientovanými pastiemi na povrchu a uvnitř pedů. Nejrozšířenějšími formami nadložního humusu je mul a moder. Vedle tvorby běžného horizontu Ah možná tvorba melanického horizontu. Tyto půdy nedosahují oligobazické stadium acidifikace.

Rozšíření těchto půd je dáno substráty, které zmírňují proces vyluhování a zvyšují tendence k oglejení (Pavlů, 2018).

8, PODZOSOLY

Podzol – je označení pro vyluhovanou, neúrodnou půdu, která vznikla procesem podzolizace, působením klimatických vlivů, zejména pak nadměrné vlhkosti vzduchu. Je to způsobeno pronikáním vody, ze shora dolů a postupným vyplavováním minerálních koloidních látek a humusu do nižších horizontů. Podzoly se nacházejí většinou ve výšce nad 800 m, v prostředí se silně kyselými srážkami, nebo tam, kde je voda následně okyselena prostředím opadanky (jehličnaté lesy, smrkové monokultury apod.)

Kryptopodzol – je typ, který můžeme chápat jako přechod kambizemí k podzolům. Nedostatek bazických iontů, který umožňuje nastartování podzolizace (Pavlů, 2018).

9, STAGNOSOLY

Pseudoglej – rozšířený po celém území České republiky. Vzniká v místech periodicky se opakujícího převlhčování a vysušování půdního profilu, to znamená, že vznikají především v místech terénních depresí a v zaplavovaných územích kolem řek. Vzhledem k tomu je jejich výskyt omezen zhruba do nadmořských výšek maximálně 800 metrů. V nižších polohách vznikají především na těžkých půdotvorných substrátech.

Stagnoglej – má charakteristický mramorový horizont, ale intenzita převlhčení je větší než u pseudoglej (Pavlů, 2018).

10, GLEJSOLY

Glej – charakterizované reduktomorfním glejovým diagnostickým horizontem a zrašeliněnými horizonty akumulace organických látek. Podle relace mocnosti a hloubky výskytu výrazně redukovaného horizontu Gr, glejových horizontů s oxidovanými partiemi a event. znaků hydroeluviování, dále pak podle vývoje hydrogenních až holorganických hydrogenních horizontů identifikujeme rozdíly ve vodním režimu, ke kterému vývoj půdy dospěl. Podle znaků tohoto vývoje rozeznáváme subtypy (Pavlů, 2018).

11, SALISOLY

Solončak – půda s vysokým obsahem rozpustných solí. salického horizontu s vodivostí. Tento proces se může vyvolat i uměle nadměrným používáním minerálních hnojiv či intenzivním zavlažováním vy nasyceného extraktu. Výjimečně se může vyskytovat na jižní Moravě (Pavlů, 2018).

12, ORGANOSOLY

Organozem – jsou půdy charakterizované mocností organického rašelinného horizontu, která přesahuje 50 cm (Pavlů, 2018).

13, ANTROPOSOLY

Jsou půdy výrazně ovlivněné lidskou činností.

Kultizem – půdy vzniklé kultivační činností člověka, která svým vlivem přesahuje vytvoření ornice a běžné zlepšování jejich vlastností minerálním a organickým hnojením, zpracováním půdy. Dále se jedná o půdy, u kterých meliorační zásahy přesahují vliv úprav vodního režimu odvodněním, drenáží či závlahou. Výrazné úpravy půdy běžnými agrotechnickými a melioračními zákroky hodnotíme na úrovni antropických subtypů půd. Vznikají při mimořádném zapravování zúrodňovacích materiálů do ornice, dále pak hloubkovým kypřením, rigolováním, zapravením isolačních folií apod. U těchto půd můžeme identifikovat podle zachovaných profilových znaků event. ze zbytků horizontů rozvlečených antropogenní turbací, že půda vznikla in situ.

Antropozem – půda vytvářená či vytvořená člověkem nakupených substrátů získaných při těžební a stavební činnosti. Charakter půd je dán jednak vlastnostmi původního materiálu, jednak antropogenním vrstvením či mísením materiálu, dále pak usměrněním procesu pedogeneze po rekultivacích, sledujících úpravy půdních vlastností pro zemědělské, lesnické, rekreační využití. Pouhé navrstvení materiálů vytváří pouze antropické substráty. Specifické podmínky se mohou vytvářet po rekultivaci skládek odpadů (Pavlů, 2018).

14, ANDOSOLY

Andozem – je charakteristická vznikem na méně zpevněných sopečných popelech. Toto kyselé substráty zvětrávají a uvolňují velké množství volného hliníku (Pavlů, 2018).

15, NATRISOLY

Slanec – jsou půdy alkalické PH větší až 12 a ovlivněné přítomností rozpustných solí jejich zvýšená koncentrace vede k procesu soloncování (Pavlů, 2018).

Metodika

Bylo využíváno všech dostupných zdrojů, databází realitních kanceláří, údajů katastrálních úřadů a nabídek realitních serverů.

Preferována bude analýza realizovaných cen před nabídkovými.

Tržní ceny budou analyzovány ve vztahu k lokalitě či bonitě, bude vyjádřen důvod pro maximální či minimální cenu a cenová hladina porovnána s cenou zjištěnou v oceňovací vyhlášce.

Zjištění skutečné prodejní neboli tržní ceny se v praxi jeví jako problém. Cenu lze zjistit nahlédnutím do kupní smlouvy, případně poptání na katastrálním úřadu.

Realitou však zůstává, že skutečnou prodejní cenu zná pouze kupující a prodávající čili v případě, že neexistuje kontakt s kupujícím, respektive prodávající stranou je nereálné získat relevantní informace. V případě příslušných státních institucí, jakými jsou zmiňované katastrální a pozemkové úřady, není problém s absencí tržních cen v cenových mapách, nýbrž se zprostředkováním těchto informací, které je v tomto smyslu zpoplatněno.

Jako potencionální zdroj informací byly osloveny realitní kanceláře, nicméně ani ony nebyly ochotny informace bezplatně poskytnout. V této fázi bylo rozhodnuto o substituci tržních cen cenami nabídkovými, přičemž zdrojem příslušných dat je server sreality.cz, (S-reality, 2022), který je veřejně dostupný a zároveň poskytuje pohodlné informace bezplatně.

Kompletace dat byla prakticky provedena napříč vybranými okresy a jednotlivé pozemky byly identifikovány parcelním číslem jakožto primárním klíčem k absolutní identifikaci pozemků a jeho cen. Tako vytvořený datový soubor byl následně rozšířen o další klíčové atributy jako je kód BPEJ (Bonitovaná půdně ekologická jednotka) a jemu příslušná administrativní cena.

Na serveru S-reality (S-reality, 2022) byly prvně vyhledány, napříč zadanými okresy, nabízené pozemky s uvedeným parcelním číslem a nabídkovou cenou. Následně na portále katastrálního úřadu (Katastrální úřad, 2022) byl ke každému parcelnímu číslu dohledán příslušný kód BPEJ. Kód BPEJ byl následně využit pro získání úředních administrativních cen, dále specifických vlastností půdy, mezi které patří půdní typy svažitost, skeletovitost a hloubka ornice, a to na základě datových podkladů na serveru VUMOP.cz (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) (VUMOP,2022). Výsledný datový soubor je uveden v příloze č. 1. Jako statistického základního souboru je použito celého datového souboru nabídkových cen tzn., že náš základní soubor je konečný a prakticky spočitatelný.

Metodika zpracování tohoto základního souboru statistických dat je vztažena k interpretování nabídkových cen zemědělských pozemků. Dříve, než se budu na tento statistický znak dotazovat z více pohledů a administrativních operací s ním spojených, s cílem ozřejmit jeho vlastnosti v reálném světě, je primárně nutné charakterizovat chování jeho hodnot v mezích statistické zvyklosti.

4 Výsledky

4.1 Základní zpracování datového souboru

Datový soubor, příloha č. 1, disponuje rozsahem „n“ = 130 pozemků a nabídkové ceny „ x_i “ reprezentují diskrétní dat s teoreticky velkým počtem variant obměn. V tomto smyslu bylo vhodné ceny seřadit dle velikosti, určit x_{\min} a x_{\max} a spočítat šířku intervalu, ve kterém se data nacházejí tzn. určit variační rozpětí „ R “ = $x_{\max} - x_{\min}$.

R – variační rozpětí

x_{\max} – maximální hodnota nabídkové ceny základní datovém souboru

x_{\min} – minimální hodnota nabídkové ceny v základním datovém souboru

(s ohledem na rozsah datového souboru a na hodnoty x_{\max} a x_{\min} byly sestrojeny na sebe navazující intervaly zahrnující všechny hodnoty cen, a poté určeno kolik identických cen leží v těchto zkonstruovaných intervalech (interval zleva otevřený a zprava uzavřený ($x_1;x_2>.....(x_n;x_n>$

4.2 Bodové rozdělení četností

Základní datový soubor má relativně větší rozsah $n > 50$ (130), ale nabídkové ceny fakticky disponují malým počtem variant obměn. Jako alternativu, respektive rozšíření k výše uvedenému intervalovému rozdělení četností bylo přidáno bodové rozdělení četností nabídkových cen zemědělských pozemků v podobě tabulky č. 4.


Tabulka 4 - Bodové rozdělení četností vlastní zpracování

varianta ceny x_i	absolutní četnost n_i	relativní četnost p_i	absolutní kumulativní četnost N_i	Relativní kumulativní četnost $R_i(x)$
25	4	0,030769231	4	0,30769231
28	2	0,015384615	6	0,046153846
30	5	0,038461538	11	0,084615385
31	13	0,1	24	0,184615385
34	11	0,084615385	35	0,269230769
35	9	0,069230769	44	0,338461538
36	16	0,123076923	60	0,461538462
37	6	0,046153846	66	0,507692308
38	3	0,023076923	69	0,530769231
39	8	0,061538462	77	0,592307692
40	3	0,023076923	80	0,615384615
41	4	0,030769231	84	0,646153846
42	15	0,115384615	99	0,761538462
43	2	0,015384615	101	0,776923077
45	8	0,061538462	109	0,838461538
47	1	0,007692308	110	0,846153846
48	7	0,053846154	117	0,9
50	6	0,046153846	123	0,946153846
55	5	0,038461538	128	0,984615385
59	2	0,015384615	130	1
	130	1		

zdroj dat Příloha č. 1

Z tabulky č. 4 bylo následně čerpáno dat pro grafické zobrazení
a, polygon četnosti

Obrázek 1 - Polygon četnosti




Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 1

Z polygonu četností jednotlivých cen je zcela zřejmé, že jejich rozdělení není symetrické (ani přibližně). Cenové rozpětí je od 25 do 59 Kč/m₂, přičemž je patrné, že obsahuje více, než jeden modus tj. obsahuje 3 vrcholy. Toto více (trojmodální) rozdělení poukazuje na jistou nehomogenost zkoumaného souboru dat. V tomto případě jde o důsledek toho, že datový soubor tvoří nabídkové ceny z různých okresů, což je z hlediska ceny nehomogenní soubor, neboť průměrná cena pozemků v jednotlivých okresech se obecně liší.

Je také patrné, že aritmetický průměr „špatně“ zastupuje dat našeho souboru a není vhodnou mírou polohy.

b, Součtová křivka

Obrázek 2 - Součtová křivka




Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 1

C, Empirická distribuční funkce

(je to neklesající „schodovitá“ funkce vždy s hodnotami $F_i(x)(0;1)$)

Obrázek 3 - Empirická distribuční funkce



Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 1

Na ose „x“ je nanesena hodnota ceny a na ose „y“ procento (jako desetinné číslo) pozorování (frekvence výskytu) menších než daná hodnota.

Je to graf kumulativních relativních četností, tj. odhad distribuční funkce. Odchylky od normálnosti se v tomto výnosu projevují nelinearitou křivky (lineární funkce je nanesena červenou osou).

4.3 Intervalová rozdělení četností

Pro určení optimálního počtu „k“ (počet intervalů) existuje několik pravidel.

Sturgesovo pravidlo $k \approx 1 + 3,32 \cdot \log(n)$

Yuleovo pravidlo $k \approx 2,5 \cdot \sqrt[4]{n}$

Další pravidla $k \approx \sqrt{n}; k \approx 5 \cdot \log(n)$

Stanovení orientační šířky intervalu:

$$h \frac{R}{k}$$


h – šířka intervalu

R - variační rozpětí

K – počet intervalů

Přestože zpracování výše uvedené je subjektivního charakteru (upravovat mohu počet intervalů i jejich šířku), je snaha data objektivně uspořádat tak, aby rozdělení četností dokázalo vypovídat alespoň o základních vlastnostech sledovaného znaku, tj. nabídkové ceny. Je smysluplné „srovnání“ takto zkonstruovaného histogramu s normálním rozdělením, tj. srovnání histogramu s Gausovou křivkou, což může sloužit k posouzení, zda jsou získaná data možné považovat za realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení, tj. podpoření formálního testu normality Shapiro – Wilkova testu.⁴

Obrázek 4 – Histogram četnosti



Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 1

4.4 Charakteristiky poloh

Úroveň ceny vyjádřená číselným znakem.

- Aritmetický průměr
- Modus
- Medián
- Kvantily

Obecně platí, že čím více je rozdělení asymetrické.

Aritmetický průměr z tabulky č. 1, určíme aritmetický průměr dle vztahu:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n n_i \cdot x_i}{h}$$

X – vážený aritmetický průměr

N_i – absolutní četnost výskytu

X_i – varianta ceny

Takto definovaný je vážený aritmetický průměr (vchází, ale stejně jako normální aritmetický průměr)

Pozn. „modus „mohu jako modální interval nazvat ten, který má nejvyšší četnost. x – 38,6091 – tato hodnota je převzata z Shapiro – Wilkova testu (list „A“)

*

4.5 Charakteristiky variability

Průměry, kvantily, modus atd. shrnuté v kapitole 3.1.3 v sobě shrnují informaci pouze o jedné vlastnosti rozdělení četností, a to o poloze. Cílem určení variability je určit, jak dobře polohové charakteristiky vystihují můj soubor (respektive podsoubory napříč krají).

Již zmiňované variační rozpětí „ $R = x_{\max} - x_{\min}$

+kvantilové rozpětí $R_Q = x_{0,75} - x_{0,25}$ – leží v něm 50% prostředních hodnot uspořádaného souboru (dle velikosti cen)

+decilové rozpětí cen $R_D = x_{0,9} - x_{0,1}$ – leží v něm 80 % prostředních hodnot uspořádaného souboru (dle velikosti cen)

+percentil $R_C = x_{0,99} - x_{0,01}$ – leží v něm 98 % prostředních hodnot uspořádaného souboru (dle velikosti cen)

Protože všechna rozpětí výše uvedená z podstaty jejich definice mají menší vypovídající hodnotu, (neboť tyto míry variability vycházejí vždy pouze ze dvou hodnot (vybraných hodnot)), bylo nutno použít tzv. centrované hodnoty: $x_i - \bar{x}$; variabilitu naměřených hodnot, však nelze přímo charakterizovat touto diferencí, protože suma odchylek od aritmetického průměru je vždy =0, tedy (základní vlastnost aritmetického průměru), proto se užívají absolutní hodnoty těchto diferencí:

$\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \geq 0$ respektive $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ a jako míru variability cen je uváděn rozptyl:

$$S_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{10279,8694}{130} = 79,0759(kč)^2$$

A směrodatná odchylka: $s = \sqrt{S_n^2} = 8,8925Kč$

4.6 Charakteristika koncentrace

Koefficienty šikmosti a špičatosti, jsou pro normální rozdělení nulové, nabízí se tedy možnost jejich využití k ověření hypotézy o normálnosti. Pokud tedy byla zamítnuta alespoň jedna hypotéza H_{03} špičatost =0, nebo H_{04} šikmost =0, pak byla zamítnuta i tvrzení, že výběr pochází z normálního rozdělení.

$$\text{Koefficient šikmosti: } a_3 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{n \cdot S_n^3}$$

a_3 šikmost (asymetrie): 0,8111 (výsledek ze Shapiro-Wilkova testu)

$$\text{Koefficient špičatosti: } a_4 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{n \cdot S_n^4} - 3$$

A4 špičatost: 2,7548 (výsledek ze Shapiro-Wilkova testu)

- Průměrná hodnota druhé mocniny odchylky od průměru je variace (míra variability souboru) obecně:
- I -tá mocnina odchylky od průměru se nazývá I-tý centrální moment.

5 Testování statistických hypotéz

Z pohledu teorie pravděpodobnosti je smysluplná myšlenka, že jako u náhodného pokusu, jehož výsledek není jednoznačně určen jeho počátečními podmínkami je i náhodnost nabídkové (tím spíše tržní) ceny teoreticky spojena s nedostatečnou znalostí podmínek, (či atributů), které ji určují neboli tvoří. Tato „náhoda“ však není subjektivní nevědomost, neboť nastoupení každého náhodného jevu, respektive každé nabídkové ceny, lze prostřednictvím matematického aparátu číselně „ocenit“, tedy přiřadit mu (ji) pravděpodobnost. Proto bylo důležité zabývat se otázkou, jaké různé modely rozdělení pravděpodobnosti mohou soubory nabídkových cen zemědělské půdy potencionálně vykazovat, zvláště v tomto případě, kdy bylo cílem v návaznosti na popisnou statistiku provést v souladu s řešeními (věcnými otázkami) statistickou analýzu.

Motivací pro testování statistických hypotéz v této bakalářské práci je předpoklad, že lze nominální veličinu, kterou je v tomto případě „okres“ vysvětlit variabilitu získaných (zjištěných) cen zemědělské půdy. To znamená prokázat rozdílné úrovně cen v „podskupinách“, které vznikly tříděním samotných cen podle okresu. V tomto smyslu bylo přistoupeno k jednofaktorové analýze rozptylu, nebo k její neparametrické obdobě, podle toho, jaké podmínky pro užití těchto testů, budou data splňovat.

Statistickou hypotézou se rozumí tvrzení o předpokládaných vlastnostech sledované náhodné veličiny, tento předpoklad je nazván nulová hypotéza s označením H_0 jako alternativa nulové hypotézy je postavená tzv. alternativní hypotéza, která je označena H_A . jedná se o hypotézu kterou chceme s ohledem na věcný problém prokázat.

Výsledkem testovaní statistických hypotéz je zamítnutí H_0 nebo nezamítnutí H_0 .

Testovaná hypotéza H_0 je zamítnuta na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ nebo $\alpha = 0,01$, což je předpokládaná pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy, a to v případě, že platí H_0 ještě před uskutečněním testů. V případě P hodnoty se jedná o nejmenší pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy na základě uskutečněného testu.

V analýze rozptylu se předpokládá, že se pracuje s nezávislými náhodnými výběry z normálního rozdělení se stejným rozptylem. Proto je vhodné tyto předpoklady nejdříve prověřit, a to pro každý okres zvlášť.

4.7 Test normality (všechny okresy)

Statistický software ve svých výsledkových výstupech rozhoduje o zamítnutí, nebo nezamítnutí hypotézy porovnáním hladiny významnosti testu s tzv. p – hodnotou. P – hodnota je nejmenší hladina významnosti, při které je možné ještě zamítnout nulovou hypotézu H0.

V případě pravostranného testu, kterým je Shapiro – Wilkův test je P hodnota dána obsahem plochy pod grafem hustoty pravděpodobnosti testovací statistiky napravo od její hodnoty a spočte se jako: p – hodnota = F (W) kde F (W) značí hodnotu distribuční funkce pro danou hodnotu testovací statistiky.

Formální tvar testovací statistiky Shapiro-Wilkova testu je:

$$w = \frac{(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)})^2}{\sum_i^n (x_i - \bar{x})^2}$$

n_i – četnost ceny v okresech

x_i – cena pozemku

\bar{x} – průměrná cena pozemku

Okres Příbram:

Hladina významnosti α : 0,05

Velikost vzorku: 19

Průměr x^- x^+ : 40,9474

Směrodatná odchylka S: 3,291

H0: ceny mají normální rozdělení

H1: ceny mají alternativní rozdělení (ostatní distribuce)

Výsledky z testu:

P – hodnota: 0,0003695, což je nižší hodnota, než hladina významnosti testu α : 0,05

p – hodnota $< \alpha$ hladina významnosti

Zamítám H0 na hladině významnosti 0,05.

Okres Opava:

Hladina významnosti α : 0,05

Velikost vzorku: 27

Průměr x: 42,3333

Směrodatná odchylka S: 10,9158

H_0 : ceny mají normální rozdělení

H_1 : ceny mají alternativní rozdělení (ostatní distribuce)

Výsledky z testu:

P – hodnota: 0,02117, což je nižší hodnota, než hladina významnosti testu α : 0,05

P-hodnota < α hladina významnosti

Zamítám H_0 na hladině významnosti 0,05.

Okres Ostrava:

Hladina významnosti α : 0,05

Velikost vzorku: 24

Průměr x : 37,0417

Směrodatná odchylka S : 5,1792

H_0 : ceny mají normální rozdělení

H_1 : ceny mají alternativní rozdělení (ostatní distribuce)

Výsledky z testu

P – hodnota: 0,0101, což je nižší hodnota, než hladina významnosti testu α : 0,05

P – hodnota < α hladina významnosti

Zamítám H_0 na hladině významnosti 0,05.

Okres Nový Jičín:

Hladina významnosti α : 0,05

Velikost vzorku: 31

Průměr x : 58,5161

Směrodatná odchylka S : 6,2922

H_0 : ceny mají normální rozdělení

H_1 : ceny mají alternativní rozdělení (ostatní distribuce)

Výsledky z testu:

P – hodnota: 0,002895, což je nižší hodnota, než hladina významnosti testu α : 0,05

p – hodnota < α hladina významnosti

Zamítám H_0 na hladině významnosti 0,05.

Okres Rychnov nad Kněžnou:

Hladina významnosti α : 0,05

Velikost vzorku: 29

Průměr: 36,3448

Směrodatná odchylka S: 5,9478

H0: ceny mají normální rozdělení

H1: ceny mají alternativní rozdělení (ostatní distribuce)

Výsledky z testu:

P – hodnota: 0,000002432, což je nižší hodnota, než hladina významnosti testu α : 0,05

p – hodnota $<\alpha$ hladina významnosti

Zamítám H0 na hladině významnosti 0,05.

Na základě formálních testů normality uvedených výše vyplývá, že nabídkové ceny zemědělských půd vykazují jiné parametry rozdělení, než je rozdělení normální, a to včetně jednotlivých okresů. Parametrická analýza rozptylu, testující shodu středních hodnot, nelze v tomto případě použít, protože vzhledem k výše uvedenému, jsou parametry rozdělení neznámé (respektive nejsou normální). Z tohoto důvodu je přistoupeno k neparametrické analýze, založené na testování pořadí a shodě distribučních funkcí, pomocí Kruskal – Wallisova testu. Pomocí tohoto testu se budu snažit určit, zda některé z okresů stochasticky dominují nad ostatními ve smyslu ceny. Konkrétně tedy přistupuji k testování nulové hypotézy, že mediány cen všech okresů jsou shodné, oproti alternativě, že minimálně jeden medián okresu, se liší od mediánu okresu jiného. (nebo alternativně lze nulovou hypotézu definovat, že distribuční funkce napříč okresy jsou stejné, oproti alternativě, že minimálně jedna distribuční funkce je jiná).

H0 – Mediány cen všech okresů jsou shodné

HA – Minimálně jeden medián okresu, se liší od mediánu okresu jiného

Testovací statistika (Kruskal – Wallis) má tvar:

$$H = \frac{12}{n \cdot (n+1)} \sum \left(\frac{R_j^2}{n_j} \right) - 3(n+1)$$

R_j – součet pořadí skupiny j. n.

j – počet okresů v testu (5 okresů)


n_j – počet cen v konkrétním okrese

n. – celková velikost základního souboru (130 cen)

P – hodnota 0,002 $<\alpha$ 0,05, tedy zamítám nulovou hypotézu H0. Test ukázal, že existují výrazné rozdíly cen mezi okresy. Na okres lze v tomto smyslu nahlížet jako na odpovědný nominální faktor, jenž výrazným způsobem ovlivňuje nabídkové ceny.

Test Kruskal – Wallis ovšem blíže nespecifikuje konkrétní okresy, kterých se tyto výrazné rozdíly týkají. Cílem práce je však konkrétně určit ty okresy, jejichž nabídkové ceny pozemků „mediánově“ zaostávají za ostatními, a to z tohoto důvodu, aby bylo možné cíleně rozhodnout o potenciální protierozní ochraně. Pro určení konkrétních okresů, kterých se mohou tato opatření týkat, bylo přistoupeno k rozšíření Kruskal – Wallisova testu o Dunnův test s Bonferroního korekcí a pro lepší přehlednost byla vynesena struktura cen v jednotlivých okresech i graficky, krabicovým diagramem (boxplotem) níže.

Obrázek 5 – Boxplot



Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 1

Charakteristické statistické vazby nabídkové a administrativní ceny

Pro určení výměny těsnosti závislosti bude použito Personova korelačního koeficientu $r (xy)$

Korelační koeficient lze vyjádřit jako podíl kovariance a součinu obou směrodatných odchylek ve tvaru

$$R(xy)=s_{xy}$$

$$S_x * S_y$$

$$= 0,1124$$

Sx = směrodatná odchylka nabídkových cen

Sy = směrodatná odchylka administrativních cen

Sxy = výběrová kovariance

Korelační koeficient (Personův) je v intervalu (0;1) tedy má kladnou hodnotu, což by nasvědčovalo přímé vazbě mezi nabídkovou a úřední cenou, avšak hodnota se neblíží ani 1 ani -1 ($r_{xy} = 0,1124$).

Nelze tedy předpokládat, že by mezi cenou nabídkovou a úřední existovala lineární závislost, může však existovat jiná alternativní.

6 Charakteristika okresů

V rámci sbírání dat bylo vybráno 130 pozemků v pěti okresech.

Rychnov nad Kněžnou

Okres Rychnov nad Kněžnou se rozkládá na východě Královéhradeckého kraje, povrch okresu tvoří roviny, střední pahorkatiny a horský masív Orlických hor. Z celkové rozlohy okresu 982km² tvoří zemědělská půda 53,1 % ze které orná půda zabírá 58,7 % a 36,1 % je trvale zatravněna plocha. Téměř 38% plochy okresu je pokryto lesy. (Český statistický úřad, 2023)

Sběr dat 29 pozemků

Tabulka 5 - Rychnov nad Kněžnou 29 pozemků

HPJ	počet
65	1
58	2
56	1
55	1
54	10
51	1
40	1
38	1
25	8
21	1
20	2

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č.2

Sledované pozemky jsou zařazeny dle zjištěných tržních cen:

Tabulka 6 - Rychnov nad Kněžnou nabídkové ceny

HPJ	cena	%
25	50,00 Kč	3,45%
40	50,00 Kč	3,45%
51	50,00 Kč	3,45%
65	50,00 Kč	3,45%
25	36,00 Kč	24,14%
54	36,00 Kč	10,34%
38	36,00 Kč	3,45%
58	35,00 Kč	6,90%
54	34,00 Kč	17,24%
20	34,00 Kč	6,90%
21	30,00 Kč	3,45%
55	30,00 Kč	3,45%
56	30,00 Kč	3,45%

Vlastní zpracování, zdroj Příloha č. 2

V okrese **Rychnov nad Kněžnou** je nejvyšší tržní cena 50,- Kč u čtyřech sledovaných pozemků, v HPJ 25,40,51 a 50, přičemž jsou zastoupeny pouze v 3,75 %.

Vyhláška stanovuje částku k těmto pozemkům

HPJ 25 4,15Kč

HPJ 40 1,22Kč

HPJ 65 5,39 Kč

HPJ 51 4,85 Kč

Opava

Okres Opava je svojí současnou rozlohou 1116km² je v pořadí třetím největším okresem Moravskoslezského kraje. Okres má příznivé podmínky pro zemědělství a stále tak patří k převážně zemědělskému využití. Z celkové výměry je 68 tis ha zemědělské půdy připadá zhruba 80 % na ornou. (Český statistický úřad, 2023)

Sběr dat 27 pozemků

Tabulka 7- Opava 27 pozemků

HPJ	počet
73	2
48	3
38	2
37	1
35	2
27	4
26	10
14	3

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

Sledované pozemky jsou zařazeny dle zjištěných tržních cen:

Tabulka 8 - Opava nabídkové ceny

HPJ	cena	%
14	59,00 Kč	7,41%
27	55,00 Kč	14,81%
37	55,00 Kč	3,70%
48	47,00 Kč	3,70%
26	45,00 Kč	29,63%
35	36,00 Kč	7,41%
26	36,00 Kč	3,70%
38	36,00 Kč	3,70%
48	36,00 Kč	3,70%
48	35,00 Kč	3,70%
14	28,00 Kč	3,70%
73	25,00 Kč	7,41%
26	25,00 Kč	3,70%
38	25,00 Kč	3,70%

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

V okrese **Opava** je nejvyšší tržní cena sledovaných pozemků 59,- Kč u HPJ14 a z celkového 100 % činí 7,41%. Následuje cena 55 kč v HPJ 27 (14,81%) a HPJ 37 (3,70%).

Vyhláška stanovuje částku k těmto pozemkům:

HPJ 14 12,77Kč

HPJ 27 6,11Kč

HPJ 37 1,35Kč

Nový Jičín

Okres Nový Jičín se řadí mezi menší okresy České republiky, Rozloha tohoto okresu ležícího v Moravskoslezském kraji je 882 km². Většina území má pahorkatinný ráz s výškovým rozdílem nejvyššího a nejnižšího místa okresu 896 m n. m. V okrese je 65% zemědělských pozemků přičemž z toho $\frac{3}{4}$ tvoří orná půda. (Český statistický úřad, 2023)

Pro sběr dat 31 pozemků

Tabulka 9 - Nový Jičín 31 pozemků

HPJ	počet
58	2
49	2
47	2
45	1
44	1
43	12
42	1
41	2
40	1
28	1
26	4
24	2

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

Sledované pozemky jsou zařazeny dle zjištěných tržních cen:

Tabulka 10 - Nový Jičín nabídkové ceny

HPJ	cena	%
43	48,00 Kč	19,35%
45	48,00 Kč	3,23%
24	41,00 Kč	3,23%
44	40,00 Kč	3,23%
49	40,00 Kč	3,23%
58	40,00 Kč	3,23%
26	39,00 Kč	12,90%
47	39,00 Kč	6,45%
41	39,00 Kč	3,23%
42	39,00 Kč	3,23%
58	35,00 Kč	3,23%
24	34,00 Kč	3,23%
28	34,00 Kč	3,23%
40	34,00 Kč	3,23%
41	34,00 Kč	3,23%
43	31,00 Kč	19,35%
49	28,00 Kč	3,23%

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

V okrese **Nový Jičín** je nejvyšší tržní cena sledovaných pozemků 48,-Kč u HPJ 43 19,35 % a 3,23% a následuje tržní cena 41,-Kč u HPJ 24 z celkového 100% činí také 3,23%

Vyhláška stanovuje částku k těmto pozemkům:

HPJ 43 10,03Kč

HPJ 24 5,08 Kč

Ostrava

V okrese Ostrava je mírně zvlněná s mnoha vodními plochami, poddolovaným a místy silně narušeným terénem. Celkovou rozlohou 332 km² je nejmenším okresem v Moravskoslezském kraji a třetím nejmenším v celé republice. Z celkové plochy okresu zaujímá zemědělská půda 46 %, lesní půda 16 % (Český statistický úřad, 2023).

Sběr dat 24 pozemků

Tabulka 11 - Ostrava 24 pozemků

HPJ	počet
67	4
59	4
58	4
56	3
43	4
26	4
22	1

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

Sledované pozemky jsou zařazeny dle zjištěných tržních cen:

Tabulka 12 - Ostrava nabídkové ceny

HPJ	cena	%
56	50,00 Kč	4,17%
26	42,00 Kč	16,67%
56	42,00 Kč	4,17%
43	41,00 Kč	8,33%
22	41,00 Kč	4,17%
43	38,00 Kč	4,17%
58	38,00 Kč	4,17%
67	38,00 Kč	4,17%
59	35,00 Kč	16,67%
67	35,00 Kč	4,17%
58	31,00 Kč	12,50%
67	31,00 Kč	8,33%
43	31,00 Kč	4,17%
56	31,00 Kč	4,17%

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

V okrese **Ostrava** je nejvyšší tržní cena sledovaných pozemků 50,-Kč u HPJ 56 – 4,17 % a následuje tržní cena 42,- Kč u HPJ 26 (16,67 %) a HPJ 56 (4,17 %)

Vyhláška stanovuje částku k těmto pozemkům:

HPJ 56 10,34Kč

HPJ 26 3,73 Kč

Příbram

Okres Příbram leží v jihozápadní části Středočeského kraje. Území okresu je značně členité s výrazným zalesněním krajiny (přes 40 %). Svojí rozlohou 1 628 km² zaujímá okres 14,7 % z jeho rozlohy, čímž se řadí na 1. místo ve Středočeském kraji (Český statistický úřad, 2023).

Sběr dat 19 pozemků

Tabulka 13 - Příbram 19 pozemků

HPJ	počet
47	2
46	1
45	1
32	6
26	9

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

Sledované pozemky jsou zařazeny dle zjištěných tržních cen:

Tabulka 14 - Příbram nabídkové ceny

HPJ	cena	%
46	50,00 Kč	5,26%
26	43,00 Kč	10,53%
26	42,00 Kč	36,84%
47	42,00 Kč	10,53%
45	42,00 Kč	5,26%
32	37,00 Kč	31,58%

Vlastní zpracování, zdroj dat Příloha č. 2

V okrese **Příbram** je nejvyšší tržní cena sledovaných pozemků 50,-Kč u HPJ 46 5,26 % a následuje tržní cena 43,- Kč u HPJ 26 (10,53 %) a tržní cena HPJ 26 (36,84 %)

Vyhláška stanovuje částku k těmto pozemkům:

HPJ 46 8,94Kč

HPJ 26 7,26Kč

7 Závěr

Z tabulky č.4 plyne, že variační rozpětí nabídkových cen zemědělských pozemků je od 25 - 59Kč/m², přičemž průměrná nabídková cena pozemku má, po zaokrouhlení na celé koruny, hodnotu 39 Kč/m², což vyplývá ze vztahu. Pokud je však zohledněna variabilita, koncentrace a zejména četnost zastoupení jednotlivých nabídkových cen bodového rozdělení četností, je nutné konstatovat, že konkrétní ceny, tj. 39Kč/m², nenabývá ani 7 % analyzovaných zemědělských pozemků (přesně 6,1 %; viz. Tab.č.4) V tomto smyslu není průměrná cena vnímána, jako vhodná míra polohy, jež by měla sloužit k solidnímu zobecnění nabídkových cen zemědělských pozemků. Přesto lze v průměrné hodnotě spatřovat jistou limitní hranici, která odděluje pozemky relativně dražší od levnějších, neboť cca 53 % resp. 40 % nabídkových cen je nižších, respektive vyšších (viz. Tab. č. 4).

Tato „určitá nehomogenita“ datového souboru se projevuje více modálním rozdělením nabídkových cen, jenž je nejvíce zřejmá z obr.č.1 případně z obr.č. 4. Jde o důsledek toho, že jednotlivé nabídkové ceny pocházejí z různých okresů, které jsou z hlediska cen nehomogenním souborem, neboť některé z okresů cenově dominují nad ostatními (viz. Test Kruskal-Wallis).

Samotný typ okresu se tedy jeví, jako významný nominální faktor, který výrazně promlouvá do cenových hladin, přičemž nejlevnější pozemky lze v našem případě najít v okresech „Ostrava“ a „Rychnov nad Kněžnou“, jejichž nabídkové ceny „mediánově“ zaostávají za ostatními (viz boxplot). Jedním z faktorů takového propadu cen mohou být aspekty degradace půd, které se mohou v konečném důsledku projevovat statisticky významným propadem ceny příslušného pozemku až o 50 %.

Bonitní model pro administrativní oceňování zemědělské půdy je sice klíčový pro stanovení úředních cen, nicméně takto spočítané ceny nejsou pro hodnoty nabídkových cen prakticky vůbec směrodatné. Z přílohy č. 1 je patrné že v 90 % případů (tj. 117 ze 130 sledovaných pozemků) jsou cenové hladiny stanovené dle BPEJ řádově nižší než odpovídající nabídkové ceny. I v „nejlepším“ případě je cenový rozdíl přes 15 Kč, přičemž nabídková cena je více než dvakrát vyšší, než příslušná cena úřední (viz. Řádek N=36; Příloha č. 1).

Vzhledem k výše uvedenému a zejména s ohledem na rozsah této bakalářské práce, je analýza těsnosti statistického vztahu mezi úřední a nabídkovou cenou omezena pouze na interpretování Personova korelačního koeficientu. Jeho hodnota je rovna

$r_{xy} = 0,11$, což vede k předpokladu, že pokud mezi cenami vůbec existuje alespoň empiricky vyjádřitelná závislost, tak bude pravděpodobně přímá, avšak nelineární. Hodnota korelačního koeficientu, nabývajících hodnot od +1 do -1, ukazuje lineární závislost. Hodnoty blížící se k +1 představují silnou přímou závislost, což znamená, že pokud narůstají úřední ceny, tak vzhledem k hodnotě korelačního koeficientu blížícímu se +1 narůstá i síla přímé závislosti tržních cen. Tato cena se projeví jejich zvyšující se hodnotou. Hodnoty, blížící se k -1 ukazují na silnou nepřímou závislost, a tudíž na narůstající sílu nepřímé závislosti tržních cen, což se projeví na jejich snižující se hodnoty. Jak je patrno z literární rešerše kód BPEJ je určen ze specifických vlastností půdy, zjištěných v rámci bonitace půdního fondu. Tato bonitace respektuje neovlivnitelné faktory konkrétního zemědělského pozemku. Tyto faktory a následné produkční ocenění určuje ve výsledku ekonomickou hodnotu a agroekologickou charakteristiku daného kódu BPEJ. Je tedy zřejmé, že tržní ceny nerespektují kvalitu půdy zemědělských pozemků danou kódem BPEJ. Tato cenová disproporce vede k úvaze o úpravě oceňovacího modelu než se prizmatem toho současného snažit tuto problematiku s přijatelnou přesností modelovat. Z výsledků vyplývá, že statistický významný propad vykazují nabídkové ceny v okresech Ostrava a Rychnov nad Kněžnou.

8 Přehled literatury a použitých zdrojů

1. Abdelrahman, M. A. E., Najartan, A., Srinivashamurthy, C. A., Hegde, R., 2015. Estimating soil fertility status in physically degraded land using GIS and remote sensing techniques in Chamarajanagar district, Karnataka, India, Elsevier, (95-108).
2. Bradáč, A. 2009. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Cerm. 753 s. ISBN 9788072046300.
3. ČUZK, © 2022: Nahlížení do katastru nemovitostí. (online) [cit.2022.06.20], dostupné z <https://nahlizenidokn.cuzk.cz/>
4. ČSN EN ISO 11074: Kvalita půdy – slovník, Praha, 2015.118 s.
5. Český statistický úřad ©2023: Charakteristika okresu. (online) [cit.2023.03.10], dostupné z <https://www.czso.cz/csu/xt/kraj-okresy>
6. De Brogmiez, D., Ballabio, C., Stevens, A., Jones, R. J. A., Montanarella, L., Van Wesemail, B. 2015. Amap the tpsoil organic carbon content of Europe generated by a generalized additive model. European Journal of Soil Science, 10.1111/ejss.12193, 66, (1), (121-134).
7. Evropské komise, 2012. Pokyny k osvědčeným postupům pro omezení, zmírnění nebo kompenzaci zakrývání půdy. Lucembursko: Evropská unie. 62 s. ISBN 978-92-79-26206-7
8. European Commission, 2022. A European Green Deal, Striving to be the first climate-neutral continent. 30 s.
9. FAO – Food And Agriculture Organization of the United Nations and ITPS, 2015: Status of the World's Soil Resources. 607 s. ISBN 978-92-5-109004-6
10. FARMY.CZ, ©2022: Zpráva o trhu s půdou 2022. (online) [cit.2022.06.20], dostupné z https://www.farmy.cz/informace_zpravy_o_trhu_s_pudou
11. Ferguson, S., Furtan H., Carlberg, J. 2006. The political economy of farmland ownership regulations and land prices, Agricultural Economics. 10.1111/j.1574-0862.2006.00139.x, 35, 1, (59-65).
12. Gardi, C., Panagos, P., Van Liedekerke, M., Bosco, C., De Brogniez, D. 2015. Land Take and Food Security Assessment of Land Také on the Agricultural Production in Europe. Journal of Environmental Planning and Management, 58, (898-912).
13. Gardi, C., Panagos, P., Van Liedekerke, M., Bosco, C., & De Brogniez, D. 2015. Land Také and Food Security: Assessment of Land Take on the Agricultural

- Production in Europe. Journal of Environmental Planning and Management. 10.1080/ 09640568.2014.899490, 58, (898-912).
14. Goodwin, B.K., Mishra, A. K., Ortalo-Magné, F.N. 2003. What's Wrong with Our Models of Agricultural Land Values? American Journal of Agricultural Economics. 10.1111/1467-8276.00479, 85, 3, (744-752).
 15. Guyomard, H., Lankoski, J., Ollikainen, M. 2009. Impacts of agricultural policies on crop land prices, Food Economics – Acta Agriculturae Scandinavica. Section C, 10.1080/16507540903474681, 6, 2, (88-98).
 16. Janků, J. 2003: Pedologie pro ekonomy. Česká zemědělská univerzita v Praze. 2003. 33 s.
 17. Janků, J., Sekáč, P., Baráková, J., Kozák, J. 2016. Analýza využití půdy z hlediska ochrany zemědělské půdy v České republice. Výzkum půdy a vody. 11, (20-28).
 18. Janků, J., Jakšík, O., Kozák, J., Marhoul, A. M. 2016. Odhad úbytku půdy v České republice v blízké budoucnosti. Výzkum půdy a vody. 11, 3, (155–162).
 19. Jones, A., Panagos, P., Barcelo, S., Bouraoui, F., Commission, E., les, C. 2012. The state of soil in Europe. Publications Office of the European Union, 2017 ISBN 978-92-79-22806-3
 20. Karl, G.L., Gareth, T. 2005. Parcel size, location and commercial land values. Journal of Real Estate Research 27, (343–354).
 21. Kozák J., Němeček, J., Borůvka, L., Kodešová, R., Janků, J., Jacko, J., Hladík J. 2009: Atlas půd České republiky. ČZU Praha. 2009. 150 s. ISBN: 978-80-213-2028-4.
 22. Lamandé, M., Greve, M. H., Schjønning, P. 2018. Risk assessment of soil compaction in Europe – a case study comparing rubber tracks or wheels on machinery. (203)
 23. Lepš, J. – Šmilauer, P. Biostatistika. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7394-587-9.
 24. Ministerstvo zemědělství. 2017. Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, Praha.
 25. Ministerstvo zemědělství. 2011. Příručka ochrany proti vodní erozi. Praha: Ministerstvo zemědělství, 56 s. ISBN 978-80-7084-996-5.
 26. NĚMEČEK, J., ROHOŠKOVÁ, M., MACKŮ, J., VOKOUN, J., VAVŘÍČEK, D., NOVÁK, P. 2008: *Taxonomický klasifikační systém půd České republiky*. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. 95 s.
 27. Novotný a kol., 2017: Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy. Ministerstvo zemědělství a VUMOP, v.v.i. Praha. 87 s.

28. Panagos, P., Ballabio, C., Lugato, E., Jons, A. 2017. Condition of Agricultural Soil: Factsheet on soil erosion. 10.2760/728794. ISBN 978-92-79-77328-0
29. Panagos, P., Imeson, A., Meusburger, K., Borrelli, P., Poesen, J., Alewell, C. 2016. Soil conservation in Europe: Wish or Reality. *LAND DEGRADATION and DEVELOPMENT* 27 (6), (1547-1551).
30. Pavlů, L. 2018: Základy pedologie a ochrany půdy. Katedra pedologie a ochrany půdy. Česká zemědělská univerzita v Praze. 2018.76 s. ISBN: 978-80-213-2876-1
31. Pederson, G.D., Khitarishvili, T. 2002. Analysis of Land Prices under Uncertainty: A Real Option Valuation Approach, *Economic Studies on Food, Agriculture, and the Environment*, 10.1007/978-1-4615-0609-6, (153-168).
32. Pimentel, D., Whitecraft, M., Scott, Z.R., Zhao, L., Satkiwicz, P., Scott, T. J., Phillips, J., Szimak, D., Singh, G., Gonzalez, D. O., Moe, T. L. 2010. Will limited land, water and energy control human population numbers in the future? Springer. (599-611).
33. SREALITY, ©2022: Přehled nabízených pozemků (online) [cit.2022.06.20], dostupné z <https://www.sreality.cz/hledani/pozemky.cz>
34. Stachura J., Chuman T., Šefrna L. 2015. Development of soil consumption driven by urbanization and pattern of built-up areas in Prague periphery since the 19th century. *Soil and Water Res.*, 10, (252-261).
35. Taxonomický klasifikační systém půd v ČR ©2004: Půdní kategorie. (online) [cit.2023.03.10], dostupné z <https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showPudniKategorie>
36. Tóth, G. 2012. Vliv záboru půdy na základnu půdního fondu pro rostlinnou výrobu v Evropské unii. Věda o životním prostředí jako celku, (435–436).
37. Vopravil, J. 2009. Půda a její hodnocení v ČR. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Praha, 148 s. ISBN: 978-80-87361-02-3.
38. VUMOP, ©2022: E Katalog BPEJ. (online) [cit.2022.06.20], dostupné z <https://bpej.vumop.cz/25011.50.11> (vumop.cz)
39. Vyhláška 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, platném znění.
40. Zazvonil, Z. 1996. Oceňování na tržních principech. 1. vyd.— Praha: Ceduk, 1996— 173 s. ISBN: 80-902109-0-2.
41. Zhang, X., Chen, J., Tan, M., Sun, Y. 2007. Assess the impact of urban sprawl on Nanjing's land resources using satellite imagery and digital land databases. *Catena* 69, (16-30).

9 Seznam obrázků, tabulek, grafů a zkratek

Seznam obrázků

Obrázek 1 - Polygon četnosti.....	17
Obrázek 2 - Součtová křivka.....	18
Obrázek 3 - Empirická distribuční funkce	18
Obrázek 4 – Histogram četností.....	20
Obrázek 5 – Boxplot	26

Seznam tabulek

Tabulka 1- Charakteristika kódu sklonitosti	7
Tabulka 2 - Charakteristika kódu expozice.....	7
Tabulka 3 - Charakteristika kódu kombinace sklonitosti a expozice	7
Tabulka 4 - Bodové rozdělení četností vlastní zpracování	16
Tabulka 5 - Rychnov nad Kněžnou 29 pozemků	27
Tabulka 6 - Rychnov nad Kněžnou nabídkové ceny	28
Tabulka 7- Opava 27 pozemků	29
Tabulka 8 - Opava nabídkové ceny	29
Tabulka 9 - Nový Jičín 31 pozemků	30
Tabulka 10 - Nový Jičín nabídkové ceny.....	31
Tabulka 11 - Ostrava 24 pozemků	32
Tabulka 12 - Ostrava nabídkové ceny.....	32
Tabulka 13 - Příbram 19 pozemků.....	33
Tabulka 14 - Příbram nabídkové ceny	33

Seznam použitých zkratek

BPEJ	- Bonitovaná půdní ekologická jednotka
MZ	- Ministerstvo zemědělství
ZPF	- Zemědělský půdní fond
ÚZEI	- Ústav zemědělské ekonomiky a informací
HRRE	- Hrubý roční rentní efekt
KR	- Klimatický region
VÚMOP	- Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Přílohy

Příloha č. 1

N	parcelní číslo	okres	nabídková cena Kč/m2	Zdroj dat: Katastrální mapa				zdroj dat: VUMOP
				BPEJ				
1	488/20	Nový Jičín	28	6	43	0	0	10,03
2	1810/36	Nový Jičín	31	6	43	0	0	10,03
3	1810/37	Nový Jičín	31	7	40	6	8	1,24
4	1810/38	Nový Jičín	31	7	28	4	4	2,5
5	1845/8	Nový Jičín	31	7	24	4	1	5,08
6	1845/9	Nový Jičín	31	7	41	7	5	1,24
7	1866/58	Nový Jičín	31	6	58	0	0	7,83
8	309	Nový Jičín	34	7	26	4	1	4,61
9	309	Nový Jičín	34	7	42	6	7	5,12
10	436/3	Nový Jičín	34	7	26	4	1	4,61
11	436/3	Nový Jičín	34	7	47	1	0	4,75
12	1969/10	Nový Jičín	35	7	41	6	8	1,25
13	531	Nový Jičín	39	7	26	4	1	4,61
14	531	Nový Jičín	39	7	47	1	0	4,75
15	541	Nový Jičín	39	7	26	4	1	4,61
16	541	Nový Jičín	39	6	44	0	0	8,96
17	541	Nový Jičín	39	7	49	1	1	3,44
18	543	Nový Jičín	39	7	58	0	0	5,29
19	543	Nový Jičín	39	6	24	1	1	7,16
20	544	Nový Jičín	39	6	43	1	0	8,8
21	576/8	Nový Jičín	40	6	43	1	0	8,8
22	2692/27	Nový Jičín	40	6	43	1	0	8,8
23	2692/27	Nový Jičín	40	6	45	0	1	8,59
24	3143/14	Nový Jičín	41	6	43	1	0	8,8
25	277/63	Nový Jičín	48	6	43	1	0	8,8
26	527/95	Nový Jičín	48	6	43	0	0	10,03
27	524/109	Nový Jičín	48	6	44	1	0	8,04
28	524/109	Nový Jičín	48	7	47	4	5	2,42
29	3003/7	Nový Jičín	48	7	20	2	1	4,28
30	1620	Nový Jičín	48	7	37	1	6	1,35
31	1620	Nový Jičín	48	7	37	4	6	1,34
32	266	Opava	25	7	73	1	1	1,33
33	262	Opava	25	7	26	1	4	3,27
34	262	Opava	25	7	38	1	6	1,48
35	262	Opava	25	7	73	1	1	1,33
36	1239/32	Opava	28	5	14	0	0	12,77
37	2582/13	Opava	35	7	48	1	1	4,3

38	2664	Opava	36	8	35	2	1	4,36
39	2669	Opava	36	8	35	2	4	2,45
40	635	Opava	36	7	26	0	4	4,42
41	635	Opava	36	7	38	1	6	1,48
42	635	Opava	36	7	48	1	1	4,3
43	697	Opava	45	7	26	1	4	3,27
44	698	Opava	45	7	26	0	4	4,42
45	698	Opava	45	7	26	1	4	3,27
46	699	Opava	45	7	26	0	4	4,42
47	852	Opava	45	7	26	1	4	3,27
48	865	Opava	45	7	26	1	4	3,27
49	901	Opava	45	7	26	0	4	4,42
50	901	Opava	45	7	26	1	4	3,27
51	527/5	Opava	47	7	48	1	1	4,3
52	818/14	Opava	55	7	27	0	1	6,11
53	818/14	Opava	55	7	27	1	1	4,82
54	835/29	Opava	55	7	27	0	1	6,11
55	835/29	Opava	55	7	27	1	1	4,82
56	835/29	Opava	55	7	37	1	6	1,35
57	934	Opava	59	5	14	0	0	12,77
58	934	Opava	59	5	14	1	0	10,9
59	3587/40	Ostrava	31	6	56	0	0	10,34
60	2659/2	Ostrava	31	6	58	0	0	7,83
61	2663	Ostrava	31	6	67	0	1	1,4
62	2663	Ostrava	31	6	58	0	0	7,83
63	2654	Ostrava	31	6	43	0	0	10,03
64	2654	Ostrava	31	6	67	0	1	1,4
65	2654	Ostrava	31	6	58	0	0	7,83
66	899/11	Ostrava	35	6	59	0	0	6,64
67	899/12	Ostrava	35	6	59	0	0	6,64
68	922/1	Ostrava	35	6	67	0	1	1,4
69	926/15	Ostrava	35	6	59	0	0	6,64
70	926/15	Ostrava	35	6	59	0	0	6,64
71	2654	Ostrava	38	6	43	0	0	10,03
72	2654	Ostrava	38	6	67	0	1	1,4
73	2654	Ostrava	38	6	58	0	0	7,83
74	3410	Ostrava	41	6	43	1	0	8,8
75	3410	Ostrava	41	6	22	1	0	6,01
76	3410	Ostrava	41	6	43	0	0	10,03
77	531/4	Ostrava	42	6	56	0	0	10,34
78	2877	Ostrava	42	6	26	4	4	2,86
79	2877	Ostrava	42	6	26	1	4	3,73
80	2869	Ostrava	42	6	26	4	4	2,86
81	2769	Ostrava	42	6	26	1	4	3,73
82	531/4	Ostrava	50	6	56	0	0	10,34
83	78	Příbram	37	5	32	0	1	6,61

84	78	Příbram	37	5	32	5	1	4,62
85	81,19	Příbram	37	5	32	5	1	4,62
86	81,19	Příbram	37	5	32	1	1	5,75
87	81,21	Příbram	37	5	32	5	1	4,62
88	81,21	Příbram	37	5	32	1	1	5,75
89	415/8	Příbram	42	5	26	1	1	7,26
90	415/8	Příbram	42	5	26	1	4	4,39
91	434/14	Příbram	42	5	26	1	1	7,26
92	89/1	Příbram	42	5	47	0	0	7,04
93	89/54	Příbram	42	5	26	1	1	7,26
94	89/54	Příbram	42	5	47	0	0	7,04
95	415/11	Příbram	42	5	26	1	1	7,26
96	415/11	Příbram	42	5	45	0	1	9,05
97	920	Příbram	42	5	45	0	1	9,05
98	1018	Příbram	43	5	26	1	4	4,39
99	905	Příbram	43	5	26	1	4	4,39
100	907	Příbram	43	5	26	1	4	4,39
101	227/78	Příbram	50	5	46	0	0	8,94
102	682/3	Rychnov nad Kněžnou	30	5	56	1	1	10,7
103	41/3	Rychnov nad Kněžnou	30	5	54	4	1	3,32
104	41/3	Rychnov nad Kněžnou	30	5	55	0	0	7,2
105	41/3	Rychnov nad Kněžnou	30	5	21	1	2	3,06
106	41/3	Rychnov nad Kněžnou	30	5	54	1	1	4,3
107	2035/2	Rychnov nad Kněžnou	34	5	54	1	1	4,3
108	2035/2	Rychnov nad Kněžnou	34	5	20	0	1	7,31
109	2047	Rychnov nad Kněžnou	34	5	54	1	1	4,3
110	2048	Rychnov nad Kněžnou	34	5	20	0	1	7,31
111	2048	Rychnov nad Kněžnou	34	5	54	1	1	4,3
112	2113/184	Rychnov nad Kněžnou	34	5	54	1	1	4,3
113	2113/185	Rychnov nad Kněžnou	34	5	54	1	1	4,3
114	3808/29	Rychnov nad Kněžnou	35	5	58	0	0	7,87
115	3808/40	Rychnov nad Kněžnou	35	5	58	0	0	7,8

116	3311	Rychnov nad Kněžnou	36	7	54	1	1	3,01
117	3312	Rychnov nad Kněžnou	36	7	54	1	1	3,01
118	2364/9	Rychnov nad Kněžnou	36	7	25	0	4	5,21
119	3326	Rychnov nad Kněžnou	36	7	25	0	4	5,21
120	3326	Rychnov nad Kněžnou	36	7	25	1	4	4,15
121	3641	Rychnov nad Kněžnou	36	7	25	1	4	4,15
122	3641	Rychnov nad Kněžnou	36	7	25	0	4	5,21
123	3645	Rychnov nad Kněžnou	36	7	38	1	6	1,48
124	3645	Rychnov nad Kněžnou	36	7	25	1	4	4,15
125	3645	Rychnov nad Kněžnou	36	7	25	4	4	2,72
126	3645	Rychnov nad Kněžnou	36	7	54	1	1	3,01
127	3208	Rychnov nad Kněžnou	50	5	65	0	1	5,39
128	3070	Rychnov nad Kněžnou	50	5	51	1	1	4,85
129	3187	Rychnov nad Kněžnou	50	7	25	1	4	4,15
130	3187	Rychnov nad Kněžnou	50	7	40	8	9	1,22

Příloha č. 2

N	číslo parceley	okres	BPEJ			charakteristika sklonitosti a exponice	kom., plôd. prof. a skelet. (0-9)	kód skeletovitosti (0-3)	Kombinace skeletovitosti a hloubky			nab. cena Kč/m ²	úřední cena BPEJ Kč/m ²	násobek úřední ceny					
			klimatický region						charakteristika sklonitosti a exponice										
			kód klim. regionu (0-8)	symbol regionu	charakteristika regionu	nr. pôd. jednotky (01-78)	charakteristika HPJ	kom. svaz. exp. (0-9)	sklonitost kód (0-6)	sklonitost charakteristika	expozice kód (0-3)	expozice charakteristika							
1	488/20	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	49	Kambizemné písčité, rendziny, písčitě opeřené	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	hluboká (>60cm), silně hluboká (>90cm)	28	3,44	8,1	
2	1810/36	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	31	10,03	3,1
3	1810/37	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	31	10,03	3,1
4	1810/38	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	31	10,03	3,1
5	1845/8	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	31	10,03	3,1
6	1845/9	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	31	10,03	3,1
7	1866/58	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	31	10,03	3,1
8	309	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	40		6	4	výrazný sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	8	2-3	střední skeletovitost (25-50%), silně skeletovitá (nad 50%)	34	1,24	27,4	
9	309	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	28		4	3	střední sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	4	2	střední skeletovitost (obsah skletu do 10%), bezskletovitost, s příměsi	34	2,5	13,6	
10	406/3	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	24	Kambizemné modální eutroznické až mezorezické luvičkové na břidlicích	4	3	střední sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	1	0-1	hluboká (>60cm), silně hluboká (>90cm)	34	5,08	6,7	
11	436/3	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	41	Jako HPJ 40 změšeně zdeřený střední mělký	7	4	výrazný sklon	3	(vzájemnost s výraznou sklonitostí)	5	1	střední skeletovitost (obsah skletu do 10%), bezskletovitost, s příměsi (obsah skletu do 10%), bezskletovitost, s příměsi (obsah skletu do 10%)	34	1,24	27,4	
12	1989/10	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, vlhký	58	Fluviogenetické glazevy na svatoňovských, silné říčních nebo sr. říč. lehkých	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	35	7,89	4,5
13	531	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	28	Kambizemné modální eutroznické a mezorezické luvičkové na břidlicích	4	3	střední sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	1	0-1	hluboká (>60cm), silně hluboká (>90cm)	39	4,61	8,5	
14	531	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	42	Hnědozemné opeřené na sprašových hlinách, sprašové střední vložky	6	4	výrazný sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	7	0-1	hluboká (>60cm), silně hluboká (>90cm)	39	5,12	7,6	
15	541	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	26	Kambizemné modální eutroznické a mezorezické luvičkové, kambizemné opeřené na svatoňovských hlinách	4	3	střední sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	1	0-1	hluboká (>60cm), silně hluboká (>90cm)	39	4,61	8,5	
16	541	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	47	Pseudoglezogene modální luvičkové na sprašových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	39	4,75	8,2

N	číslo parceley	okres	BPEJ			charakteristika sklonitosti a exponice	kom., plôd. prof. a skelet. (0-9)	kód skeletovitosti (0-3)	Kombinace skeletovitosti a hloubky			nab. cena Kč/m ²	úřední cena BPEJ Kč/m ²	násobek úřední ceny					
			klimatický region						charakteristika sklonitosti a exponice										
			kód klim. regionu (0-8)	symbol regionu	charakteristika regionu	nr. pôd. jednotky	charakteristika HPJ	kom. svaz. exp. (0-9)	sklonitost kód (0-6)	sklonitost charakteristika	expozice kód (0-3)	expozice charakteristika							
17	541	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	41	Jako HPJ 40 změšeně střední říční	6	4	výrazný sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	8	2-3	střední skeletovitost (25-50%), silně skeletotovitá (nad 50%), bezskletotovitost, s příměsi	39	1,25	31,2	
18	543	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	26	Kambizemné modální eutroznické a mezorezické luvičkové na břidlicích	4	3	střední sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	1	0-1	hluboká (>60cm), střední hluboká (>90cm)	39	4,61	8,5	
19	543	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	47	Pseudogleze modální luvičkové, kambizemné opeřené na sprašových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	hluboká (>60cm)	39	4,75	8,2	
20	544	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	26	Kambizemné modální eutroznické a mezorezické luvičkové na břidlicích	4	3	střední sklon	1	jih (jihozápad až phojvýchod)	1	0-1	hluboká (>60cm), střední hluboká (>90cm)	39	4,61	8,5	
21	576/8	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, vlhký	44	Pseudogleze modální luvičkové na prachových	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	40	8,96	4,5
22	269/27	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	49	Kambizemné opeřené, rendziny, písčitě opeřené	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	hluboká (>60cm), bezskletotovitost, s příměsi (obsah skletu do 10%), bezskleletovitost, s příměsi (obsah skletu do 10%)	40	3,44	11,6	
23	269/27	Nový Jičín	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	58	Plexion glazevy na svatoňovských, střední říční nebo smr. říč. vln.	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	40	5,29	7,6
24	314/14	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	24	Kambizemné modální eutroznické a mezorezické luvičkové, kambizemné písčitě opeřené	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	hluboká (>60cm), střední hluboká (>90cm)	41	7,16	5,7	
25	277/63	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	48	8,8	5,5
26	527/95	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	48	8,8	5,5
27	277/64	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	48	8,8	5,5
28	524/98	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	45	Hnědozemné opeřené na svatoňovských hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	1	0-1	hluboká (>60cm), střední hluboká (>90cm)	48	8,59	5,5	
29	524/98	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	48	8,8	5,5
30	524/109	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	48	8,8	5,5
31	524/109	Nový Jičín	6	MT 3	mírně teplý, (az teplý) vlhký	43	Hnědozemné luvičkové, luvičem opeřené na sprašových hlinách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	0	hluboká (>60cm)	48	10,03	4,8
32	266	Opava	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	73	Kambizemné opeřené, pseudogleze glazevy / hydrokulové, plstevkové, ne svatoňovské písčitě	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	hluboká (>60cm), střední hluboká (>90cm)	25	1,33	18,8	

N	číslo parceley	okres	BPEJ			hl. půd. jednotka (HPJ)	Charakteristika HPJ	Charakteristika sklonitosti a expozice				Kombinace sklonitosti a houbky				nab. cena Kč/m ²	udělení ceny BPEJ Kč/m ²	násobek údělných cen	
			kód klim. regionu (0-9)	symbol regionu	charakteristické regiony (01-78)			kom. sváž. a exp. (0-9)	sklonitost kod (0-6)	sklonost charakteristika	expozice kod (3-5)	expozice charakteristika	komb. příč. prot. a skelet. (0-9)	kód skeletovitosti (0-3)	sklonitost charakteristika kodu sklonitosti menší než 30 mm	kód houbky pády	charakteristika houbky pády		
33	282	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	4	2	střední sklonitost (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	25	3,27	7,6
34	282	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	38	Jako před HPJ 37 zmínostení stř. ištěké	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	6	2	střední sklonitost (obecný skelet 25-50%)	mělká (<30cm)	25	1,48	16,9
35	282	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	73	Kombinace opejeného pravěku hydromazického s převalem hydromazického v závěsu, na vlivných vrcholcích	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	1	0-1	bezsklonitost, s příměsí, s příměsí bezsklonitosti (obecný skelet 10-25%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	25	1,33	18,8
36	1239/32	Opava	5	MI 2	mírné teplý, mírné výšky	14	Lávka, vlivem laviček všechny stopy opejeniny na správných místech nahoře svrchními hrnci	0	0-1	úplná rovinovina	0	všešmrávová	0	0	bezsklonitost, s příměsí (obecný skelet 0-10%)	hubouká (>60cm)	28	12,77	2,2
37	2982/13	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	48	Kombinace opejeného, rendziny karbonské odřeniny	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	1	0-1	bezsklonitost, s příměsí, slabé skeletovitá (obecný skelet 10-25%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	35	4,3	8,1
38	636	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	0	0-1	úplná rovinovina	0	všešmrávová	4	2	střední sklonitost (obecný skelet 25-50%)	hubouká (<30cm), střední hubouká (30-60cm)	36	4,42	8,1
39	636	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	38	Jako před HPJ 37 zmínostení stř. ištěké	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	6	2	bezsklonitost, s příměsí, slabé skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	mělká (<30cm)	36	1,48	24,3
40	635	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	48	Kombinace opejené, rendziny karbonské odřeniny	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	1	0-1	bezsklonitost, s příměsí, slabé skeletovitá (obecný skelet 10-25%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	36	4,3	8,4
41	2654	Opava	8	MCH	mírné chladné, výšky	35	Kombinace dýstrické modální meromázické na břidlicích	2	2	mírný sklon	1	jih (jihovýchod až jihovýchod)	1	0-1	bezsklonitost, s příměsí, slabé skeletovitá (obecný skelet 10-25%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	36	4,36	8,3
42	2669	Opava	8	MCH	mírné chladné, výšky	35	Kombinace dýstrické modální meromázické na břidlicích	2	2	mírný sklon	1	jih (jihovýchod až jihovýchod)	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 10-25%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	36	2,45	14,7
43	697	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	3,27	13,8
44	698	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	0	0-1	úplná rovinovina	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	4,42	10,2
45	698	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	3,27	13,8
46	699	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	0	0-1	úplná rovinovina	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	4,42	10,2
47	852	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	3,27	13,8
48	865	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	3,27	13,8
49	901	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	0	0-1	úplná rovinovina	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	4,42	10,2
50	901	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	26	Kombinace modální eukazické a meromázické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	4	2	střední skeletovitá (obecný skelet 25-50%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	45	3,27	13,8
51	9276	Opava	7	MT 4	mírné teplý, výšky	48	Kombinace opejené, rendziny karbonské odřeniny	1	2	mírný sklon	0	všešmrávová	1	0-1	bezsklonitost, s příměsí, slabé skeletovitá (obecný skelet 10-25%)	hubouká (>60cm), střední hubouká (30-60cm)	47	4,3	10,2

N	číslo parceley	okres	klimaticky region		hlavní půdní jednotka (HPJ)		charakteristika sklonnosti a expozice					Kombinace sklonovitosti a hloubky					nab. cena Kč/m ²	úřední cena BEPJ Kč/m ²	rozsah úřední ceny	
			kód klim. regionu (0-9)	symbol regionu	charakteristika regionu	hl. půd. jednotka (01-78)	charakteristika HPJ	kom. svaz. a exp. (0-9)	sklonost skloň. (0-6)	sklonost charakteristika	expozice kod (0-3)	expozice charakteristika	komb. půd. prot. a skloň.	kód sklonovitosti (0-9)	sklonovitost charakteristika kamen (4-30 mm kámen > 30 mm)	kód hloubky půdy	charakteristika hloubky půdy			
52	818/14	Opava	7	MT 4	mírné teplý, vlnky	27	Kambrové modráni subazické až mezobazické na pískových drobách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	1	0-1	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0-1	Hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	55	6,11	9,0
53	818/14	Opava	7	MT 4	mírné teplý, vlnky	27	Kambrové modráni subazické až mezobazické na pískových drobách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0-1	Hluboká (60cm), středně hluboká (30-60cm)	55	4,82	11,4
54	835/29	Opava	7	MT 4	mírné teplý, vlnky	27	Kambrové modráni subazické až mezobazické na pískových drobách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	1	0-1	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0-1	Hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	55	6,11	9,0
55	835/29	Opava	7	MT 4	mírné teplý, vlnky	27	Kambrové modráni subazické až mezobazické na pískových drobách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0-1	Hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	55	4,82	11,4
56	835/29	Opava	7	MT 4	mírné teplý, vlnky	37	Kambrové litické na pevných silikátových horninách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	6	2	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	2	mírná (<30cm)	55	1,35	40,7
57	934	Opava	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	14	Luzerné modráni hlinopřeměnité vlnky včetně slabé ojediněných na správcích silicích až silikátových horninách	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	59	12,77	4,6
58	934	Opava	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	14	Luzerné modráni hlinopřeměnité vlnky včetně slabé ojediněných na správcích silicích až silikátových horninách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	59	10,9	5,4
59	3587/40	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	56	Fluorizované modráni až mezobazické na vlnách uložených, sředně těžké nebo střed. lehké	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	31	10,34	3,0
60	2659/2	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	58	Fluorizované plevejné na vlnách uložených, sředně těžké nebo střed. lehké	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	31	7,83	4,0
61	2663	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	57	Gleje modráni na různých substracích často vložených uložených	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	1	0-1	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0-1	Hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	31	1,4	22,1
62	2663	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	58	Fluorizované plevejné na vlnách uložených, sředně těžké nebo střed. lehké	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	31	7,83	4,0
63	2654	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	43	Hlinskočeské kavickové, luxemur jezíreny na správcích silicích	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	31	10,03	3,1
64	2654	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	67	Gleje modráni na různých substracích často vložených uložených	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	1	0-1	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0-1	Hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	31	1,4	22,1
65	2654	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	58	Fluorizované plevejné na vlnách uložených, sředně těžké nebo střed. lehké	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	31	7,83	4,0
66	899/11	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	59	Fluorizované plevejné na vlnách uložených těžké až vlnaté	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	35	5,64	5,3
67	899/12	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	59	Fluorizované plevejné na vlnách uložených těžké až vlnaté	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešměrová	0	0	bezsklonovitá, s příměsí slabé sklonovitá (obsah skloň. 10-25%)	0	Hluboká (>60cm)	35	5,64	5,3

N	číslo parceley	okres	BPEJ				hlavní půdní jednotka (HPJ)	charakteristika sklonosti a expozice						Kombinace skloností a houbky							nab. cena Kč/m ²	úřední cena BPEJ Kč/m ²	násobek úřední ceny
			kód klim. regionu (0-9)	symbol regionu	charakteristika regionu	hl. půd. jednotka (01-78)		charakteristika HPJ	komb. sváž. a exp. (0-9)	sklonost kód (0-6)	sklonost charakteristika	expozice kód (0-3)	expozice charakteristika	komb. půd. a sklet.	kód skletovitosti (0-3)	skletovitost charakteristika kód stáře 4-30 mm kámen > 30 mm	kód houbky půdy	charakteristika houbky půdy					
68	9221	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	67	Gleje modrá na různých substrátech často vrstvenaté uzených	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skletotovitá (obsah skletu 10-25%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	35	1,4	25,0			
69	926/15	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	59	Fluviemné glejové na nivách uzených těžké i vlnění těžké	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	35	6,64	6,3			
70	926/15	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	59	Fluviemné glejové na nivách uzených těžké i vlnění těžké	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	35	6,64	5,3			
71	2654	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	43	Hlásoderné luviské, luviské ojedinělé na svahových hlinách	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	38	10,03	3,8			
72	2654	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	67	Gleje modrá na různých substrátech často vrstvenaté uzených	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu 10-25%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	38	1,4	27,1			
73	2654	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	58	Fluviemné glejové na nivách uzených, silnější těžké nebo i vlnění těžké	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	38	7,83	4,9			
74	3410	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	43	Hlásoderné luviské, luviské ojedinělé na svahových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	41	8,8	4,7			
75	3410	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	22	HPJ 21 Hlásoderné luviské, luviské ojedinělé na svahových hlinách	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	41	6,01	6,8			
76	3410	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	43	Hlásoderné luviské, luviské ojedinělé na svahových hlinách	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	41	10,03	4,1			
77	531/4	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	56	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	42	10,34	4,1			
78	2677	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	4	3	sřední sklon	1	(jehrapad až jehrovich)	4	2	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	0-1	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	42	2,86	14,7			
79	2677	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	4	2	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	0-1	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	42	3,73	11,3			
80	2769	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	4	3	sřední sklon	1	(jehrapad až jehrovich)	4	2	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	0-1	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	42	2,86	14,7			
81	2769	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	4	2	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	0-1	středně skleletovitá (obsah skletu 25-50%)	42	3,73	11,3			
82	531/4	Ostrava	6	MT 3	mírné teplý (az teplý) vlnky	56	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	50	10,34	4,8			
83	78	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	32	Kambzárné modráni eubazické na hrubých zvětralnicích	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu 10-25%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	37	6,61	5,6			
84	78	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	32	Kambzárné modráni eubazické na hrubých zvětralnicích	5	3	sřední sklon	3	(sever (oproti proti svahu))	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	37	4,62	8,0			

N	číslo parceley	okres	BPEJ				hlavní půdní jednotka (HPJ)	charakteristika sklonosti a expozice						Kombinace skloností a houbky							nab. cena Kč/m ²	úřední cena BPEJ Kč/m ²	násobek úřední ceny
			kód klim. regionu (0-9)	symbol regionu	charakteristika regionu	hl. půd. jednotka (01-78)		charakteristika HPJ	komb. sváž. a exp. (0-9)	sklonost kód (0-6)	sklonost charakteristika	expozice kód (0-3)	expozice charakteristika	komb. půd. a sklet.	kód skletovitosti (0-3)	skletovitost charakteristika kód stáře 4-30 mm kámen > 30 mm	kód houbky půdy	charakteristika houbky půdy					
85	81/19	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	32	Kambzárné modráni eubazické na hrubých zvětralnicích	5	3	sřední sklon	3	sever (oproti proti svahu)	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	37	4,62	8,0			
86	81/19	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	32	Kambzárné modráni eubazické na hrubých zvětralnicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	37	5,75	6,4			
87	81/21	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	32	Kambzárné modráni eubazické na hrubých zvětralnicích	5	3	sřední sklon	3	sever (oproti proti svahu)	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	37	4,62	8,0			
88	81/21	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	32	Kambzárné modráni eubazické na hrubých zvětralnicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	37	5,75	6,4			
89	415/8	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	7,26	5,8			
90	415/8	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	4	2	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	4,39	9,6			
91	434/14	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	7,26	5,8			
92	89/1	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	47	Pseudoglejové modráni, luviské, kamzíkové ojedinělé na svahových hlinách	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	42	7,04	6,0			
93	89/54	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	7,26	5,8			
94	89/54	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	47	Pseudoglejové modráni, luviské, kamzíkové ojedinělé na svahových hlinách	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	42	7,04	6,0			
95	415/11	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	7,26	5,8			
96	415/11	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	45	Hlásoderné ojedinělé na svahových hlinách	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	1	0-1	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	9,05	4,6			
97	920	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	4	2	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	5,09	8,3			
98	1018	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	4	2	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	42	4,39	9,6			
99	905	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Kambzárné modráni eubazické a mezobazické na břidlicích	1	2	mírný sklon	0	všešměrová	4	2	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0-1	huboká (>60cm), středně huboká (30-60cm)	43	4,39	9,8			
100	907	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	26	Hlásoderné ojedinělé na svahových hlinách	0	0-1	úplná rovina rovina	0	všešměrová	0	0	berekletovitá, s příměsi sladé skleletovitá (obsah skletu do 10%)	0	huboká (>60cm)	43	4,39	9,8			
101	22778	Příbram	5	MT 2	mírné teplý, mírné vlnky	46	Hlásoderné ojedinělé na sv																

N	číslo parcely	okres	BPEJ			hl. půd. jednotka (01-78)	Charakteristika HPJ	Kombinace skeletovitosti a hlboky				nab. cena Kč/m ²	úhradní cena BPEJ Kč/m ²	násobek úhradní ceny					
			Klimatický region		hlavní půdní jednotka (HPJ)		Charakteristika sklonnosti a expozice												
			kód klim. regionu (0-9)	symbol regionu	charakteristika regionu		kom. svaz. a exp. (0-9)	sklonost kód (0-6)	sklonost charakteristika	expozice kód (0-3)	expozice charakteristika	komb. půd. a skle.	kód skeletovitosti (0-3)	kód hlboký půdy					
102	682/3	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	56	Flavokrmný modální eubazické až mezobazické	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (20-60cm)	30	10,7	2,8
103	41/3	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové	4	3	střední sklon	1	jih (jihovýchod až jihovýchod)	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	30	3,32	9,0
104	41/3	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	55	Plavokrmný pětirozne, arančické strukturované	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	0	0	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	hluboká (>60cm)	30	7,2	4,2
105	41/3	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	21	Půdy arančické subtypu, repozemné, parandzemny, kambizemny	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	2	1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm)	30	3,06	9,8
106	41/3	Kynžvart nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	30	4,3	7,0
107	2035/2	Rychnov nad Kněžnou	5	M1 2	mírně teplý, mírně vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	34	4,3	7,9
108	2035/2	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	20	Pelozemné modální, využívované a metanské, repozemné pelické, kombinacne pelické a parandzemny pelické	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	34	7,31	4,7
109	2047	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	34	4,3	7,9
110	2048	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	20	Pelozemné modální, využívované a meandranské, repozemné pelické a kambizemny pelické	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	34	4,3	7,9
111	2113/18	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	34	4,3	7,9
112	2113/18	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	34	4,3	7,9
113	2113/18	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	34	4,3	7,9
114	2806/29	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	58	Pelozemné modální, využívované na mnoha uličkovských, středně těžké nebo sř. lehké	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	0	0	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	hluboká (>60cm)	34	7,31	4,7
115	3805/40	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	58	Pelozemné modální, využívované na mnoha uličkovských, středně těžké nebo sř. lehké	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	0	0	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	hluboká (>60cm)	35	7,87	4,4
116	3311	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	3,01	12,0

N	číslo parcely	okres	BPEJ			hl. půd. jednotka (01-78)	Charakteristika HPJ	Kombinace skeletovitosti a hlboky				nab. cena Kč/m ²	úhradní cena BPEJ Kč/m ²	násobek úhradní ceny					
			Klimatický region		hlavní půdní jednotka (HPJ)		Charakteristika sklonnosti a expozice												
			kód klim. regionu (0-9)	symbol regionu	charakteristika regionu		kom. svaz. a exp. (0-9)	sklonost kód (0-6)	sklonost charakteristika	expozice kód (0-3)	expozice charakteristika	komb. půd. a skle.	kód skeletovitosti (0-3)	kód hlboký půdy					
117	3312	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	3,01	12,0
118	23649	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Kambizemny modlání až mimožobec	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	5,21	6,9
119	3326	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Kambizemny modlání až mimožobec	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	5,21	6,9
120	3326	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Kambizemny modlání až mimožobec	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	4,15	8,7
121	3641	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Kambizemny modlání až mimožobec	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	4,15	8,7
122	3641	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Kambizemny modlání až mimožobec	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	5,21	6,9
123	3645	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	38	Jako před HV 37 změněno na vlnky	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	6	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	1,48	24,3
124	3646	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Kambizemny modlání až mimožobec	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	4,15	8,7
125	3645	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Kambizemny modlání až mimožobec	4	3	střední sklon	1	jih (jihovýchod až jihovýchod)	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 25-50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	2,72	13,2
126	3645	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	54	Pseudoleje pelické, pětirozne ježovkové, využívované	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	36	3,01	12,0
127	3208	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	65	Gleje akotické, histické, modlání zdroblené, organozem ježovkové na mnoha uličkovských, kambozne ježovkové a pseudoleje modlání na západních střepech	0	0-1	úplná rovina, rovina	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	50	5,39	9,3
128	3070	Rychnov nad Kněžnou	5	MT 2	mírně teplý, mírně vlhký	51	Kambizemny modlání až mimožobec	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	1	0-1	bezsklekovitá, s příměsi, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	50	4,85	10,3
129	3187	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	25	Půdy se sklenoucí! Výš. mezi 120-150 cm kambozne, rendziny, parandzny, rankery, repozemné, černozemné, hřeckozemné a delší	1	2	mírný sklon	0	všešmrává	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu do 10-25%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm)	50	4,15	12,0
130	3187	Rychnov nad Kněžnou	7	MT 4	mírně teplý, vlhký	40	Příkry sraz - sraz	8	5-6	příkry sraz - sraz	1	jih (jihovýchod až jihovýchod)	9	0-3	silně skeletovitá (nad 50%)	hluboká (>60cm), středně hluboká (30-60cm) měna (>30cm)	50	1,22	41,0