

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka
<i>Acer campestre</i>	javor babyka		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			běžně v lesích a jejich okrajích
<i>Acer platanoides</i>	javor mléč							x	x							x		x	x				roztroušeně v lesích
<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen															x	x		x				vzácně, pouze v lese na Průchodě
<i>Acinos arvensis</i>	pamětník rolní						x					x	x	x			x	x	x	x			roztroušeně na disturbovaných místech na stepích a v prosvětlených lesích
<i>Adonis aestivalis</i>	hlaváček letní													x							C3		desítky až stovky exemplářů na disturbovaných místech, pouze na místě bývalých políček na Třesině
<i>Adonis vernalis</i>	hlaváček jarní												x								C2b	§3	velmi vzácně na Centrální stepi, 2 exempláře na 49°57'51.295"N, 14°8'1.433"E
<i>Adoxa moschatellina</i>	pižmovka mošusová																x						velmi vzácně na severozápadním svahu na Průchodě
<i>Aegopodium podagraria</i>	bršlice kozí noha	x																					hojně na eutrofizované ploše Zimoviště
<i>Agrostis vinealis</i>	psineček tuhý				x			x															vzácně v trávnicích na břidlici ve světlých lesích
<i>Achillea millefolium</i>	řebříček obecný		x	x							x	x			x	x		x	x	x			roztroušeně v trávnicích mezofilnějšího charakteru
<i>Achillea pannonica</i>	řebříček panonský		x	x		x	x		x	x	x	x						x	x				běžně na stepích a v lesních lemech
<i>Ajuga genevensis</i>	zběhovec ženevský			x			x						x	x			x	x	x	x			místy hojně ve světlých lesích a v lesních lemech
<i>Ajuga chamaepitys</i>	zběhovec trojklaný												x								C1t		velmi vzácně na Centrální stepi na Třesině na disturbovaných místech
<i>Alliaria petiolata</i>	česnáček lékařský			x	x				x		x						x	x	x				běžný v lesích, během vlhčích let může i dominovat, expanzi zabraňuje lesní pastva a hrabání opadu
<i>Allium rotundifolium</i>	česnek kulovitý																x				C3		vzácně v lesích na Průchodě
<i>Allium senescens</i> ssp. <i>montanum</i>	česnek horský chlumí				x							x									C4a		vzácně pod skalním útesem na Třesině a ve světlém lese na břidlici
<i>Allium vineale</i>	česnek viničný																	x					vzácně ve světlém lese na Průchodě
<i>Alyssum alyssoides</i>	tařice kališní		x	x								x	x						x				roztroušeně na disturbovaných místech na stepích
<i>Anagallis arvensis</i>	drchnička rolní	x	x																				vzácně, polní plevel na disturbovaných místech ve Svahu nad zimovištěm, bývalé pole
<i>Anemone ranunculoides</i>	sasanka pryskyřníkovitá	x															x		x				vzácně ve vlhčích partiích lesů
<i>Anthericum ramosum</i>	běložářka větevnatá				x				x		x	x							x	x	C4a		roztroušeně na Skalní stepi a v lesních lemech

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	kerblík lesní	x																						hojně v lemu Zimoviště
<i>Anthyllis vulneraria</i>	úročník bolhoj		x	x	x							x	x			x	x	x	x					roztoušeně na stepích
<i>Arabidopsis hirsuta</i>	huseník chlupatý					x	x		x			x	x	x				x	x	x				hojně ve světlých lesích
<i>Arabidopsis thaliana</i>	huseník rolní			x																				roztoušeně polní plevel na disturbovaných místech ve Svahu nad zimovištěm
<i>Arabis auriculata</i>	huseník ouškatý								x	x	x	x												roztoušeně na stepích na Třesině
<i>Arabis sagittata</i>	huseník střelovitý													x				x						vzácně na stepi na Průchodě
<i>Arctium lappa</i>	lopuch větší											x						x						roztoušeně na disturbovaných místech v lesních světlínách, ruderální druh šířený zvěří
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	písečnice douškolistá			x			x		x	x	x		x	x			x	x	x	x				hojně na stepích
<i>Argimonia eupatoria</i>	řepík lékařský		x	x																				roztoušeně ve Svahu nad zimovištěm a Louce nad mezí, bývalá pole
<i>Arrhenatherum elatius</i>	ovsík vyvýšený	x	x	x			x		x	x		x	x											vzácně na stepích nejvíce na Svahu nad zimovištěm, soustavně potlačován sečí a pastvou poníků
<i>Artemisia campestris</i>	pelyněk ladní				x	x	x			x							x		x					roztoušeně na stepích
<i>Artemisia vulgaris</i>	pelyněk černobýl		x																					roztoušeně, pouze na Zimovišti s hlubší půdou, bývalá pole nad Zimovištěm
<i>Asperula cynanchica</i>	mařinka psí				x	x	x					x	x	x	x	x		x	x					roztoušeně na stepích a ve světlých lesích
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	slezník routnička						x						x	x					x					hojně ve skalách na zastíněných místech, místy i ve Skalní stepi
<i>Asplenium trichomanes</i>	slezník červený																x							vzácně ve skalách na zastíněných místech
<i>Aster amellus</i>	hvězdnice chlumní				x	x		x				x	x	x	x	x	x	x	x	x				roztoušeně na stepích a ve světlých lesích
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	kozinec sladkolistý		x	x							x						x			x				roztoušeně, ve dvou enklávách ve světlých lesích v Lesním koridoru a na Průchodě
<i>Aurinia saxatilis</i>	tařice skalní											x							x					<b>C4a</b> §3 vzácně ve skalách na Třesině a na Průchodě
<i>Avenella flexuosa</i>	metlička křivolaká							x																vzácně pouze v trávnicích na břidlici
<i>Avenula pubescens</i>	ovsík pýřitý																	x	x					roztoušeně na Stepí na Průchodě

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka		
<i>Ballota nigra</i>	měrnice černá	x							x				x	x	x									hojně, výskyt vázán na místa, kde roste nebo rostl akát, rostlina profituje z eutrofizace	
<i>Berberis vulgaris</i>	dřišťál obecný							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C4a		hojně na stepích i ve světlých lesích		
<i>Biscuttela laevigata</i> subsp. <i>varia</i>	dvojštítek hladkoplodý proměnlivý									x											C3	§3	velmi vzácně na skalách v horní partii skal nad ulicí Třesina		
<i>Botriochloa ischaemum</i>	vousatka prstnatá			x	x	x	x				x	x	x			x					C3		hojně, místy expanduje na stepích, problematický druh z hlediska pastvy - zvířata ho nežerou		
<i>Brachypodium pinnatum</i>	válečka prapořitá								x		x						x							vyskytuje se v pár ostrůvcích na lokalitě ve kterých dominuje celkově je ale málo zastoupena	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	válečka lesní				x						x						x							roztroušeně v lesích	
<i>Bromus benekenii</i>	sveřep Benekenův												x	x			x							jedna z dominant v lesích	
<i>Bromus erectus</i>	sveřep přímý		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x									dominanta stepí na Vysoké stráni a na Skalní stepi nad ulicí Třesina, umí vytlačit byliny z trávníku a vytvořit hustý vysoký porost, který je nevhodný i pro xerothermní hmyz, při managementu snaha udržovat sveřepový trávník nižší a rozvolněný vhodnou pastvou, na sveřepových trávnících trávních probíhá zimní pastva, živná rostlina stepních okáčů
<i>Bromus hordeaceus</i>	sveřep měkký	x												x											vzácně, objevil se jako nedopasek na Zimovišti a na disturbovaných místech na rolích na Třesině
<i>Bromus sterilis</i>	sveřep jalový	x	x	x						x			x	x	x	x	x								místy dominantní druh obsazuje stepní stanoviště po obnově z křovin, po delší pastevní zátěži mizí a je nahrazen košťavami, důležité je spásání brzy z jara, kdy chutná i ovčím, později v průběhu května a června je již pro ně nechutný a hrozí jeho expanze po lokalitě
<i>Bupleurum falcaria</i>	prorostlík srpovitý										x		x	x		x	x	x	x	x					hojně ve světlých lesích a na stepích
<i>Calamagrostis epigeos</i>	třtina křovištní		x	x																					vzácně, pouze ve Svahu nad zimovištěm a v Louce nad mezí, intenzita managementu zabraňuje šíření - netvoří monocenózy
<i>Campanula patula</i>	zvonek otevřený		x																						vzácně, pouze ve Svahu nad zimovištěm

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka
<i>Campanula persicifolia</i>	zvonek broskvolistý				x			x									x		x	x			roztroušeně ve světlých lesích
<i>Campanula rapunculoides</i>	zvonek řepkovitý		x	x					x		x					x			x				roztroušeně ve světlých lesích
<i>Campanula trachelium</i>	zvonek kopřivolistý				x				x							x	x		x				roztroušeně ve světlých lesích
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	kokoška pastuší tobolka	x		x																			roztroušeně, polní plevel na disturbovaných místech v Louce nad zimovištěm, bývalé pole
<i>Cardaminopsis arenosa</i>	řeřišník písečný																x		x				vzácně ve světlých lesích na Průchodě
<i>Carduus acanthoides</i>	bodlák obecný										x												vzácně, ruderal šířen zvěří na disturbovaná místa
<i>Carduus crispus</i>	bodlák kadeřavý		x								x												vzácně, ruderal šířen zvěří na disturbovaná místa
<i>Carduus nutans</i>	bodlák nicí										x		x		x	x		x		x	C4a		roztroušeně na stepích na vápenci, pastevní plevel
<i>Carex digitata</i>	ostřice prstnatá				x			x			x						x	x	x	x			roztroušeně ve světlých lesích a na okrajích stepí
<i>Carex flacca</i>	ostřice chabá										x		x	x									roztroušeně na stepích na Třesině
<i>Carex humilis</i>	ostřice nízká									x	x	x	x					x	x	x	C3		jedna z dominant stepí na vápenci, v suchých letech ustupuje, zajímavý je výskyt ve světlém boru na Průchodě
<i>Carex muricata</i>	ostřice měkkoostená												x	x	x	x		x		x			roztroušeně v trávnicích na vápenci
<i>Carex praecox</i>	ostřice časná										x		x					x					roztroušeně na stepích
<i>Carlina vulgaris</i>	pupava obecná				x						x												vzácně na stepích
<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný		x		x				x					x	x		x	x	x	x			hojně, součást lesních porostů, konkuruje dubům na místech s hlubší půdou nebo severní orientací - porosty s charakterem dubohabřin, nejlépe je dubohabřina vyvinuta na severním svahu Lesa nad hospodou a místy v lesích na Průchodě
<i>Centaurea scabiosa</i>	chrpa čekánek		x								x		x	x		x		x					roztroušeně na stepích

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka	
<i>Centaurea stoebe</i> ssp. <i>stoebe</i>	chrpa latnatá			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			hojně, druh se šíří vlivem sucha po ústupu travních dominant na uvolněná místa na stepi, zvířata ho nežerou, může ohrozit charakter stepní vegetace tím, že přeroste stepní traviny a byliny.	
<i>Centaurea triumfettii</i> subsp. <i>axillaris</i>	chrpa chlumní											x									C3	§3	velmi vzácně, pouze pod dřevinami na Skalní stepi, zajímavý je výskyt bělokvěté formy	
<i>Cephalanthera damasonium</i>	okrotice bílá								x							x	x					C4a	§3	vzácně ve světlých lesích, Boru nad mlýnem a na Průchodě
<i>Cerastium brachypetalum</i>	rožec krátkoplátečný			x									x					x				C3		roztroušeně na stepích, místy hojný, svědčí mu narušování drnu pastvou
<i>Cerastium holosteoides</i>	rožec obecný		x	x		x						x	x	x										vzácně na stepích
<i>Cerastium tomentosum</i>	rožec plstnatý								x													neofyt		pouze na 5 m2 v horní části Boru u mlýna
<i>Cirsium arvense</i>	pcháč oset	x	x	x	x						x						x							hojně na plochách disturbovaných zvířaty na Zimovišti a na narušených místech na stepích, polní plevel
<i>Cirsium vulgare</i>	pcháč obecný	x	x						x								x		x					roztroušeně na disturbovaných plochách
<i>Clematis recta</i>	plamének přímý																		x			C3	§3	vzácně, pouze ve světlém lese na Průchodě
<i>Clematis vitalba</i>	plamének plotní																x							vzácně, pouze jednotlivě v lese na Průchodě
<i>Clinopodium vulgare</i>	klinopád obecný							x			x				x		x	x	x	x				roztroušeně na stepích a ve světlých lesích
<i>Convolvulus arvensis</i>	svlačec rolní	x	x	x							x		x	x	x			x						roztroušeně, na disturbovaných místech, druh šířený zvěří
<i>Conyza canadensis</i>	turan kanadský	x	x										x	x						x		neofyt		expanduje v suchých letech, při managementu je sečen a vytrháván
<i>Cornus mas</i>	dřín jarní				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		C4a	§3	hojně, dominata keřového patra, nejvíce v lokalitě na Průchodě
<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá							x			x		x	x	x			x	x	x				roztroušeně, eliminována při managementu kvůli schopnosti druhu rychle expandovat do trávníků

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka		
<i>Corydalis cava</i>	dymnivka dutá														x	x	x							vzácně v nejvlhčí partii lesa na Průchodě se severozápadní expozicí	
<i>Corydalis intermedia</i>	dymnivka bobovitá																x					<b>C4a</b>		vzácně v nejvlhčí partii lesa na Průchodě se severozápadní expozicí	
<i>Corylus avellana</i>	líška obecná				x	x			x	x	x	x				x		x	x	x				hojně, součást keřového patra	
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	skalník celokrajný			x	x	x			x			x	x				x	x	x	x		<b>C4a</b>		hojně na skalních stepích, roztroušeně ve světlých lesích	
<i>Crataegus sp.</i>	hloh		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x				hojně, součást keřového patra	
<i>Crepis perennis</i>	škarda dvouletá																			x				vzácně ve světlém lese na Průchodě	
<i>Cuscuta epithimum</i>	kokotice povázka											x	x	x										roztroušeně na stepích, v některých letech vytváří rozsáhlé porosty	
<i>Cytisus nigricans</i>	čilimník černající				x							x												vzácně pod skalním útesem na Třesině a ve světlém lese na břidlici	
<i>Dactylis glomerata</i>	srha říznačka	x	x	x													x	x						roztroušeně na Zimovišti a na Průchodě	
<i>Dactylis polygama</i>	srha hajní				x											x	x		x					místy dominanta v lesích	
<i>Daucus carota</i>	mrkev obecná		x																					roztroušeně pouze ve Svahu nad zimovištěm	
<i>Dentaria bulbifera</i>	kyčelnice cibulkonosná							x																vzácně v Lese nad hospodou	
<i>Descurania sophia</i>	úhorník mnohodílný						x		x		x													místy hojně na místech s narušeným drnem od zvířat, ruderál	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	hvozdík kartouzek			x	x	x	x		x		x	x	x					x						roztroušeně na stepích	
<i>Dictamnus albus</i>	třemdava bílá										x	x						x	x	x	<b>C3</b>	<b>§3</b>		vzácně ve spodních partiích Třesiny, hojně na Průchodě a na Stepí nad Kačákem	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	rosička krvavá												x											roztroušeně na narušených místech na východní polovině Třesiny	
<i>Dracocephalum austriacum</i>	včelník rakouský										x	x	x					x				<b>C1r</b>	<b>§1</b>		vysazené rostliny v rámci projektu reintrodukce, celkem 65 exemplářů, většina na západních svazích mezi Třesinou a lokalitou na Průchodě, kde se rostlinám daří

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka
<i>Echium vulgare</i>	hadinec obecný		x	x	x	x	x		x	x	x		x	x			x	x	x	x			hojně, druh se šíří vlivem sucha po ústupu travních dominant na uvolněná místa na stepi, zvířata ho nežerou a může ohrozit charakter stepní vegetace pro xerotemní hmyz i vzácnější druhy rostlin, je v rámci managementu vytrháván
<i>Elymus caninus</i>	pérovník psi										x		x	x	x	x	x	x	x				hojně v okrajích lesů a ve světlých lesích
<i>Elymus repens</i>	pýr plazivý	x	x	x										x									hojně, na bývalých polích
<i>Epipactis atrorubens</i>	kruštík tmavočervený																			x	C3	§3	vzácně jednotlivě v dolním lese na Průchodě
<i>Eranthis hyemalis</i>	talovín zimní							x														neofyt	roztrošeně na severním okraji lesa nad hospodou
<i>Erigeron annuus</i>	turan roční	x	x	x					x													neofyt	roztrošeně, v suchých letech expanduje do trávníků
<i>Erodium cicutarium</i>	pumpava obecná			x							x		x					x	x				vzácně na stepích a ve světlých lesích
<i>Erophila spatulata</i>	osívka kulatoplodá												x									C4a	vzácnější než osívka jarní, roste na disturbovaných místech na stepi na vápencích
<i>Erophila verna</i>	osívka jarní						x						x										hojně na narušených místech na stepi
<i>Eryngium campestre</i>	máčka ladní		x	x		x	x				x	x	x		x		x	x	x				běžně na stepích a světlinách v lesích, není spásán na pastvinách přibývá
<i>Erysimum crepidifolium</i>	trýzel škarolistý		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		C4a	rozroušeně na stepích a ve světlých lesích, není spásán na pastvinách přibývá
<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský				x						x		x						x	x			vzácně v keřovém patře
<i>Euphorbia cyparissias</i>	pryšec chvojka			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			rozroušeně na stepích a ve světlých lesích, není spásán, na pastvinách přibývá
<i>Euphorbia helioscopia</i>	pryšec kolovratec	x	x											x									vzácně na disturbovaných místech na bývalých polích
<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní				x			x			x	x				x	x			x			hojně v inverzním údolí Kačáku a pod skalními útesy se severní expozicí, jinak v lesích vzácný, v posledních letech odumírají starší buky vlivem dlouhotrvajícího sucha

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka
<i>Falcaria vulgaris</i>	srpek obecný	x	x	x							x		x					x	x				roztroušeně na stepích
<i>Fallopia dumetorum</i>	opletkva křovištní			x	x				x		x			x	x	x	x	x	x				roztroušeně na eutrofních místech, často se objevuje po výřezech dřevin, je zanášena na lokalitu zvěří
<i>Festuca ovina</i>	košťava ovčí			x	x	x		x															lokálně hojně, pouze na stepi a ve světlých lesích na břidlicích, nejvíce v prosvětlené partii doubravy v Lesním koridoru
<i>Festuca pratensis</i>	košťava luční		x																				vzácně, pouze v trávníku ve Svahu nazimovištěm, mezofilní druh
<i>Festuca rubra</i>	košťava červená		x															x	x				roztroušeně, na lokalitě se vyskytuje na vlhčích okrajích lesů, mezofilní druh,
<i>Festuca rupicola</i>	košťava žlábkatá		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			nejběžnější druh košťavy v území - dominanta stepních trávníků Stepi nad hospodou, na Třesině, hojná i na Louce nad mezí, živná rostlina stepních okáčů
<i>Festuca valesiaca</i>	košťava walisská		x		x	x		x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			dominantna Centrální stepi na Třesině, vytlačuje košťavu žlábkatou v extrémních podmínkách s jižní expozicí, živná rostlina stepních okáčů
<i>Ficaria verna</i>	orsej jarní	x																					vzácně, pouze v místech periodicky zamokřených na Zimovišti
<i>Filago arvenis</i>	bělolist rolní			x																		<b>C3</b>	vzácně na rozvolněných místech v Louce nad mezí
<i>Fragaria vesca</i>	jahodník obecný																x						vzácněji v světlých lesích
<i>Fragaria viridis</i>	jahodník trávnice		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			běžně, součást stepí a lemů lesa
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý								x			x	x	x	x	x	x	x	x	x			roztroušeně, druh podrůstá doubravy a porosty borovic na vápenci, prvek mezofytizace teplomilných doubrav - je eliminován při managementu a také chalarou
<i>Fumaria officinalis</i>	zemědým lékařský	x	x										x										na narušených místech na stepích a bývalých polích
<i>Gagea lutea</i>	křivatec žlutý	x															x						vzácně v jarním aspektu dubohabřiny se severozápadní expozicí na Průchodě a na Zimovišti v nivě periodického toku
<i>Gagea pratensis</i>	křivatec luční													x				x					vzácně v mezofilněji laděných okrajích stepních trávníků na Průchodě
<i>Gagea villosa</i>	křivatec rolní			x			x						x	x	x		x	x	x			<b>C2b</b>	roztroušeně na disturbovaných místech stepních trávníků a v lesních světlinách



## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka	
<i>Galeobdolon argentatum</i>	pitulník postříbřený							x													neofyt		hojně v Lese nad hospodou	
<i>Galeobdolon luteum</i>	pitulník žlutý																		x					hojně v Dolním lese na Průchodě
<i>Galeopsis angustifolia</i>	konopice úzkolistá			x				x	x		x		x	x		x	x	x	x	x	C3		hojně v sutích ve spodních partiích kopců, vzácněji v lesích	
<i>Galeopsis pubescens</i>	konopice pýřitá	x		x	x	x																		roztroušeně v lesích na břidlici
<i>Galium album</i>	svízel bílý	x	x	x	x												x	x						roztroušeně v mezofilně laděných trávnících
<i>Galium aparine</i>	svízel přítula		x	x		x		x	x		x			x	x		x	x	x	x				bez zásahu dominuje ve světlých lesích, na plochách s managementem ustupuje, druh indikující eutrofizaci lesů a jejich lemů
<i>Galium glaucum</i>	svízel sivý				x	x	x			x	x	x	x	x		x		x	x	x	C4a			roztroušeně na stepích, vzácněji i v lesních světlinách
<i>Galium odoratum</i>	svízel vonný										x					x	x	x						roztroušeně až vzácně ve stinných partiích lesů
<i>Galium pumilum</i>	svízel nízký				x																			vzácně ve světlých lesích
<i>Galium sylvaticum</i>	svízel lesní				x															x				vzácně ve stinných partiích lesů
<i>Galium verum</i>	svízel syříšřový			x		x				x										x				vzácně v okrajích lesů a v mezofilněji laděných trávnících
<i>Genista tinctoria</i>	kručinka barvířská		x		x	x																		vzácně ve světlých lesích na břidlici
<i>Geranium columbinum</i>	kakost holubičí		x						x		x		x		x								x	vzácně v narušených místech na stepích
<i>Geranium pratense</i>	kakost luční	x																						roztroušeně v nivě periodického toku na Zimovišti
<i>Geranium pusillum</i>	kakost maličký													x										vzácně v podrostu akátů
<i>Geranium robertianum</i>	kakost smrdutý							x	x		x									x				roztroušeně, indikuje eutrofizaci v lesním podrostu
<i>Geranium sanguineum</i>	kakost krvavý				x	x															C4a			vzácně v lesních světlinách na břidlici
<i>Geum urbanum</i>	kuklík městský	x							x				x	x	x	x	x	x	x					místo hojně, indikuje eutrofizaci
<i>Hedera helix</i>	břečťan popínavý				x			x	x							x	x			x				roztroušeně v lesích
<i>Helianthemum canum</i>	devaterník šedý									x		x	x	x					x	x	x	C2r		vzácně ve stepích, hojnější je na skalních výchozech, pouze na vápenci

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka	
<i>Helianthemum grandiflorum obscurum</i>	devaterník velkokvětý tmavý			x			x		x	x	x	x	x						x	x	x			hojně na stepích, roste i na břidlici
<i>Helleborus niger</i>	čemeřice černá							x		x												neofyt		jednotlivě na spodním okraji Skalní stepi nad ulicí Třesina, unikl ze zahrádek, roztroušeně v Lese nad hospodou
<i>Hepatica nobilis</i>	jaterník podléška															x	x			x				roztroušeně ve stinných partiích lesů na Třesině
<i>Heracleum sphondylium</i>	bolševník obecný	x																						vzácně, jen na Zimovišti
<i>Hieracium murorum</i>	jestřábník zední				x	x		x											x	x				roztroušeně v lesích
<i>Hieracium pilosella</i>	jestřábník chlupáček				x				x		x													vzácně na stepích
<i>Hieracium sabaudum</i>	jestřábník savojský				x															x				vzácně ve světlých lesích
<i>Hieracium sp.</i>	jestřábník						x	x	x	x	x													
<i>Holosteum umbellatum</i>	plevel okoličnatý				x							x	x							x	x			hojně na disturbovaných místech na stepích a v lesních světlínách
<i>Hyoscyamus niger</i>	blín černý							x																vzácně na disturbovaném místě v Boru u mlýna
<i>Hypericum montanum</i>	třezalka horská							x																velmi vzácně v Lese nad hospodou
<i>Hypericum perforatum</i>	třezalka tečkovaná	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x					hojně na stepích i v lesích, druh není spásán a na pastvinách expanduje
<i>Chaerophyllum temulum</i>	krabilice mámivá				x				x				x	x	x		x	x	x					lokálně hojně ve světlých lesích a v lesních lemech v místech bez managementu, jinde je vytrhávána, neboť je jedovatá pro pasoucí se zvířata
<i>Chelidonium majus</i>	vlaštovičnick větší								x								x			x				roztroušeně, v lesích, kde se nahromadilo velké množství opadu
<i>Chenopodium album</i>	merlík bílý	x	x	x													x							roztroušeně, pastevní plevel
<i>Impatiens parviflora</i>	netýkavka malokvětá							x	x		x					x	x	x	x			neofyt		roztroušeně, ukazuje eutrofizaci ve světlých lesích, je při managementu vytrhávána a při vyhrabání opadu mizí
<i>Inula conyzae</i>	oman hnidák		x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				velmi hojně na stepích a ve světlých lesích

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka				
<i>Inula hirta</i>	oman srstnatý				x	x					x		x					x				C3		roztroušeně na stepích			
<i>Iris aphylla</i>	kosatec bezlistý											x							x				C2b		vzácně ve skalách na Třesině a na Stepi na Průchodě		
<i>Jovibarba globifera</i>	netřeskovec výběžkatý						x			x		x	x				x							C3	vzácně na skalách a ve skalních štěrbinách, pastvou ovci je likvidován		
<i>Juglans regia</i>	orešák vlašský				x	x		x	x		x									x						vzácně, je pěstován v obci Hostim odkud zplaněl do světlých lesů	
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	jalovec obecný								x	x		x	x	x			x		x	x	x				C3	roztroušeně v lesostepích, likvidovala ho pastva koz, od ukončení pastvy koz se jalovcům daří a přibývají i mladé exempláře	
<i>Knautia arvensis</i>	chrastavec rolní		x	x																						roztroušeně, jen ve Svahu nad zimovištěm a Louce nad mezí	
<i>Koeleria macrantha</i>	smělek štíhlý				x	x	x				x	x	x	x					x							hojně na stepích	
<i>Koeleria pyramidata</i>	smělek jehlancovitý																		x							vzácně v okrajích stepí s mezofilním charakterem	
<i>Lactuca perennis</i>	locika vytrvalá				x	x	x	x		x			x	x		x	x	x	x	x	x				C3	vzácně na stepích, občas se objeví i v lesních světlinách	
<i>Lactuca serriola</i>	locika kompasová	x	x	x				x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x						velmi hojně ve světlých suťových lesích na Třesině, ruderál	
<i>Lamium maculatum</i>	hluchavka skvrnitá	x																x		x						vzácně v nejvlhčích partiích lesů na Průchodě	
<i>Lamium purpureum</i>	hluchavka nachová																			x						vzácně v Dolním lese na Průchodě	
<i>Lappa major</i>	lopuch větší	x		x																						roztroušeně na Zimovišti a v jeho okolí, ruderál	
<i>Lappsana communis</i>	kapustka obecná	x	x						x				x						x	x						roztroušeně v lesích, ruderál	
<i>Lappula squarossa</i>	strošek pomněnkový		x	x					x		x		x													C3	roztroušeně na disturbovaných místech na stepích a ve světlých lesích, zvířata ho nežerou, přibývá
<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý								x																		vysazen v Lese nad hospodou, dnes výsadba dozívá a odumírá vlivem sucha
<i>Lathyrus niger</i>	hrachor černý				x																						vzácně ve světlých lesích
<i>Lathyrus pratensis</i>	hrachor luční		x																								roztroušeně pouze ve Svahu nad zimovištěm
<i>Lathyrus tuberosus</i>	hrachor hlíznatý		x	x																							hojně ve Svahu nad zimovištěm a Louce nad mezí
<i>Lathyrus vernus</i>	hrachor jarní				x				x																		roztroušeně ve vlhčích partiích lesů
<i>Leucanthemum vulgare</i>	kopretina bílá		x	x																							vzácně ve Svahu nad zimovištěm a Louce nad mezí

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka
<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný			x				x			x	x	x	x			x	x	x				jedna z dominant keřového patra, během managementu je omezován
<i>Lilium martagon</i>	lilie zlatohlávek																	x			C4a	§3	velmi vzácně, pár kvetoucích exemplářů, pouze na okraji Horního lesa na Průchodě
<i>Linaria vulgaris</i>	lnice květel																x						vzácně, pouze ve světlině horního lesa Na Průchodě
<i>Linum catharticum</i>	len počistivý											x	x					x					roztrošeně na stepích v rozvolněných porostech
<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez pýřitý										x					x	x		x				vzácně, ve spodních partiích svahů ve světlinách
<i>Lotus corniculatus</i>	štírovník růžkatý		x	x													x	x					roztrošeně v mezofilněji laděných trávnících
<i>Luzula campestris</i>	bika ladní			x				x															roztrošeně v lesích na břidlici
<i>Luzula luzuloides</i>	bika bělavá				x			x															roztrošeně až hojně ve stinnějších lesích na břidlici
<i>Lychnis viscaria</i>	smolníčka obecná			x	x	x	x	x				x	x										roztrošeně na stepích a v lesních lemech s těžištěm výskytu v Lese nad hospodou
<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonie cesmínolistá					x		x	x	x												neofyt	roztrošeně, neofyt, šíří se ze zahrádek do lokalit Skalní step nad ulicí Třesina a do Boru u mlýna, je potlačován při managementu
<i>Malus domestica</i>	jabloň		x						x		x												vzácně ve světlých lesích a jejich okrajích, plané jabloně ze zahrad v Hostimi
<i>Medicago falcata</i>	tolice srpovitá																		x				roztrošeně pouze v Dolním lese na Průchodě
<i>Medicago lupulina</i>	tolice dětelová					x	x			x		x	x	x	x	x		x	x	x			hojně na stepích a ve světlých lesích, preference méně xerothermních stanovišť oproti <i>Medicago minima</i>
<i>Medicago minima</i>	tolice nejmenší		x	x							x	x	x	x			x	x		x		C3	hojně ve stepích, nejvíce na plochách s jižní expozicí, kde expanduje po uvolnění prostoru suchem, místy i ve světlých lesích
<i>Medicago sativa</i>	tolice vojtěška		x																				vzácně ve Svahu nad zimovištěm, odkazuje na fakt, že lokalita bylo pole
<i>Melampirum arvense</i>	černýš rolní		x																			C3	pouze ve Svahu nad zimovištěm cca 30 kvetoucích exemplářů, vyset v roce 2019 z Koněpruské populace
<i>Melica transsilvanica</i>	strdivka sedmihradská		x		x	x			x		x	x	x	x	x			x		x		C4a	roztrošeně na stepích, nejvíce na Třesině
<i>Melilotus albus</i>	komonice bílá				x																		vzácně v lesním koridoru
<i>Melilotus officinalis</i>	komonice lékařská										x	x	x										roztrošeně ve spodních partiích Třesiny, v sutích hojná
<i>Memoremea scorpioides</i>	pupkovec pomněnkový																x					C4a	velmi vzácně ve vlhké dubohabřině na severozápadním svahu v Horním lese na Průchodě

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka
<i>Mercurialis perennis</i>	bažanka vytrvalá															x	x	x	x				roztroušeně, ve stinných lesích na Průchodě
<i>Muscari tenuifolium</i>	modřeneček tenkokvětý											x	x					x	x	x	C2b	§3	roztroušeně, místy hojně, na stepích na Třesině
<i>Mycelis muralis</i>	mléčka zední				x						x						x		x				roztroušeně ve světlých lesích
<i>Myosotis ramosissima</i>	pomněnka chlumní		x										x	x				x	x				hojně ve stepích, vzácně v lesích na Třesině
<i>Neottia nidus-avis</i>	hlísník hnízdák																		x		C4a		vzácně ve stinných dubohabřinách v Dolním lese na Průchodě
<i>Nonea pulla</i>	pipla osmahlá		x																		C4a		velmi vzácně, pouze ve Svahu zimovištím
<i>Onobrychys vicifolia</i>	vičenec ligrus		x																				vzácně ve Svahu nad zimovištím
<i>Ononis repens</i>	jehlice plazivá						x														C3		vzácně v polostínu pod borovicí na Stepí nad hospodou
<i>Onopordum acanthium</i>	ostropes trubil			x							x		x		x								roztroušeně, šíří se na pastvinách, není spásán, při managementu je potlačován, ruderal
<i>Orchis purpurea</i>	vstavač nachový										x			x							C2b	§2	velmi vzácně, 2 ex. na místě Třesinských rolí, 2 ex. ve spodních partiích Třesiny
<i>Origanum vulgare</i>	dobromysl obecná												x	x				x	x	x			roztroušeně na Stepích na Průchodě, vzácně na Třesinských rolích
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	snědek chocholičnatý							x													C3		vzácně v Lese nad hospodou
<i>Othocallis siberica</i>	ladoňka sibiřská							x													neofyt		vzácně na severním okraji Lesa nad hospodou
<i>Oxytropis pilosa</i>	vlhčice chlupatá				x	x					x	x						x	x		C3		vzácně na stepích, velmi vzácně v lesních světlinách
<i>Papaver rhoeas</i>	mák vlčí	x		x					x														vzácně, ruderal na narušených místech
<i>Petrorhagia prolifera</i>	hvozdíček prorostlý												x								C4a		vzácně jen na Třesinských rolích
<i>Phleum phleoides</i>	bojínek tuhý			x														x					vzácně na Louce nad mezí a na Stepí na Průchodě
<i>Phleum pratense</i>	bojínek luční	x																					hojně, pouze na Zimovišti
<i>Pimpinella saxifraga</i>	bedrník obecný				x						x								x				roztroušeně ve stepích a v lesních světlinách

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka	
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá				x				x		x	x	x			x								porosty borovice černé silně probírány tak, aby soliterní jedinci tvořili toulavý stín na lokalitě, historicky vysazována na stepích jako alternativa borovice lesní na extrémních krasových stanovištích
<i>Pinus silvestris</i>	borovice lesní										x	x		x				x	x					roztroušeně, nejvíce se vyskytuje v Dolním lese na Průchodě a v dolních partiích Třesiny, porosty borovice v letech 2017-19 na mnoha místech uschly, hlavně na břidlicích Vysoké stráně
<i>Plantago lanceolata</i>	jitrocel kopinatý	x	x	x	x	x				x		x	x					x						roztroušeně na stepích
<i>Plantago major</i>	jitrocel větší				x																			vzácně v Lesním koridoru na břidlici
<i>Plantago media</i>	jitrocel prostřední		x	x																				roztroušeně ve Svahu nad zimovištěm a Louce nad mezí
<i>Poa angustifolia</i>	lipnice úzkolistá	x	x	x	x	x	x	x						x				x	x	x				roztroušeně na stepích a v lesních světlinách
<i>Poa compressa</i>	lipnice smáčknutá				x																			vzácně v lese na břidlici
<i>Poa nemoralis</i>	lipnice hajní				x	x		x								x	x	x	x					roztroušeně v lesích, hojnější je na Průchodě
<i>Poa pratensis</i>	lipnice luční	x																						roztroušeně na ploše Zimoviště
<i>Polycneum majus</i>	chruplavník větší													x								C1t		velmi vzácně na narušovaných místech na Centrální stepi na Třesině, několik ex. na 49°57'50.813"N, 14°8'3.825"E
<i>Polygonatum odoratum</i>	kokořík vonný				x									x		x	x	x	x	x				roztroušeně v lesích
<i>Potentilla arenaria</i>	mochna písčítá			x		x	x			x	x	x	x	x				x	x	x		C4a		hojně na stepích, nejběžnější mochna na lokalitě, místy i v lesních světlinách
<i>Potentilla argentea</i>	mochna stříbřitá			x			x						x											hojně na Stepí nad hospodou, jinde vzácně
<i>Potentilla erecta</i>	mochna nátržník												x											vzácně na stepích
<i>Potentilla heptaphylla</i>	mochna sedmilistá																	x						vzácně na Stepí na Průchodě
<i>Potentilla reptans</i>	mochna plazivá		x	x																				roztroušeně ve Svahu nad zimovištěm a Louce nad mezí
<i>Potentilla tabernaemontani</i>	mochna jarní			x		x	x	x		x	x	x	x	x	x					x				hojně na stepích a ve světlých lesích, spíše na místech s hlubší půdou, kde se druhu daří více než na mělkých půdách s jižní expozicí, kde dominuje mochna písčítá
<i>Primula veris</i>	prvosienka jarní				x	x				x			x	x	x		x	x	x	x		C4a		hojně ve světlých lesích a v lesních lemech na Průchodě, jinde vzácně

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka	
<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí				x	x					x												vzácně ve spodních partiích Třesiny a v lesním koridoru, pravděpodobně výskyt souvisí s pěstovanými třešněmi v obci Hostim	
<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán				x																		vzácně v Lesním koridoru, zplanělé ze zahrádek	
<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka															x							vzácně, pravděpodobně zplanělé ze zahrádek	
<i>Prunus fruticosa</i>	třešeň křovitá			x																	C2		velmi vzácně, jen jeden polykormon na mezi nad zimovištěm	
<i>Prunus spinosa</i>	Trnka obecná	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x			x	x	x		běžně, součást keřového patra, dříve zarůstala velké plochy ve spodních částech svahů, při managementu omezována na soliterní keře	
<i>Pulmonaria obscura</i>	plicník tmavý																x			x			vzácně ve stinných partiích lesů na Průchodě	
<i>Pulsatilla patens</i>	koniklec otevřený					x	x	x														C1t	§1	vysazeno 60 ex. v rámci repatriace druhu do Českého krasu na podzim 2022. Během následující vegetační sezony 2023 většina rostlinek uschla i přes občasnou závlivu. GPS lokalit : 49°57'40.774"N, 14°7'50.411"E, 49°57'38.100"N, 14°7'55.466"E
<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i>	Koniklec luční český				x	x	x			x		x	x	x					x	x	x	C2b	§2	roztroušeně na stepích a ve světlých lesích, nejhojnější je na skalních stepích
<i>Pyrus sp.</i>	hrušen		x		x						x		x			x	x	x	x				vzácně v lesních okrajích a v lesostepích, pravděpodobně se jedná o zplanělé jedince z místních zahrádek či dožívající stromy v bývalých sadech	
<i>Quercus petraea</i> agg.	dub zimní agg.			x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x			hojně, nejběžnější dřevina celého sledovaného území, vyskytuje se jak na vysýchavých svazích na vápenci tak i ve vlhčí spodní partii svahů na břidlicích	
<i>Quercus pubescens</i>	dub pýřitý		x		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C3	§3	hojně v lesostepích a světlých lesích s jižní expozicí na Třesině, vzácně i na svahu Lesního koridoru na břidlici	
<i>Quercus robur</i>	dub letní							x	x		x					x	x	x	x	x			dominantní v lesích na Průchodě, během suchých period se začal tento porost rozpadat, jinde jen velmi vzácně	
<i>Quercus rubra</i>	dub červený							x														neof yt	vzácně, v minulosti vysazen v porostu na severním svahu v Lese nad hospodou, při managementu je likvidován, jinde se nevyskytuje	

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka		
<i>Ranunculus bulbosus</i>	pryskyřník hlízatý								x	x										x				roztroušeně v lesních světlínách v Boru u mlýna a na Průchodě	
<i>Ranunculus repens</i>	pryskyřník plazivý	x																						roztroušeně na zimovišti, jinde neroste	
<i>Rhamnus cathartica</i>	řešetlák počistivý								x				x	x		x		x	x	x				běžně, součást keřového patra na Třesině a na Průchodě, tedy na vápencích	
<i>Ribes alpinum</i>	rybíz alpský																		x					vzácně v sutích v Dolním lese na Průchodě	
<i>Ribes uva-crispa</i>	srstka angrešt								x															vzácně na okraji Boru u mlýna	
<i>Robinia pseudacacia</i>	trnovník akát								x	x					x						x		<b>neofyt</b>	vzácně, Invazní druh, který dokáže velmi negativně ovlivnit bylinné patro, v lokalitě Les nad hospodou a Bor u mlýna byl během monitoringu zvlíknován, aktuálně větší porost na východním okraji Třesiny - plocha Pod akáty a několik exemplářů v Dolním lese na Průchodě	
<i>Rosa canina</i> agg.	růže šípková agg.			x	x	x	x		x		x	x	x	x			x	x	x	x				běžně, součást keřového patra celé lokality, managementem je omezován	
<i>Rosa gallica</i>	růže keltská		x	x	x	x																<b>C3</b>		roztroušeně v Lesním koridoru, nejhodněji se vykytuje na mezi nad zimovištěm	
<i>Rosa jundzilli</i>	růže Jundzillova				x	x										x		x				<b>C3</b>		druh vznikl jako kříženec růže šípkové a růže keltské, roztroušeně až vzácně v keřovém patře ve světlých lesích a na stepích	
<i>Rosa rubiginosa</i>	růže vinná										x	x												roztroušeně na stepích na Třesině	
<i>Rubus sp.</i>	ostružiník	x	x	x					x				x						x	x					roztroušeně, hlavně ve světlých lesích, preferuje zanedbané plochy bez aktivního managementu
<i>Rumex obtusifolius</i>	šťovík tupolistý	x																							roztroušeně pouze na Zimovišti
<i>Salvia pratensis</i>	šalvěj luční		x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x						hojně na stepích a v lesních světlínách
<i>Salvia veriticillata</i>	šalvěj přeslenitá	x	x						x																vzácně, pouze ve Svahu nad zimovištěm a v Boru u mlýna
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	x																							vzácně pouze na Zimovišti, preferuje vlhčí eutrofní půdy
<i>Sanguisorba minor</i>	krvavec menší		x	x		x	x				x	x	x	x			x	x	x	x					hojně na stepích a lesních světlínách
<i>Sanicula europae</i>	žindava evropská				x																				roztroušeně v pouze v Lesním koridoru na břidlici
<i>Saxifraga paniculata</i>	Lomikámen vždyživý									x											x	<b>C3</b>		vzácně ve zastíněných partiích skal se severní expozicí	
<i>Saxifraga tridactylites</i>	lomikámen trojprstý										x		x						x		x	<b>C3</b>		roztroušeně, stepní efeméra na velmi mělkých půdách stepí na vápenci	



## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka		
<i>Scabiosa canescens</i>	hlaváč šedavý									x		x										C3		vzácně na Skalní stepi nad ulicí Třesina a na Skalní stepi	
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	hlaváč žlutavý				x	x	x						x	x					x	x					hojně na stepích
<i>Scilla</i> sp.	ladoňka							x																	vzácně na severním okraji Lesa nad hospodou, zplanělá
<i>Securigera varia</i>	čičorka pestrá	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				roztroušeně, nejvíce v lesních lemech a světlínách, na stepích trpí suchem a v posledních letech ustupuje
<i>Sedum acre</i>	rozchodník ostrý					x	x			x	x		x	x											roztroušeně na Lesním koridoru, naopak na vápencových stepích Třesiny vzácný, preferuje mělké půdy na kyseljším podkladu
<i>Sedum album</i>	rozchodník bílý					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x									roztroušeně až vzácně na mělkých půdách stepí, nejvíce se vyskytuje na kamenném valu hradiště na Třesině
<i>Sedum maximum</i>	rozchodník velký							x	x	x				x											vzácně na stepích na Třesině, nejvíce ve spodních partiích Skalní stepi nad ulicí Třesina
<i>Sedum reflexum</i>	rozchodník skalní				x	x																			vzácně ve světlínách Lesního koridoru
<i>Sedum sexangulare</i>	rozchodník šestiřadý			x	x						x	x	x	x						x	x				hojně, nejběžnější druh rozchodníku na lokalitě, nejvíce je rozšířen na stepi na Třesině
<i>Seseli hippomaranthum</i>	sesel fenyklový											x	x				x					x	C3		vzácně na skalních stepích
<i>Seseli osseum</i>	sesel sivý				x	x	x		x							x								C4a	hojně na stepích a v okrajích lesů
<i>Sesleria caerulea</i>	pěchava vápnomilná												x	x	x										roztroušeně, preferuje místa v polostínu, stepi na vápencích se západní orientací, na stepích s jižní orientací vzácná
<i>Setaria viridis</i>	bér zelený										x														vzácně, vyskytuje se na narušených místech ve spodních partiích Třesiny, ruderál
<i>Silene nemoralis</i>	silenska hajní												x											C2b	vzácně na okrajích stepí na Třesině
<i>Silene nutans</i>	silenska nicí				x	x	x	x																	vzácně, vyskytuje ve světlých lesích na břidlicích
<i>Silene otites</i>	silenska ušnice										x	x	x				x								roztroušeně na stepích Třesiny
<i>Silene vulgaris</i>	silenska nadmutá		x	x																					roztroušeně ve Svahu nad zimovištěm a Louce nad mezí
<i>Silybum marianum</i>	ostropestřec mariánský								x																vzácně v Boru u mlýna, zavlečen ze zahrádek

## Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka			
<i>Solanum nigrum</i>	lilek černý										x								x				roztroušeně, na eutrofizovaných místech, například na bývalých ohništích, ruderal			
<i>Sonchus asper</i>	mléč drsný		x								x						x		x				roztroušeně na stepích a ve světlých lesích na ruderalizovaných plochách			
<i>Sonchus oleraceus</i>	mléč zelinný								x														roztroušeně v Boru u mlýna, ruderal			
<i>Sorbus aria</i> agg.	jeřáb muk agg.								x		x	x	x	x	x	x		x	x	x			C2b	roztroušeně pouze na vápenci, nejhojnější na Skalní stepi		
<i>Sorbus torminalis</i>	jeřáb břek		x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			C4a	roztroušeně v lesích, nejhojnější v lesostepích na Třesině, při managementu upřednostňován		
<i>Stachys germanica</i>	čistec německý								x		x						x		x				C2b	velmi vzácně na dvou lokalitách, v Boru u mlýna a v lesích na Průchoďě		
<i>Stachys recta</i>	čistec přímý						x		x	x		x	x	x				x	x	x				roztroušeně na stepích, nejvíce na Centrální stepi na Třesině		
<i>Stellaria holestea</i>	ptačinec velkokvětý				x			x																hojně, ve vlhčích partiích dubohabřin na Lesním koridoru		
<i>Stellaria media</i>	ptačinec prostřední	x													x		x		x					roztroušeně, ruderal na narušených místech		
<i>Stipa capillata</i>	kavyl vláskovitý											x	x	x				x	x					C4a	roztroušeně na stepích na Třesině, nejvíce na Centrální stepi	
<i>Stipa pennata</i>	kavyl Ivanův											x	x	x					x					C3	§3	roztroušeně na stepích na Třesině, nejvíce na Centrální stepi
<i>Tanacetum corymbosum</i>	vrtič chocholičnatý								x										x						roztroušeně ve světlých lesích	
<i>Tanacetum vulgare</i>	vrtič obecný	x																							roztroušeně na Zimovišti, zvířata ho nežerou, pastevní plevel	
<i>Taraxacum sect. ruderalia</i>	pampeliška		x											x											roztroušeně, ruderalní sekce pampelišek	
<i>Taraxacum sp.</i>	pampeliška	x						x	x				x	x	x	x	x	x	x	x					hojně, rod <i>Taraxacum</i> nebyl určován do druhu	
<i>Taxus baccata</i>	tis červený				x				x															C3	§2	jeden ex. v Lesím koridoru, pravděpodobně zavlečen z obce, několik ex. na skalce v Boru u mlýna
<i>Teucrium botrytys</i>	ožanka hroznatá						x				x	x	x				x		x	x				C3	roztroušeně na stepích, nejvíce ve spodních partiích svahů v sutích	
<i>Teucrium chamaedrys</i>	ožanka kalamandra		x	x	x	x	x		x		x	x	x				x	x	x	x				C4a	hojně, součást stepí a světlých lesů	

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka	
<i>Thalictrum foetidum</i>	žluťucha smrdutá											x	x					x				C2r		vzácně na stepích na Třesině
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	penízek prorostlý		x	x			x			x			x	x			x	x		x				hojně, na disturbovaných místech na stepích
<i>Thymus pannonicus</i> agg.	mateřídouška panonská agg.						x				x	x	x	x			x					C4a		vzácně na stepích, s těžištěm výskytu na Centrální stepi na Třesině
<i>Thymus praecox</i>	mateřídouška časná									x		x						x	x			C4a		vzácně ve skalních stepích a jejich okrajích
<i>Thymus pulegioides</i>	mateřídouška vejčitolistá			x	x	x	x		x		x		x	x			x	x	x	x				roztroušeně na stepích a ve světlých lesích, v posledních letech ustupuje vlivem sucha
<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá				x			x	x															vzácně, kromě porostu lip na severních svazích Lesa nad hospodou
<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá		x						x								x	x	x					vzácně, častější v sutích na Průchodě
<i>Torilis japonica</i>	tořice japonská												x	x	x	x		x						hojně v lesních lemech a v lesích
<i>Tragopogon</i> sp.	kozí brada												x											vzácně na Centrální stepi na Třesině
<i>Trifolium alpestre</i>	jetel alpský				x			x														C4		vzácně v lesních světlinách v Lesním koridoru a v Lese nad hospodou
<i>Trifolium arvense</i>	jetel rolní			x	x		x	x		x								x						roztroušeně v trávnících na břidlici, na vápenci pouze na odvápněných místech na Průchodě
<i>Trifolium campestre</i>	jetel ladní		x	x										x										roztroušeně v mezofilněji laděných trávnících
<i>Trifolium dubium</i>	jetel pochybný								x											x				roztroušeně na vlhčích disturbovaných místech
<i>Trifolium medium</i>	jetel prostřední		x	x		x	x							x						x				hojně v lesních lemech
<i>Trifolium pratense</i>	jetel luční		x																					roztroušeně ve Svahu nad zimovištěm
<i>Trifolium repens</i>	jetel plazivý	x																						roztroušeně na Zimovišti
<i>Trisetum flavescens</i>	trojštět žlutavý			x																				roztroušeně v Louce nad mezí
<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný				x												x	x						vzácně, vzrostlí jedinci pouze v Horním lese na Průchodě
<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý							x	x		x								x	x	x	C4a		roztroušeně, preferuje lesostepi, ve vyšším věku odumírá na grafiózu jilmu
<i>Urtica dioica</i>	kopřiva dvoudomá	x	x						x		x													hojně na Zimovišti, jinde velmi vzácně
<i>Valeriana stolonifera angustifolia</i>	kozlík lékařský																	x				C4a		velmi vzácně na okraji světlé šipakové doubravy v Horním lese na Průchodě
<i>Valerianella locusta</i>	kozlíček polníček			x									x	x	x									hojně na disturbovaných místech na stepích

Příloha č. 1

latinský název	český název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ČS	§	poznámka			
<i>Verbascum densiflorum</i>	divizna velkokvětá								x		x		x		x							C4a		velmi hojně na disturbovaných místech spodních partií svahů na Třesině		
<i>Verbascum lychnitis</i>	divizna knotovitá		x	x					x			x	x	x		x	x	x	x						hojně na stepích, místy i ve světlých lesích, nejběžnější druh divizny v území	
<i>Verbascum thapsus</i>	divizna malokvětá		x						x											x					roztroušeně na disturbovaných místech	
<i>Veronica arvensis</i>	rozrazil rolní		x	x										x											roztroušeně na disturbovaných místech v trávnicích, nejvíce na bývalých polích	
<i>Veronica hederifolia</i>	rozrazil břečťanolistý	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x						hojně na stepích a ve světlých lesích, jarní efeméra, při vlhkém jaru může dominovat	
<i>Veronica chamaedrys</i> agg.	rozrazil rezekvítek		x	x	x			x								x	x	x							roztroušeně v lesích, místy i v trávnicích mezofilnějšího charakteru, hojně v Lese na Hradišti	
<i>Veronica officinalis</i>	rozrazil lékařský				x			x																	roztroušeně ve světlých lesích v Lesním koridoru na břidlici, na vápenci neroste	
<i>Veronica praecox</i>	rozrazil časný										x		x											C3	roztroušeně na stepích na vápenci, jarní efeméra	
<i>Veronica prostrata</i>	rozrazil rozprostřený												x	x											C4a	vzácně na stepích na vápenci
<i>Veronica spicata</i>	rozrazil klasnatý																								C4a	vzácně, pouze na Stepí na Průchodě
<i>Veronica verna</i>	rozrazil jarní			x			x							x												vzácně na disturbovaných místech na bývalých polích
<i>Vicia angustifolia</i>	vikev úzkolistá		x	x		x	x				x						x	x	x	x						hojně v mezofilnějších trávnicích a ve světlých lesích
<i>Vicia hirsuta</i>	vikev chlupatá		x	x		x	x											x	x	x						hojně v mezofilnějších trávnicích a ve světlých lesích
<i>Vinca minor</i>	barvínek menší							x																		vzácně v Lese nad hospodou, pravděpodobně expanze ze zahrádek
<i>Vincetoxicum hircinum</i>	tolita lékařská				x	x	x		x			x	x	x		x	x	x	x	x						hojně v sutích, roztroušeně v lesních světlínách
<i>Viola arvensis</i>	violka rolní	x	x											x	x											roztroušeně na bývalých polích
<i>Viola collina</i>	violka chlumní															x	x			x						vzácně ve světlých lesích na Třesině
<i>Viola odorata</i>	violka vonná															x										roztroušeně v lokalitě Pod akáty
<i>Viola riviniana</i>	violka Rivinova			x	x	x																				roztroušeně ve světlých lesích a v lesních okrajích